

NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Paciente:Edad:Fecha:ELEAZAR MOO EK63 años27/12/2022

Resumen Clínico

F.N. 01.12.1959

Diagnósticos:

- P.O. de Crio-remodelación prostática
- Hiperplasia prostática benigna
- Infección de vías urinarias
- Prostatitis Aguda

Masculino de 63 años de edad que no presenta antecedentes de importancia aparentemente para su padecimiento actual, refiere disminución de la fuerza, chorro urinario así como aumento de la frecuencia de la micción por las noches, cuenta con ultrasonido de próstata que muestra volumen hasta de 49 cc, por lo que se decide realizar crio-remodelación prostática con fecha 08.11.2022, en el que por vía transperineal se introducen 1 criosonda hacia el área hiperplásica de la zona de transición del lado derecho y otra para el lado izquierdo, se termina el procedimiento sin aparentes complicaciones y se maneja con triple esquema de antibióticos incluyendo cefalexina, levofloxacino y clindamicina, con fecha 22.12.2022 acude por presentar fiebre, disuria, tenesmo vesical, polaquiuria, deshidratación, por lo que se inicia manejo con Invanz, metronidazol, paracetamol, indometacina, con evolución favorable con remisión del cuadro en 24 horas, de igual manera se complementa con ultrasonido pélvico, observando próstata con volumen de 18cc, sin presencia de colecciones o material purulento en próstata y trayecto de abordaje, se informa a familiar sobre las posibilidades de complicaciones y la importancia de las revisiones así como cumplir adecuadamente el esquema de tratamiento para evitar resistencia a los medicamentos, sin embargo por vía telefónica refiere que llevará control con urologia en su lugar de origen.

Plan.

- Se sugiere vigilar temperatura, características de la orina, exploración frecuente con ultrasonido para evitar complicaciones
- Tomar abundantes líquidos
- Aunque refiere continuará manejo con otro médico en lugar de origen es necesario que cumpla adecuadamente esquema de antibiótico por el tiempo que su médico tratante considere necesario para evitar complicaciones