

NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12

Paciente: Edad: Fecha: NIVARDO SIBAJA HERNANDEZ 80 años 27/12/2022

SEGD

Mecanismo de la deglución y tránsito bucofaringeo es normal.

Esofago se observa de morfologia, calibre y trayecto normal, con adecuado paso del medio de contraste hacia estomago.

Estómago muestra mucosa de aspecto normal, adecuada distensión, sin defectos de llenado en su interior, con adecuado paso del medio de contraste hacia duodeno.

Segunda porción del duodeno se observa con discreta disminución de la luz

Yeyuno e íleo intestinal de aspecto normal.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

• segunda porción del duodeno con con discreta disminución de la luz

Nota: se realiza rastreo ultrasonográfico observando la presencia de tumoración ya conocida de 12.2 cm, con presencia de leve cantidad de líquido libre en cavidad abdominal, por lo que se sugiere nueva revisión en 2 semanas para valorar dosis de diuréticos.



NÁFATE DE LA CRUZ "CONSULTORIO MÉDICO"

Calle 11A, No. 556. Col. Pensiones V Etapa. Mérida, Yucatán. nafate@ablacionycancer.com Cel:(999)244-12-12









