



PATIENT BLISTER MANUEL



ÉLIMINATION DES BLISTERS

6

Après la prise du médicament, le blister doit être éliminé de manière appropriée, conformément aux réglementations locales relatives aux déchets hospitaliers.

PRISE DU MÉDICAMENT

5

Lorsque vous ouvrez l'alvéole, retournez-la et laissez les comprimés tomber dans votre main. Une fois que le médicament a été extrait, il doit être pris comme indiqué.



EXTRACTION DE MÉDICAMENTS

4

Insérer le bout du doigt et l'ongle dans la zone latérale de l'alvéole et faire glisser la feuille en accordéon dans la direction opposée.



1

EXAMEN DES BLISTERS

Contrôle visuel de l'identification du blister pour s'assurer qu'il appartient au bon patient.



2

LAVAGE À LA MAIN

Veillez à vous nettoyer correctement les mains avec de l'eau et du savon pour éviter toute contamination.



3

IDENTIFICATION DE LA PRISE

Chaque compartiment du blister est étiqueté avec la dose correspondant au jour de la semaine (du lundi au dimanche) et au moment de l'administration (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et soirée).

Les jours sont identifiés par une couleur et les doses ont des dessins d'identification qui correspondent à chacun des 4 moments de la journée.

Une fois qu'une dose a été commencée, la dose suivante sera prise dans le sens des aiguilles d'une montre.

Identifiez l'alvéole à ouvrir et veillez à l'ouvrir par l'avant.

