



PATIENT BLISTER MANUEL

ÉLIMINATION DES BLISTERS

Après la prise du médicament, le blister doit être éliminé de manière appropriée, conformément aux réglementations locales relatives aux déchets hospitaliers.

6

PRENDRE LE MÉDICAMENT

Lorsque vous ouvrez l'alvéole, retournez-la et laissez les comprimés tomber dans votre main. Une fois que le médicament a été extrait, il doit être pris comme indiqué.



EXTRACTION DE MÉDICAMENTS

Insérez le bout de votre doigt et l'ongle de votre pouce dans la partie la plus étroite de l'emboîture et faites glisser la feuille d'aluminium vers la partie la plus large, comme un accordéon.



1

EXAMEN DES BLISTERS

Contrôle visuel de l'identification du blister pour s'assurer qu'il appartient au bon patient.



2

LAVAGE À LA MAIN

Veillez à vous nettoyer correctement les mains avec de l'eau et du savon pour éviter toute contamination.



3

IDENTIFICATION DE LA PRISE

Chaque compartiment du blister est étiqueté avec la dose correspondant au jour de la semaine (du lundi au dimanche) et au moment de l'administration (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et soirée).

Les jours sont identifiés par une couleur et les doses ont des dessins d'identification qui correspondent à chacun des 4 moments de la journée.

Une fois qu'une dose a été commencée, la dose suivante sera prise dans le sens des aiguilles d'une montre.

Identifiez l'alvéole à ouvrir et veillez à l'ouvrir par l'avant.

