P8160 - Project 3
Baysian modeling of hurricane

Renjie Wei, Hao zheng, Xinran Sun
Wentong Liu

2022-05-09

Introduction

EDA

Joint posterior

$$
\begin{aligned}
&\pi(\Theta|Y) \\
&\qquad = \pi(\mathbf{B}^\top, \mu^\top, \sigma^2, \Sigma \mid Y) \\
&\qquad \propto \prod_{i=1}^{n} f(Y_i \mid \beta_i, \sigma^2) \prod_{i=1}^{n} \pi(\beta_i \mid \mu, \Sigma) P(\sigma^2) P(\mu) P(\Sigma^{-1}) \\
&\qquad \propto \prod_{i=1}^{n} \Big\{ (2\pi\sigma^2)^{-m_i/2} \exp\Big\{ -\frac{1}{2}(Y_i - X_i\beta_i^\top)^\top (\sigma^2 I)^{-1}(Y_i - X_i \\
&\qquad \times \prod_{i=1}^{n} \Big\{ \det(2\pi\Sigma)^{-\frac{1}{2}} \exp\Big\{ -\frac{1}{2}(\beta_i - \mu)\Sigma^{-1}(\beta_i - \mu)^\top \Big\} \Big\} \times \frac{1}{\sigma^2} \times
\end{aligned}
$$

MCMC algorithm

Conditional Posterior

- To apply MCMC using Gibbs sampling, we need to find conditional posterior distribution of each parameter, then we can implement Gibbs sampling on these conditional posterior distributions.
  - $\pi(\mathbf{B}|Y, \mu^\top, \sigma^2, \Sigma)$
  - $\pi(\sigma^2|Y, \mathbf{B}^\top, \mu^\top, \Sigma)$
  -