Thème: Distributions usuelles

Solution de la Série 6

Exercice 1

Donnée: Le système informatique d'une petite PME est formé de deux serveurs indépendants. On suppose que la durée de vie (temps écoulé avant un crash) de chacun d'eux peut être modélisée par une variable aléatoire issue d'une distribution exponentielle. La durée de vie espérée de chacun des deux serveurs est de 150 jours.

a) Calculer la probabilité que l'un des deux serveurs indépendamment de l'autre fonctionne pendant au moins 100 jours.

Formule de répartition d'une distribution exponentielle (formulaire) :

$$F_x(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0\\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \ge 0 \end{cases}$$

La durée de vie espérée est de 150 jours (donnée), donc :

$$\mathbb{E} = 150$$
 et pour une distribution exponentielle, l'espérance vaut
$$\mathbb{E} = \frac{1}{\lambda} \text{ donc } \lambda = \frac{1}{150} \text{ donc},$$

$$P(x > 100) = 1 - P(x \le 100)$$

$$= 1 - (1 - e^{-\frac{1}{\lambda}x})$$

$$= 1 - (1 - e^{-\frac{1}{150}100})$$

$$= 1 - (1 - e^{-\frac{100}{150}})$$

$$= 1 - (1 - e^{-\frac{10}{15}})$$

$$= e^{-\frac{2}{3}}$$

b) Déterminer la probabilité que les deux serveurs fonctionnent ensemble et simultanément pendant au moins 100 jours.

On cherche $P(x_1 \ge 100 \text{ et } x_2 \ge 100)$

Comme les deux serveurs sont indépendants, $f_{x_1,x_2} = f_{x_1}(u) * f_{x_2}(u)$ et donc :

$$e^{-2/3} * e^{-2/3} = e^{-4/3}$$

Corrigé Etudiant - TIC 14 décembre 2021