

EXERCISE 4.6

1. If α, β are the roots of $3x^2 - 2x + 4 = 0$ Then find

(i) $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} = ?$

Sol. $3x^2 - 2x + 4 = 0$

$a = 3 \quad b = -2 \quad c = 4$

$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-2)}{3} = \frac{2}{3}$

$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{4}{3}$

$\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} = \frac{\beta^2 + \alpha^2}{\alpha^2\beta^2} = \frac{\alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta - 2\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2}$
 $= \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2}$

$= \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2 \times \left(\frac{4}{3}\right)}{\left(\frac{4}{3}\right)^2}$

$= \left(\frac{4}{9} - \frac{8}{3}\right) \times \frac{9}{16}$

$= \left(\frac{4 - 24}{9}\right) \times \frac{9}{16} = \frac{-20}{16} = -\frac{5}{4}$

(ii) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta}$

$= \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2\left(\frac{4}{3}\right)}{\frac{4}{3}}$

$= \left(\frac{4}{9} - \frac{8}{3}\right) \times \frac{3}{4} = \frac{4 - 24}{9} \times \frac{3}{4}$

$= -\frac{20}{9} \times \frac{3}{4} = -\frac{5}{3}$

(iii) $\alpha^4 + \beta^4 = \{(\alpha^2)^2 + (\beta^2)^2 + 2\alpha^2\beta^2 - 2\alpha^2\beta^2\}$

$= (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2(\alpha\beta)^2$

$= [(\alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta) - 2\alpha\beta]^2 - 2(\alpha\beta)^2$

$= [(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta]^2 - 2(\alpha\beta)^2$

$= \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2\left(\frac{4}{3}\right)\right]^2 - 2\left(\frac{4}{3}\right)^2$

$= \left(\frac{4}{9} - \frac{8}{3}\right)^2 - \frac{32}{9}$

$= \left(\frac{4 - 24}{9}\right)^2 - \frac{32}{9} = \frac{400}{81} - \frac{32}{9}$

$= \frac{400 - 288}{81} = \frac{112}{81}$

(iv) $\alpha^3 + \beta^3 = [\alpha^3 + \beta^3 + 3\alpha\beta(\alpha + \beta) - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)]$

$= (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$

$= \left(\frac{2}{3}\right)^3 - 3\left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)$

$= \frac{8}{27} - \frac{8}{3} = \frac{8 - 72}{27} = -\frac{64}{27}$

(v) $\frac{1}{\alpha^3} + \frac{1}{\beta^3} = \frac{\beta^3 + \alpha^3}{\alpha^3\beta^3}$

$= \frac{[(\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)]}{(\alpha\beta)^3}$

$= \frac{\left[\left(\frac{2}{3}\right)^3 - 3\left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)\right]}{\left(\frac{4}{3}\right)^3}$

$= \left(\frac{8}{27} - \frac{8}{3}\right) \times \frac{27}{64} = \left(\frac{8 - 72}{27}\right) \times \frac{27}{64}$

$= -\frac{64}{27} \times \frac{27}{64} = -1$

(vi) $\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha + \beta)(\alpha - \beta)$

$= (\alpha + \beta) \sqrt{(\alpha - \beta)^2}$

$= (\alpha + \beta) \sqrt{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta}$

$= \left(\frac{2}{3}\right) \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 4\left(\frac{4}{3}\right)}$

$= \frac{2}{3} \sqrt{\frac{4}{9} - \frac{16}{3}} = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{4 - 48}{9}}$

$= \frac{2}{3} \sqrt{-\frac{44}{9}} = \frac{2}{3} \frac{\sqrt{11}i}{3}$

2. If α, β are the roots of

$x^2 - px - p - c = 0$ Then prove

That $(1 + \alpha)(1 + \beta) = 1 - c$

Sol. $x^2 - px - p - c = 0$

$A = 1 \quad B = -p \quad C = -p - c$

$\alpha + \beta = -\frac{B}{A} = -\frac{(-p)}{1} = p$

$\alpha\beta = \frac{C}{A} = \frac{-p - c}{1} = -p - c$

L.H.S. $= (1 + \alpha)(1 + \beta)$

$= 1 + \beta + \alpha + \alpha\beta$

$= 1 + p - p - c = 1 - c = R.H.S.$

3. Find condition.....

(i) $x^2 + px + q = 0$

$a = 1 \quad b = p \quad c = q$

Let $\alpha, 2\alpha$ be the roots of the eq

$S = \alpha + 2\alpha = -\frac{b}{a} = -\frac{p}{1} = -p$

$3\alpha = -p \Rightarrow \alpha = -\frac{p}{3}$

$P = \alpha(2\alpha) = \frac{c}{a} = \frac{q}{1} = q$

$2\alpha^2 = q \Rightarrow 2\left(-\frac{p}{3}\right)^2 = q$

$\Rightarrow 2\frac{p^2}{9} = q \Rightarrow 2p^2 = 9q$

which is reqd. condition

(ii) Square of the other

Let α, α^2 be the roots of the eq

$$S = \alpha + \alpha^2 = -\frac{b}{a} = -\frac{p}{1} = -p$$

$$P = \alpha(\alpha^2) = \frac{c}{a} = \frac{q}{1} = q$$

$$(\alpha + \alpha^2)^3 = (-p)^3$$

$$\alpha^3 + (\alpha^2)^3 + 3\alpha\alpha^2(\alpha + \alpha^2) = -p^3$$

$$\alpha^3 + (\alpha^3)^2 + 3\alpha^3(\alpha + \alpha^2) = -p^3$$

$$q + q^2 + 3q(-p) + p^3 = 0$$

$$q + q^2 - 3pq + p^3 = 0$$

which is reqd condition

(iii) Additive inverse of other

Sol. Let $\alpha, -\alpha$ be the roots of eq

$$S = \alpha + (-\alpha) = -\frac{p}{1} = -p \Rightarrow p = 0$$

$$P = \alpha(-\alpha) = \frac{q}{1} = q \Rightarrow -\alpha^2 = q$$

So $p = 0$ is the reqd condition

(iv) Multiplicative inverse of the

Sol. Let $\alpha, \frac{1}{\alpha}$ be the roots of the eq

$$S = \alpha + \frac{1}{\alpha} = -\frac{p}{1} = -p$$

$$P = \alpha\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{q}{1} = q$$

$\Rightarrow q = 1$ is reqd condition.

4. If the roots -----

$$\text{Sol. } x^2 - px + q = 0$$

$$a = 1 \quad b = -p \quad c = q$$

Let α, β be the roots of the eq

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-p)}{1} = p$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{q}{1} = q$$

By given condition

$$\alpha - \beta = 1 \Rightarrow (\alpha - \beta)^2 = 1$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 1$$

$$\Rightarrow p^2 - 4q = 1$$

$$\Rightarrow p^2 = 4q + 1$$

5. Find the conditions....

$$\text{Sol. } \frac{a}{x-a} + \frac{b}{x-b} = 5$$

Multiplying both sides by

$(x-a)(x-b)$ we get

$$a(x-b) + b(x-a) = 5(x-a)(x-b)$$

$$\Rightarrow ax - ab + bx - ab = 5x^2 - 5bx - 5ax + 5ab$$

$$\Rightarrow -5x^2 + 6ax + 6bx - 7ab = 0$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 6(a+b)x + 7ab = 0$$

$$A = 5 \quad B = -6(a+b) \quad C = 7ab$$

Let $\alpha, -\alpha$ be the roots of the eq

$$S = \alpha + (-\alpha) = -\left[-\frac{6(a+b)}{5}\right]$$

$$0 = \frac{6}{5}(a+b) \Rightarrow a+b = 0$$

$$P = \alpha(-\alpha) = \frac{7ab}{5} \Rightarrow \alpha^2 = -\frac{7ab}{5}$$

So $a+b=0$ is reqd condition

6. If the roots -----

$$\text{Prove that } \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} + \sqrt{\frac{q}{p}} = 0$$

$$\text{Sol. } px^2 + qx + q = 0$$

$$a = p \quad b = q \quad c = q$$

Let α, β be the roots of the eq

$$\alpha + \beta = -\frac{q}{p} \quad \alpha\beta = \frac{q}{p}$$

$$\text{L.H.S.} = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} + \sqrt{\frac{q}{p}}$$

$$= \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{\alpha\beta}} + \sqrt{\frac{q}{p}}$$

$$= \frac{-q/p}{\sqrt{q/p}} + \sqrt{\frac{q}{p}}$$

$$= -\sqrt{\frac{q}{p}} + \sqrt{\frac{q}{p}} = 0 = \text{R.H.S.}$$

7. If α, β are the -----

$$(i) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$S = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$= \left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 2\left(\frac{c}{a}\right)$$

$$= \frac{b^2}{a^2} - \frac{2c}{a} = \frac{b^2 - 2ac}{a^2}$$

$$P = (\alpha\beta)^2 = \left(\frac{c}{a}\right)^2 = \frac{c^2}{a^2}$$

Required quadratic Eq.

$$y^2 - Sy + P = 0$$

$$\Rightarrow y^2 - \left(\frac{b^2 - 2ac}{a^2}\right)y + \frac{c^2}{a^2} = 0$$

$$\Rightarrow ay^2 - (b^2 - 2ac)y + c^2 = 0$$

$$(ii) \quad \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$$

$$S = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta} = \frac{-b/a}{c/a} = -\frac{b}{c}$$

$$P = \left(\frac{1}{\alpha}\right)\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{c/a} = \frac{a}{c}$$

Reqd eq $y^2 - Sy + P = 0$
 $\Rightarrow y^2 - (-\frac{b}{c})y + \frac{a}{c} = 0$
 $\Rightarrow cy^2 + by + a = 0$

(iii) $\frac{1}{\alpha^2}, \frac{1}{\beta^2}$
 $S = \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} = \frac{\beta^2 + \alpha^2}{\alpha^2 \beta^2}$
 $= \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{(\alpha\beta)^2} = \frac{(-\frac{b}{a})^2 - 2\frac{c}{a}}{(\frac{c}{a})^2}$
 $= (\frac{b^2}{a^2} - \frac{2c}{a}) \frac{a^2}{c^2} = (\frac{b^2 - 2ac}{a^2}) \frac{a^2}{c^2}$
 $P = \frac{1}{\alpha^2} \cdot \frac{1}{\beta^2} = \frac{1}{(\alpha\beta)^2} = \frac{1}{(\frac{c}{a})^2} = \frac{a^2}{c^2}$

Reqd eq $y^2 - Sy + P = 0$
 $y^2 - (\frac{b^2 - 2ac}{c^2})y + \frac{a^2}{c^2} = 0$
 $\Rightarrow cy^2 - (b^2 - 2ac)y + a^2 = 0$
 (iv) α^3, β^3

$S = \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$
 $= (-\frac{b}{a})^3 - 3(\frac{c}{a})(-\frac{b}{a})$
 $= -\frac{b^3}{a^3} + \frac{3bc}{a^2} = \frac{-b^3 + 3abc}{a^3}$
 $P = \alpha^3 \beta^3 = (\alpha\beta)^3 = (\frac{c}{a})^3 = \frac{c^3}{a^3}$

Reqd eq $y^2 - Sy + P = 0$
 $y^2 - (\frac{3abc - b^3}{a^3})y + \frac{c^3}{a^3} = 0$
 $\Rightarrow ay^2 - (3abc - b^3)y + c^3 = 0$

(v) $\frac{1}{\alpha^3}, \frac{1}{\beta^3}$
 $S = \frac{1}{\alpha^3} + \frac{1}{\beta^3} = \frac{\beta^3 + \alpha^3}{\alpha^3 \beta^3}$
 $= \frac{\alpha^3 + \beta^3 + 3\alpha\beta(\alpha + \beta) - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)}{(\alpha\beta)^3}$
 $= \frac{(\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)}{(\alpha\beta)^3}$
 $= \frac{(-\frac{b}{a})^3 - 3(\frac{c}{a})(-\frac{b}{a})}{(\frac{c}{a})^3}$
 $= (\frac{-b^3 + 3abc}{a^3}) \frac{a^3}{c^3} = \frac{3abc - b^3}{c^3}$
 $P = \frac{1}{\alpha^3} \cdot \frac{1}{\beta^3} = \frac{1}{(\alpha\beta)^3} = \frac{1}{(\frac{c}{a})^3} = \frac{a^3}{c^3}$

Reqd Eq $y^2 - Sy + P = 0$
 $y^2 - (\frac{3abc - b^3}{c^3})y + \frac{a^3}{c^3} = 0$
 $\Rightarrow cy^2 - (3abc - b^3)y + a^3 = 0$

(vi) $\alpha + \frac{1}{\alpha}, \beta + \frac{1}{\beta}$
 $S = \alpha + \frac{1}{\alpha} + \beta + \frac{1}{\beta} = \alpha + \beta + \frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta}$
 $= (-\frac{b}{a}) + \frac{-b/a}{c/a} = \frac{-bc - ab}{ac}$

$P = (\alpha + \frac{1}{\alpha})(\beta + \frac{1}{\beta})$
 $= \alpha\beta + \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} + \frac{1}{\alpha\beta}$
 $= \frac{(\alpha\beta)^2 + \alpha^2 + \beta^2 + 1}{\alpha\beta}$
 $= \frac{[(\alpha\beta)^2 + (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta + 1]}{\alpha\beta}$
 $= \frac{[(\frac{c}{a})^2 + (-\frac{b}{a})^2 - 2\frac{c}{a} + 1]}{\frac{c}{a}}$
 $= (\frac{c^2 + b^2 - 2ac + a^2}{a^2}) \frac{a}{c}$

Reqd Eq $y^2 - Sy + P = 0$
 $y^2 - (\frac{-ab - bc}{ac})y + \frac{a^2 + b^2 + c^2 - 2ac}{ac} = 0$
 $\Rightarrow acy^2 + b(a+c)y + b^2 + (a-c)^2 = 0$

(vii) $(\alpha - \beta)^2, (\alpha + \beta)^2$
 $S = (\alpha - \beta)^2 + (\alpha + \beta)^2$
 $= \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta + (\alpha + \beta)^2$
 $= \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta - 4\alpha\beta + (\alpha + \beta)^2$
 $= (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta + (\alpha + \beta)^2$
 $= 2(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$
 $= 2(-\frac{b}{a})^2 - 4(\frac{c}{a})$
 $= \frac{2b^2}{a^2} - \frac{4c}{a} = \frac{2b^2 - 4ac}{a^2}$

$P = (\alpha - \beta)^2 (\alpha + \beta)^2$
 $= [(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta](\alpha + \beta)^2$
 $= [(-\frac{b}{a})^2 - 4\frac{c}{a}](\frac{c}{a})^2$
 $= (\frac{b^2 - 4ac}{a^2}) \frac{b^2}{a^2}$

Reqd Eq $y^2 - Sy + P = 0$
 $\Rightarrow y^2 - (\frac{2b^2 - 4ac}{a^2})y + \frac{b^2(b^2 - 4ac)}{a^4} = 0$
 $\Rightarrow ay^2 - 2a^2(b^2 - 4ac)y + b^2(b^2 - 4ac) = 0$

(viii) $-\frac{1}{\alpha^3}, -\frac{1}{\beta^3}$
 $S = -\frac{1}{\alpha^3} + (-\frac{1}{\beta^3}) = -(\frac{\beta^3 + \alpha^3}{\alpha^3 \beta^3})$

$$S = - \left[\frac{(\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)}{(\alpha\beta)^3} \right]$$

$$= - \left[\left(-\frac{b}{a} \right)^3 - 3 \left(\frac{c}{a} \right) \left(-\frac{b}{a} \right) \right] / \left(\frac{c}{a} \right)^3$$

$$= - \left[-\frac{b^3}{a^3} + \frac{3bc}{a^2} \right] \frac{a^3}{c^3}$$

$$= - \left[\frac{-b^3 + 3abc}{a^3} \right] \frac{a^3}{c^3} = \frac{-3abc + b^3}{c^3}$$

$$P = \left(-\frac{1}{\alpha} \right) \left(-\frac{1}{\beta} \right) = \frac{1}{(\alpha\beta)^3} = \frac{1}{(c/a)^3} = \frac{a^3}{c^3}$$

Reqd Eq $y^2 - Sy + P = 0$

$$y^2 - \left(\frac{b^3 - 3abc}{c^3} \right) y + \frac{a^3}{c^3} = 0$$

$$\Rightarrow c^3 y^2 - (b^3 - 3abc)y + a^3 = 0$$

8. If α, β are the -----

Sol. $5x^2 - x - 2 = 0$

$$a = 5 \quad b = -1 \quad c = -2$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-1)}{5} = \frac{1}{5}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{-2}{5}$$

$$S = \frac{3}{\alpha} + \frac{3}{\beta} = 3 \left(\frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta} \right)$$

$$= 3 \left(\frac{1/5}{-2/5} \right) = -\frac{3}{2}$$

$$P = \left(\frac{3}{\alpha} \right) \left(\frac{3}{\beta} \right) = \frac{9}{\alpha\beta} = \frac{9}{-2/5} = -\frac{45}{2}$$

Reqd Eq $y^2 - Sy + P = 0$

$$\Rightarrow y^2 - \left(-\frac{3}{2} \right) y + \left(-\frac{45}{2} \right) = 0$$

$$\Rightarrow 2y^2 + 3y - 45 = 0$$

9. If α and β -----

Sol $x^2 - 3x + 5 = 0$

$$a = 1 \quad b = -3 \quad c = 5$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-3)}{1} = 3$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{5}{1} = 5$$

$$S = \frac{1-\alpha}{1+\alpha} + \frac{1-\beta}{1+\beta}$$

$$= \frac{(1-\alpha)(1+\beta) + (1+\alpha)(1-\beta)}{(1+\alpha)(1+\beta)}$$

$$= \frac{1+\beta-\alpha-\alpha\beta + 1-\beta+\alpha-\alpha\beta}{1+\beta+\alpha+\alpha\beta}$$

$$= \frac{2-2\alpha\beta}{1+\alpha+\beta+\alpha\beta} = \frac{2(1-\alpha\beta)}{1+(\alpha+\beta)+\alpha\beta}$$

$$S = \frac{2(1-5)}{1+3+5} = \frac{2(-4)}{9} = -\frac{8}{9}$$

$$P = \frac{(1-\alpha)(1-\beta)}{(1+\alpha)(1+\beta)} = \frac{1-\beta-\alpha+\alpha\beta}{1+\beta+\alpha+\alpha\beta}$$

$$= \frac{1-(\alpha+\beta)+\alpha\beta}{1+(\alpha+\beta)+\alpha\beta} = \frac{1-3+5}{1+3+5}$$

$$= \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Reqd Eq $y^2 - Sy + P = 0$

$$\Rightarrow y^2 - \left(-\frac{8}{9} \right) y + \frac{1}{3} = 0$$

$$\Rightarrow 9y^2 + 8y + 3 = 0$$