Guía de control de plagas y enfermedades (ficticia)

Material académico ficticio elaborado para el curso «Más allá de los chatbots». No es una publicación oficial ni reemplaza la asesoría de un ingeniero agrónomo.

Principio general

Una plaga no se diagnostica solo con una foto o una descripción. Observa varias plantas, anota qué parte está dañada y consulta a un técnico agrónomo antes de aplicar productos.

Tizón tardío de la papa

Se presenta con lluvias y alta humedad. Aparecen manchas oscuras en las hojas y pudrición en los tubérculos. Para reducir el riesgo: usar semilla sana, evitar el exceso de riego, mejorar el drenaje y retirar las plantas enfermas.

Gorgojo de los Andes

Es un insecto que daña los tubérculos de la papa con galerías. Se previene rotando cultivos, eliminando restos de cosecha y cosechando a tiempo.

Mancha chocolate del haba

Aparecen manchas marrones en hojas y tallos cuando hay humedad alta. Ayuda sembrar con más distancia, evitar el exceso de nitrógeno y rotar el cultivo.

Mildiu de la quinua

Produce manchas amarillentas en las hojas y se favorece con humedad. Se reduce con densidad de siembra adecuada, variedades tolerantes y buena aireación del campo.

Manejo integrado

Combina prácticas: rotación de cultivos, semilla sana, monitoreo semanal, control de malezas y uso de productos solo cuando sea necesario, siguiendo las indicaciones de la etiqueta y las normas de SENASAG.