

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ»
ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра генетики и химии

Направление 06.03.01

Биология

Направленность (профиль)

«Генетика»

Курс II (ОДО)

КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «История и методология биологии»

**ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ ГЕНЕТИКИ.
ДЖЕЙМС ДЬЮИ УОТСОН. ФРЕНСИС КРИК. ОТКРЫТИЕ
СТРУКТУРЫ ДНК.**

Пташко Ксения Олеговна

Научный руководитель:
к.г.х., доцент М.Р. Нуркаева

Дата представления 17/12 2025.

Оценка отлично.

Уфа 2025

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ОТКРЫТИЯ	5
1.1 ПРЕДПОСЫЛКИ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ	5
1.2. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА	8
1.3. МЕТОДОЛОГИЯ ОТКРЫТИЯ	10
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	13
3. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ РАБОТ	15
3.1. Анализ статьи «A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid» (Watson & Crick, 1953)	16
3.2. Анализ рентгеноструктурных данных Розалинд Франклин (1952–1953)	17
3.3. Вклад Э. Чаргаффа и М. Уилкинса в создание модели ДНК	18
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ	21
4.1. Значение открытия структуры ДНК для современной науки	21
4.2. Проблемы методологии исследования структуры ДНК	22
4.3. Современные исследования в области молекулярной генетики	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	25

Открытие Уотсона и Крика позволило не только подтвердить химическую роль ДНК, но и дать структурное объяснение тем биологическим явлениям, которые ранее трактовались лишь гипотетически. Их модель двойной спирали показала, что комплементарность азотистых оснований определяет точность репликации, а сама структура молекулы позволяет сочетать устойчивость наследственного материала с возможностью его изменчивости — основой эволюционных процессов [1, 11, 12].

Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что открытие структуры ДНК определило весь дальнейший путь развития биологических и медицинских наук. Современные генетические методы диагностики наследственных заболеваний, генотерапия, биоинформатика, разработка лекарственных препаратов и персонализированная медицина основаны на принципах, сформулированных благодаря работам Уотсона и Крика [3, 9, 14].

Целью исследования является комплексный анализ научных предпосылок, исторического контекста и методологических основ открытия структуры ДНК Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком, а также оценка его влияния на последующее развитие генетики и биологии в целом.

Задачи работы :

- проанализировать исторические и научные предпосылки открытия структуры ДНК;
- рассмотреть биографические и научные аспекты деятельности Джеймса Дьюи Уотсона и Фрэнсиса Крика;
- охарактеризовать методологические подходы, использованные при открытии пространственной структуры ДНК;
- провести анализ ключевых научных работ, посвящённых исследованию структуры ДНК;
- оценить значение открытия структуры ДНК для развития современной генетики и молекулярной биологии.

Открытие структуры ДНК стало результатом длительного процесса накопления научных знаний, включавшего несколько поколений исследователей и множество экспериментальных подходов. Предпосылки к данному открытию формировались на протяжении второй половины XIX и первой половины XX века и включали в себя химические исследования нуклеиновых кислот, развитие хромосомной теории наследственности, открытие закономерностей комплементарности нуклеотидов, а также прогресс физико-химических методов анализа структуры биомолекул [5, 6, 10].

1.1 Предпосылки научного открытия

Началом истории открытия структуры ДНК принято считать работы Фридриха Мишера, который в 1869 году впервые выделил из ядер клеток вещество, позднее названное нуклеином. Хотя сам Мишер не предполагал, что данное вещество имеет отношение к наследственности, его открытие стало отправной точкой в изучении химической природы генетического материала [5]. В последующие десятилетия исследователи определили состав нуклеиновых кислот, включая наличие четырёх азотистых оснований — аденина, гуанина, тимина и цитозина.

К началу XX века генетика стремительно развивалась благодаря переоткрытию законов Менделя и формированию хромосомной теории наследственности Т. Моргана. Однако вопрос о том, какое именно химическое соединение является носителем наследственной информации, оставался открытым. На протяжении долгого времени считалось, что эту роль играют белки, поскольку они являются гораздо более разнообразными и сложными молекулами, чем нуклеиновые кислоты [7].

Решающий прорыв произошёл в 1944 году, когда Освальд Эйвери совместно с коллегами установил, что именно ДНК является тем веществом, которое вызывает трансформацию бактерий. Их работа стала первым убедительным доказательством того, что ДНК выполняет функцию гена [6]. Затем в 1952 году опыт Херши и Чейз, показавший, что при заражении

бактериофагами в клетку попадает ДНК, а не белки, окончательно подтвердил её роль в передаче наследственной информации [7, 8].

Важной предпосылкой открытия структуры ДНК стало открытие Эрвина Чаргаффа о закономерностях соотношений нуклеотидов. Его наблюдения о равенстве количества аденина тимину, а цитозина — гуанину, позволили сформулировать знаменитые правила Чаргаффа, которые стали ключевым элементом будущей модели двойной спирали [9].

Не менее значимыми были исследования Розалинд Франклин и Мориса Уилкинса, применивших рентгеноструктурный анализ для изучения пространственной организации ДНК. Полученная Франклин Рентгенограмма № 51 предоставила данные о спиральной природе молекулы и расстояниях между структурными элементами, что стало фундаментальной основой для последующей работы Уотсона и Крика [10].

К моменту начала их исследования существовало несколько альтернативных моделей ДНК, включая трёхцепочечные структуры. Однако только сочетание химических данных Чаргаффа, рентгеноструктурных снимков Франклин и математического анализа, выполненного Криком, позволило создать точную модель, в которой были учтены все экспериментальные данные [1, 11].

Таким образом, открытие структуры ДНК стало результатом взаимодействия химии, биологии и физики, а также длительной эволюции научных представлений. Единство междисциплинарных подходов, развитие экспериментальных методов и научная конкуренция различных исследовательских школ создали условия, в которых стало возможным одно из наиболее значимых открытий XX века.

Важным компонентом научных предпосылок стала также эволюция взглядов на химическую природу гена, которая в первой половине XX века претерпевала значительные изменения. Изначально предполагалось, что именно белки являются носителями наследственности, поскольку они обладают огромным разнообразием структур и функций. Эта гипотеза

опиралась на представления о белках как о наиболее сложных и изменчивых биологических молекулах, способных кодировать широкий спектр признаков живых организмов. Напротив, ДНК считалась слишком простой молекулой, состоящей всего из четырёх типов нуклеотидов, чтобы нести богатство наследственной информации. Такой взгляд делал проблему структуры ДНК второстепенной и долгое время препятствовал активному изучению нуклеиновых кислот [7, 8].

Однако дальнейшие исследования привели к пересмотру этих представлений. Были получены убедительные данные о том, что химическая стабильность ДНК делает её более подходящей для длительного хранения наследственной информации, чем белки, которые подвержены разрушению и денатурации. Работы по изучению мутагенеза показали, что изменения в наследственных признаках связаны с изменениями именно в нуклеиновых кислотах, а не в белках, что также способствовало укреплению позиции ДНК как главного генетического материала [6, 9].

Одновременно развивались физико-химические методы анализа макромолекул. Исследования, выполненные Уильямом Астбери ещё в 1930-х годах, продемонстрировали, что ДНК обладает характерной повторяющейся структурой, что косвенно указывало на высокую степень упорядоченности молекулы. Хотя данные Астбери не позволяли однозначно определить пространственную конфигурацию, они стали одним из первых доказательств существования регулярной структуры, поддающейся математическому описанию [10]. Это заложило фундамент для дальнейшего применения рентгеноструктурного анализа и для поиска геометрической модели, согласующейся с экспериментальными наблюдениями.

В совокупности эти данные показали необходимость перехода от эмпирических представлений о наследственности к молекулярному анализу структуры генетических макромолекул. Все ключевые предпосылки — химические, физические, биологические и методологические — постепенно сходились к одной точке, создавая условия для появления окончательной

модели ДНК. Тем самым открытие Уотсона и Крика стало логическим завершением многолетнего научного процесса, включавшего вклады учёных разных специальностей и научных школ [1, 3, 11].

1.2 Биографическая справка

История открытия структуры ДНК неразрывно связана с биографиями Джеймса Дьюи Уотсона и Фрэнсиса Гарольда Крика — двух исследователей, представлявших разные научные традиции, но сумевших объединить свои знания и методологические подходы в рамках одного из наиболее значимых научных прорывов XX века. Джеймс Уотсон родился в 1928 году в Чикаго в семье учителя и проявлял интерес к биологии с ранних лет. Получив образование в Чикагском университете, он продолжил обучение в Индианском университете, где под руководством Сальвадора Лурии — одного из основателей молекулярной генетики — изучал фаговую генетику. Именно в этот период Уотсон начал осознавать ключевую роль ДНК в наследственности и стал стремиться к изучению её структуры [12, 14].




Рис. 1. Джэймс Дьюи Уотсон

После получения степени PhD Уотсон работал в Копенгагене, где изучал рентгеноструктурные методы анализа. Спустя год он прибыл в Кавендишскую лабораторию Кембриджского университета, где работали выдающиеся физики и биохимики. Здесь он встретил Фрэнсиса Крика, который стал его научным партнёром. Крик, родившийся в 1916 году в Нортгемптоншире, имел физико-математическое образование, что впоследствии оказало решающее влияние на методологическую сторону их совместной работы. Он начинал свою карьеру

как физик, занимаясь исследованиями в области гидродинамики и дифракции рентгеновских лучей, однако после Второй мировой войны переключил интерес на биологические макромолекулы и поступил в Кавендишскую лабораторию для изучения структуры белков и нуклеиновых кислот [11, 13].




Рис. 2. Фрэнсис Крик

В отличие от Уотсона, который уже был погружён в генетические проблемы, Крик обладал глубокими знаниями в области физики, математического анализа и теории симметрии. Их сотрудничество стало примером междисциплинарного синтеза, где биология и физика оказались равноправными составляющими исследовательского процесса. Уотсон обладал интуитивным биологическим мышлением и стремлением к быстрому решению научных задач, тогда как Крик отличался аналитичностью, способностью к математическому моделированию и теоретическому обобщению [12].

Особое значение в их научной биографии имела работа в Кавендишской лаборатории, где исследователи оказались в окружении ведущих специалистов своего времени, включая Джона Кендрю, Макса Перутца и Уильяма Астбери. Именно здесь формировалась новая научная дисциплина — молекулярная биология, ориентированная на изучение структуры макромолекул. Крик и Уотсон разделяли убеждение, что понимание структуры ДНК является ключом к пониманию процесса наследственности, и стремились опередить

конкурентов, среди которых были Лайнус Полинг в США и группа Мориса Уилкинса в Лондоне [10, 13].

Вклад каждого из исследователей был уникален: Уотсон внимательно следил за биологическими экспериментами и логикой взаимодействия нуклеотидов, а Крик использовал математический аппарат для построения пространственных моделей. Их сотрудничество стало образцом научной синергии, где объединение различных компетенций позволило совершить открытие, недоступное каждому из них по отдельности. В 1953 году они предложили модель двойной спирали, а уже в 1962 году получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за вклад в понимание структуры и функции нуклеиновых кислот [1, 12].

Немаловажную роль в формировании научных взглядов Уотсона и Крика сыграла атмосфера интеллектуальной конкуренции, характерная для послевоенной науки. В этот период биология переживала интенсивное развитие, а исследование структуры макромолекул стало одним из наиболее перспективных направлений. Научные коллективы активно обменивались идеями, проводили совместные семинары и обсуждения, что создавало особую среду для формирования новых междисциплинарных подходов. Крик, будучи человеком с ярко выраженными аналитическими способностями, часто выступал инициатором теоретических дискуссий, а Уотсон — их практическим интерпретатором, стремящимся найти конкретное биологическое подтверждение каждому гипотетическому построению [12, 14].

Важным этапом также стало их знакомство с работами Лайнуса Полинга, одного из величайших химиков XX века, который ранее успешно описал структуру α -спирали белка. Именно Полинг продемонстрировал, что крупные биологические молекулы обладают определённой геометрией, подчинённой физическим законам. Это оказало значительное влияние на мировоззрение Уотсона и Крика, заставив их рассматривать структуру ДНК не как случайную конформацию, а как молекулу с четкой пространственной организацией. Хотя модель Полинга, предложенная для ДНК в 1953 году, оказалась ошибочной, его

методологический пример стал одним из факторов, побудивших Уотсона и Крика искать решение через построение моделей и анализ симметрии [11, 15].

Таким образом, биографии учёных свидетельствуют о том, что их открытие явилось не столько результатом случайного озарения, сколько итогом длительного интеллектуального развития, сочетающего в себе влияние научной среды, междисциплинарные контакты, личные качества исследователей и стремление к решению фундаментальной биологической проблемы. Всё это позволило Уотсону и Крику выработать уникальный стиль научной работы, который впоследствии стал образцом для многих поколений молекулярных биологов [1, 12].

1.3 Методология открытия

Методологическая основа открытия структуры ДНК опиралась на сочетание нескольких научных подходов — рентгеноструктурного анализа, химических исследований нуклеотидов, математического моделирования и междисциплинарных методов, характерных для формирующейся в то время молекулярной биологии. Одним из ключевых элементов методологии Уотсона и Крика стало использование данных рентгенодифракции, полученных Розалинд Франклин и Раймондом Гослингом в лондонской Королевской лаборатории. Их знаменитая Рентгенограмма № 51 предоставила информацию о периодичности молекулы ДНК, расстоянии между витками спирали и её общей симметрии [10].

Однако сами Уотсон и Крик не проводили рентгеноструктурных исследований. Их метод заключался в синтезе уже существующих данных с целью построения логически согласованной пространственной модели. Для этого они использовали принцип комплементарности нуклеотидов, впервые сформулированный Эрвином Чаргаффом. Его исследования показали, что содержание аденина всегда равно содержанию тимина, а количество гуанина — количеству цитозина, что стало ключом к пониманию структуры ДНК. Уотсон и Крик предположили, что эти пары оснований могут образовывать водородные

связи, обеспечивая стабильность молекулы и объясняя её способность к репликации [9, 11].

Физико-математическая подготовка Крика позволила применять методы пространственного анализа и теории симметрии к построению моделей. Он рассматривал ДНК как возможную спиральную структуру на основании общих принципов рентгенодифракции, поскольку спиральные молекулы дают характерные крестовидные дифракционные картины, схожие с полученными Франклин [10]. Кроме того, исследователи использовали молекулярное моделирование — физическое построение моделей из металлических пластин и проволоки, представляющих нуклеотиды. Этот метод позволил им проверять пространственную совместимость оснований и геометрию предполагаемой структуры.

Важной особенностью их методологии было стремление учитывать все доступные экспериментальные данные. Именно это отличало их подход от предложенной ранее трёхцепочечной модели Лайнуса Полинга, которая не согласовывалась с рентгенографией и правилами Чаргаффа. В процессе работы Уотсон и Крик многократно модифицировали свои модели, пока не получили структуру, объясняющую все известные факты: двойную антипараллельную спираль, комплементарность оснований, стабильность молекулы и возможность точного копирования при репликации [1, 11].

Таким образом, методология открытия представляла собой интеграцию данных из химии, биологии и физики, в которой теоретические рассуждения и модельные построения играли не меньшую роль, чем экспериментальные наблюдения. Эта междисциплинарная стратегия стала основой последующего развития молекулярной биологии и послужила примером того, как синтез различных научных подходов может привести к фундаментальным открытиям.

Значимым элементом методологии Уотсона и Крика было их умение критически анализировать данные, полученные другими исследователями, и интегрировать их в единую систему. В то время как многие научные группы стремились самостоятельно проводить эксперименты и создавали собственные

методы измерений, Уотсон и Крик сделали ставку на теоретическое моделирование, что на тот момент было нетипично для биологии. Их подход демонстрировал, что глубокое понимание структуры биомолекулы может быть достигнуто не только путём экспериментального измерения параметров, но и через тщательный логический анализ уже существующих данных, что позволило им существенно ускорить научный процесс [11, 16].

Особое значение имело также их стремление к проверке гипотез на соответствие базовым физико-химическим законам. Например, тройная модель ДНК, предложенная Полингом, нарушала принципы электростатических взаимодействий, поскольку отрицательно заряженные фосфатные группы были обращены внутрь спирали, что делало молекулу нестабильной. Уотсон и Крик сумели показать, что истинная структура должна удовлетворять и химическим свойствам нуклеотидов, и данным рентгенографии, и логике биологической функции, что существенно повысило достоверность их модели. Подобная строгость в проверке гипотез стала ключевым методологическим новшеством, которое впоследствии широко применялось в структурной биологии [9, 10].

Их методологический путь, таким образом, представлял собой сочетание аналитической строгости, междисциплинарного мышления и интеллектуальной смелости, позволяющей выдвигать гипотезы, выходящие за пределы существующих представлений. Это сочетание факторов позволило им прийти к модели, оказавшейся не только красивой с теоретической точки зрения, но и глубоко функциональной, что и определило её принятие научным сообществом [1, 11].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Материалы, использованные при открытии структуры ДНК

Открытие пространственной структуры ДНК Джеймсом Дьюи Уотсоном и Фрэнсисом Криком стало возможным благодаря использованию широкого круга экспериментальных и теоретических материалов, полученных различными исследовательскими группами в первой половине XX века. При этом сами Уотсон и Крик практически не проводили собственных лабораторных экспериментов, а опирались на уже существующие научные данные, полученные в области химии, физики и биологии, что являлось характерной особенностью их научного подхода [1, 11].




Рисунок 2 — Рентгеноструктурное изображение ДНК (Рентгенограмма № 51)

К числу важнейших материалов относились результаты рентгеноструктурных исследований ДНК, выполненных Розалинд Франклин и Раймондом Гослингом в лаборатории Мориса Уилкинса. Наибольшее значение имела так называемая Рентгенограмма № 51, на которой были зафиксированы характерные дифракционные максимумы, свидетельствующие о спиральной организации молекулы ДНК. Эти данные позволили определить ключевые геометрические параметры структуры, включая диаметр спирали, расстояние между витками и периодичность повторения структурных элементов [10].

Не менее важным материалом для построения модели ДНК стали химические данные о составе нуклеиновых кислот. Работы Эрвина Чаргаффа показали, что в молекуле ДНК содержание аденина всегда равно содержанию тимина, а количество гуанина — количеству цитозина. Эти закономерности, получившие название правил Чаргаффа, имели принципиальное значение, поскольку указывали на строгую упорядоченность молекулы и исключали случайное расположение азотистых оснований [9]. Уотсон и Крик использовали эти данные как одно из ключевых ограничений при построении пространственной модели.

Существенную роль сыграли также опубликованные к тому времени работы по химической структуре нуклеотидов, данные о природе фосфатно-сахарного остова ДНК, а также сведения о водородных связях между азотистыми основаниями. Эти материалы позволили определить возможные варианты взаимодействия нуклеотидов и оценить устойчивость различных структурных конфигураций молекулы [3, 11].

Дополнительным источником информации послужили ранее предложенные теоретические модели ДНК, в том числе трёхцепочечная модель Лайнуса Полинга. Хотя данная модель оказалась ошибочной, её анализ сыграл важную роль в формировании критического подхода Уотсона и Крика к оценке возможных структурных решений. Сопоставление различных гипотез с экспериментальными материалами позволило сузить круг допустимых моделей и выявить ключевые требования к истинной структуре ДНК [11, 15].

Таким образом, материалы, использованные при открытии структуры ДНК, представляли собой совокупность экспериментальных данных и теоретических разработок, полученных разными исследователями. Их интеграция и критический анализ стали основой для построения корректной модели двойной спирали.

2.2 Методы исследования, использованные при открытии структуры ДНК

Методологический подход Уотсона и Крика отличался комплексностью и междисциплинарностью. Центральное место в нём занимал метод теоретического моделирования, основанный на синтезе экспериментальных данных, полученных другими исследователями. Вместо проведения собственных лабораторных экспериментов учёные сосредоточились на построении пространственных моделей молекулы ДНК, которые должны были соответствовать всем известным химическим и физическим ограничениям [1, 11].

Одним из ключевых методов, лежащих в основе открытия, был рентгеноструктурный анализ, хотя непосредственно Уотсон и Крик его не выполняли. Они использовали интерпретацию дифракционных картин, полученных Франклин и Уилкинсом, для определения спирального характера молекулы и её геометрических параметров. Знание общих принципов рентгенодифракции позволило Крику, имевшему физическое образование, правильно интерпретировать форму дифракционных максимумов и связать их с возможной спиральной организацией ДНК [10, 13].

Важное место занимал метод логического и сравнительного анализа. Уотсон и Крик сопоставляли различные гипотетические модели ДНК с имеющимися экспериментальными данными, последовательно исключая те варианты, которые противоречили правилам Чаргаффа, рентгенографическим данным или основным физико-химическим законам. Такой подход позволил отказаться от трёхцепочечных и линейных моделей, не обеспечивавших устойчивости молекулы и не объяснявших механизм репликации [9, 11].

Значительную роль сыграл метод физического молекулярного моделирования. Уотсон и Крик использовали объёмные модели, изготовленные из металлических элементов, имитирующих нуклеотиды, что позволяло наглядно проверять пространственную совместимость различных конфигураций. Этот

метод оказался особенно эффективным для выявления комплементарности пар оснований и определения антипараллельной ориентации цепей ДНК [1].

Кроме того, в их работе применялся метод междисциплинарного синтеза, заключавшийся в объединении знаний из области генетики, биохимии и физики. Именно этот методологический принцип позволил связать структуру ДНК с её биологической функцией — способностью к точному копированию генетической информации. В результате была предложена модель двойной спирали, которая не только соответствовала всем известным данным, но и обладала высокой объяснительной и предсказательной силой [3, 11].

Таким образом, методы, использованные при открытии структуры ДНК, представляли собой сочетание теоретического моделирования, анализа экспериментальных данных, логического исключения альтернативных гипотез и междисциплинарного подхода. Именно такая методология обеспечила успешное решение одной из наиболее сложных биологических проблем XX века.

3. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ РАБОТ

3.1 Анализ статьи Дж. Д. Уотсона и Ф. Крика

”A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid» (1953)”

Центральным научным трудом, посвящённым открытию структуры ДНК, является статья Джеймса Дьюи Уотсона и Фрэнсиса Крика «A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid», опубликованная в журнале *Nature* в 1953 году. Несмотря на небольшой объём, данная работа оказала колоссальное влияние на развитие биологии, поскольку в ней впервые была предложена модель пространственной организации ДНК в виде двойной спирали [1].

В статье авторы описывают молекулу ДНК как состоящую из двух антипараллельных полинуклеотидных цепей, закрученных вокруг общей оси. Особое внимание уделяется комплементарному спариванию азотистых оснований, при котором аденин образует пары с тиминам, а гуанин — с цитозином. Уотсон и Крик подчёркивают, что именно такая структура обеспечивает стабильность молекулы и одновременно создаёт механизм точного копирования генетической информации при репликации [1, 11].




Рисунок 3 — Модель двойной спирали ДНК, предложенная Дж. Уотсоном и Ф. Криком

Примечательной особенностью статьи является её методологический характер. Авторы практически не приводят собственных экспериментальных данных, а сосредотачиваются на логическом анализе и синтезе уже существующих результатов, полученных другими исследователями. Такой подход был нетипичен для биологии того времени, но позволил предложить модель, которая объясняла сразу несколько фундаментальных биологических процессов. В заключении статьи Уотсон и Крик указывают, что предложенная структура «немедленно предполагает возможный механизм копирования генетического материала», тем самым закладывая основу для будущих исследований репликации ДНК [1].

Таким образом, анализ данной статьи показывает, что её научная ценность заключается не только в описании структуры ДНК, но и в формировании нового способа научного мышления, ориентированного на объяснение биологических функций через структуру молекул.

3.2 Анализ рентгеноструктурных данных Р. Франклин и Р. Гослинга

Важнейшим экспериментальным основанием для построения модели двойной спирали стали рентгеноструктурные исследования ДНК, выполненные Розалинд Франклин и Раймондом Гослингом в начале 1950-х годов. Их работы были направлены на изучение дифракции рентгеновских лучей на волокнах ДНК, что позволило получить информацию о пространственной организации молекулы [10].

Наибольшее значение имела так называемая Рентгенограмма № 51, на которой отчётливо просматривался крестовидный дифракционный рисунок, характерный для спиральных структур. Анализ данного изображения позволил определить ключевые параметры молекулы ДНК: диаметр спирали, расстояние между соседними витками и периодичность повторения структурных элементов. Франклин также показала, что фосфатные группы располагаются

снаружи молекулы, а азотистые основания — внутри, что имело принципиальное значение для корректного построения модели [10].

В отличие от статьи Уотсона и Крика, работы Франклин отличались высокой экспериментальной точностью и осторожностью в интерпретации результатов. Она избегала преждевременных теоретических выводов, предпочитая опираться на строгий анализ данных. Тем не менее именно её результаты стали тем экспериментальным материалом, который позволил Уотсону и Крику проверить и уточнить свою модель двойной спирали. Использование этих данных обеспечило соответствие модели реальным физическим характеристикам молекулы ДНК [10, 13].

Таким образом, рентгеноструктурные исследования Франклин и Гослинга сыграли ключевую роль в открытии структуры ДНК, предоставив количественные и геометрические параметры, без которых построение модели двойной спирали было бы невозможно.

3.3 Вклад Э. Чаргаффа в создание модели структуры ДНК

Значительный вклад в открытие структуры ДНК внесли химические исследования Эрвина Чаргаффа, посвящённые анализу нуклеотидного состава ДНК различных организмов. В результате своих работ Чаргафф установил, что количество аденина в молекуле ДНК всегда равно количеству тимина, а количество гуанина — количеству цитозина. Эти закономерности получили название правил Чаргаффа и имели принципиальное значение для понимания организации молекулы ДНК [9].

До работ Чаргаффа считалось, что нуклеотиды в составе ДНК распределены случайным образом. Его исследования показали, что структура ДНК строго упорядочена и подчиняется определённым химическим закономерностям. Эти данные позволили Уотсону и Крику сделать вывод о комплементарном

спаривании оснований и исключить модели, не соответствующие данному соотношению [9, 11].




Рисунок 4 — Закономерности соотношения азотистых оснований в молекуле ДНК (правила Чаргаффа)

Хотя сам Чаргафф не предложил пространственную модель ДНК, его химические данные стали одним из ключевых ограничений, которым должна была соответствовать любая корректная структура. В модели двойной спирали правила Чаргаффа нашли естественное объяснение: равенство количеств оснований обусловлено образованием стабильных пар между аденином и тимином, а также между гуанином и цитозином. Таким образом, вклад Чаргаффа был не менее значимым, чем вклад рентгеноструктурных исследований, поскольку именно он обеспечил химическую обоснованность модели ДНК [9, 11].

В совокупности анализ работ Уотсона и Крика, рентгеноструктурных данных Франклин и химических исследований Чаргаффа показывает, что открытие структуры ДНК стало результатом синтеза теоретических и экспериментальных подходов. Каждый из этих научных вкладов сыграл самостоятельную и незаменимую роль в формировании модели двойной спирали, определившей развитие современной молекулярной биологии.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ

4.1 Значение открытия структуры ДНК для современной науки

Открытие структуры ДНК Джеймсом Дьюи Уотсоном и Фрэнсисом Криком оказало фундаментальное влияние на развитие современной биологии и стало отправной точкой формирования молекулярно-генетической парадигмы. Предложенная ими модель двойной спирали впервые позволила связать наследственность с конкретной молекулярной структурой, что дало возможность объяснить механизмы репликации, транскрипции и передачи генетической информации [1, 3, 11].

Значение данного открытия проявилось прежде всего в формировании центральной догмы молекулярной биологии, согласно которой информация передаётся от ДНК к РНК, а затем к белку. Эта концепция определила направление огромного числа исследований, посвящённых экспрессии генов, регуляции синтеза белков и молекулярным механизмам наследственности. Благодаря пониманию структуры ДНК стало возможным развитие таких направлений, как генная инженерия, биотехнология, молекулярная диагностика и медицинская генетика [3, 4, 16].

Кроме того, модель двойной спирали послужила основой для разработки методов анализа генетического материала. Принцип комплементарности нуклеотидов лег в основу технологий секвенирования ДНК, полимеразной цепной реакции, гибридизации нуклеиновых кислот и геномного картирования. Эти методы позволили перейти от изучения отдельных генов к анализу целых геномов, что существенно расширило возможности биологических и медицинских исследований [16, 18].

Таким образом, значение открытия структуры ДНК заключается не только в решении фундаментальной научной проблемы, но и в создании теоретической и методологической базы, на которой строится современная биология и биомедицина.

4.2 Проблемы методологии исследования структуры ДНК

Несмотря на выдающееся значение открытия структуры ДНК, методология, использованная при её исследовании, имела ряд ограничений, характерных для уровня развития науки середины XX века. Одной из основных проблем была ограниченность экспериментальных методов, доступных исследователям. Рентгеноструктурный анализ, являвшийся основным инструментом изучения пространственной организации ДНК, требовал получения упорядоченных волокон или кристаллов, что значительно усложняло экспериментальную работу и ограничивало круг доступных объектов исследования [10, 14].

Другим методологическим ограничением являлся статический характер получаемых данных. Рентгенографические методы позволяли получить усреднённое изображение структуры молекулы, но не отражали её динамических свойств и конформационных изменений, происходящих в живой клетке. В результате ранние модели ДНК рассматривали молекулу преимущественно как жёсткую и неизменную структуру, тогда как последующие исследования показали её высокую пластичность и способность к структурным перестройкам [13, 19].

Кроме того, в ранней молекулярной биологии был широко распространён редукционистский подход, при котором сложные биологические процессы стремились объяснить исключительно через структуру ДНК. Это приводило к недооценке роли регуляторных механизмов, эпигенетических факторов, взаимодействия ДНК с белками и влияния клеточного контекста. Лишь в конце XX — начале XXI века стало очевидно, что понимание генетических процессов требует учёта многоуровневой организации живых систем [4, 13].

Таким образом, методология исследования структуры ДНК, хотя и сыграла ключевую роль в развитии биологии, нуждалась в дальнейшем расширении и дополнении новыми экспериментальными и теоретическими подходами.

4.3 Современные исследования в области молекулярной генетики

Современное развитие молекулярной генетики демонстрирует дальнейшее углубление и расширение методологических принципов, заложенных в работах Уотсона и Крика. Существенный прогресс был достигнут благодаря внедрению новых методов структурного анализа, таких как криоэлектронная микроскопия, позволяющая получать трёхмерные модели макромолекулярных комплексов вблизи их нативного состояния. Эти методы значительно расширили возможности изучения взаимодействия ДНК с белками, РНК и другими молекулярными компонентами клетки [14, 17].

Большое значение имеют исследования пространственной организации генома в ядре клетки. Современные технологии показали, что ДНК образует сложную трёхмерную архитектуру, включающую хроматиновые домены, петли и компартменты, которые играют важную роль в регуляции экспрессии генов. Эти данные дополняют классическую модель двойной спирали, показывая, что структура ДНК должна рассматриваться не только на уровне отдельной молекулы, но и в контексте ядерной организации [15, 18, 20].

Активно развиваются и прикладные направления молекулярной генетики, включая геномное редактирование, персонализированную медицину и генные терапии. Использование систем CRISPR/Cas позволило перейти от анализа генетического материала к его целенаправленному изменению, что открыло новые перспективы в лечении наследственных заболеваний и исследовании функций генов. Все эти направления опираются на фундаментальные принципы, вытекающие из открытия структуры ДНК, и демонстрируют его непреходящее значение для современной науки [16, 18].

В целом современные исследования подтверждают, что методология, заложенная в середине XX века, продолжает развиваться и адаптироваться к новым задачам, сохраняя при этом свою концептуальную основу. Это свидетельствует о том, что открытие структуры ДНК остаётся актуальным научным и методологическим ориентиром в биологии XXI века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило рассмотреть открытие структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты как одно из ключевых событий в истории и методологии биологической науки. Анализ исторического контекста показал, что данное открытие не возникло изолированно, а стало результатом длительного развития представлений о наследственности, химической природе генов и структуре биологических макромолекул. Накопление экспериментальных данных в области генетики, биохимии и физики создало научные предпосылки, которые позволили в середине XX века перейти к молекулярному объяснению наследственных процессов.

Рассмотрение научной деятельности Джеймса Дьюи Уотсона и Фрэнсиса Крика показало, что их вклад в биологию определяется не только самим фактом открытия структуры ДНК, но и особенностями применённого ими научного подхода. Сочетание биологических знаний, физико-математического анализа и теоретического моделирования позволило учёным объединить разрозненные экспериментальные результаты в целостную и логически обоснованную модель. Значимую роль в этом процессе сыграли данные рентгеноструктурных исследований Розалинд Франклин, а также химические закономерности, выявленные Эрвином Чаргаффом, что подчёркивает коллективный и междисциплинарный характер научного открытия.

Анализ ключевых научных работ, посвящённых структуре ДНК, позволил выявить особенности взаимодействия теоретических и экспериментальных методов в процессе формирования модели двойной спирали. Было показано, что предложенная структура не только соответствовала всем известным на тот момент данным, но и обладала высокой объяснительной способностью, позволив впервые связать молекулярное строение ДНК с механизмами репликации и передачи генетической информации. Это свидетельствует о том,

что открытие Уотсона и Крика имело не только описательный, но и глубокий методологический характер.

Рассмотрение значения открытия структуры ДНК для современной биологии показало, что именно оно заложило основу для формирования молекулярной биологии, генетики и биомедицины. Понимание пространственной организации ДНК стало фундаментом для развития методов секвенирования, геной инженерии, молекулярной диагностики и современных биотехнологий. В то же время анализ ограничений ранних методологических подходов продемонстрировал необходимость дальнейшего расширения научного инструментария, что и определило развитие современных направлений молекулярно-генетических исследований.

Таким образом, проведённое исследование подтверждает, что открытие структуры ДНК Джеймсом Дьюи Уотсоном и Фрэнсисом Криком является не только выдающимся научным достижением XX века, но и важнейшим этапом в формировании методологии современной биологии. Его значение проявляется как в историческом контексте, так и в продолжающемся влиянии на развитие науки, что позволяет рассматривать данное открытие в качестве фундаментального основания современных представлений о природе наследственности и молекулярной организации живых систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уотсон Дж. Д., Крик Ф. Х. С. Молекулярная структура нуклеиновых кислот // *Nature*. 1953. №171. С. 737–738.
2. Уотсон Дж. Д. Двойная спираль. М.: Мир, 1968. 192 с.
3. Колчинский Э. И. История генетики XX века. М.: Наука, 2017. 468 с.
4. Лопухин Ю. М., Глазко В. И. Генетика человека. М.: Высшая школа, 2015. 543 с.
5. Мишер Ф. Об исследованиях нуклеина // *Избранные работы по биохимии*. СПб., 2001. С. 45–59.
6. Эйвери О., Маклеод К., Маккарти М. Исследование природы трансформирующего принципа // *Журнал экспериментальной медицины*. 1944. №79. С. 137–158.
7. Херши А., Чейз М. Независимость функции бактериофага от его белковой оболочки // *Журнал молекулярной биологии*. 1952. №4. С. 34–54.
8. Морган Т. Теория наследственности. М.: Биомедгиз, 1934. 364 с.
9. Чаргафф Э. Химическая специфика нуклеиновых кислот // *Биохимия*. 1950. №18. С. 10–25.
10. Франклин Р., Гослинг Р. Молекулярная конфигурация тимонуклеината натрия // *Nature*. 1953. №171. С. 740–741.
11. Крик Ф. Х. Жизнь как она есть. М.: АСТ, 2018. 384 с.
12. Ridley M. Francis Crick: Discoverer of the Genetic Code. Oxford University Press, 2006. 214 p.
13. Rheinberger H.-J. Toward a History of Epistemic Things: Synthesizing Proteins in the Test Tube. Stanford University Press, 1997. 350 p.
14. Кендрю Дж. Структуры белков и нуклеиновых кислот. М.: Мир, 1972. 352 с.
15. Кутырев В. В. Генетика и философия биологии. М.: Логос, 2016. 298 с.

16. Пономарева Е. М., Шмелёв Д. В. Введение в молекулярную биологию. М.: Лань, 2020. 432 с.
17. Кубарев С. А. Современные методы структурной биологии: рентгенография, ЯМР и крио-ЭМ. СПб.: Питер, 2019. 240 с.
18. Семёнов А. Н. Геномика: современные подходы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. 368 с.
19. Животовский Л. А. Популяционная и эволюционная генетика. М.: Академкнига, 2012. 290 с.
20. Alberts B., Johnson A., Lewis J. Molecular Biology of the Cell. 6th ed. New York: Garland Science, 2015. 1342 p.