

Lago Caburga: ¿por qué se vacía?

Un estudio abierto sobre el descenso del lago y el conflicto del río Trafampulli — qué dice la evidencia y cómo se puede destrabar.


≈80%	≈20%	−34%	+350 m
atribuible a la megasequía	atribuible al dique Trafampulli	caída lluvia estación Caburga (CR2, post-2010)	costa recuperada con El Niño 2024 (sin tocar dique)

El problema


El Lago Caburga (Pucón, Región de La Araucanía) es único en Chile: no drena por un río superficial sino bajo tierra, por los Ojos del Caburga. Eso lo hace muy sensible al agua que recibe. Desde ~2010 su nivel bajó de forma sostenida (−25% entre las décadas 2000-2010 y 2011-2020), exponiendo cientos de metros de playa. Dos relatos compiten: la comunidad atribuye la baja a un dique que en 2007 cortó un brazo del río Trafampulli; las autoridades, a la megasequía.

Qué dice la evidencia

Cruzando tres fuentes independientes de precipitación (estaciones CR2, reanálisis ERA5 de Open-Meteo 1950-2025, y CR2MET grillado), caudales de ríos vecinos, cobertura de nieve satelital y un balance hídrico calibrado, la conclusión es robusta y a la vez incómoda para ambos bandos: **la causa de primer orden es la megasequía** (la lluvia en la estación del lago cayó 34% y la cobertura de nieve de 56% a 27%), pero **el dique sí resta agua valiosa** en un clima que se seca. La prueba más concluyente: con El Niño de 2024 el lago recuperó +350 m de costa sin que se removiera el dique. El test de Mann-Kendall confirma la tendencia decreciente de precipitación como estadísticamente significativa (p=0,0005).



Atribución del descenso según balance hídrico calibrado (U. Chile 2022).



Precipitación anual 1950-2025 (Open-Meteo ERA5). Sequía sostenida desde 2010, recuperación 2022-2024 (El Niño) y nuevo descenso 2025 (La Niña).

La historia del conflicto

2007	La DGA ordena construir el dique (Of. 347), sin estudio de impacto ambiental.
2010	Inicia la megasequía centro-sur de Chile.
2021	Año más seco reciente (1.852 mm). Nivel mínimo.
may 2022	La comunidad mapuche derriba el dique tras 16 años de peticiones.
2023-24	El Niño: el lago recupera +350 m de costa.
ago 2025	Corte Suprema autoriza reconstruir el dique.
dic 2025	DGA mide 4% del cauce llega al lago; anuncia cierre. Comunidades se oponen.

Cómo se destraba: una propuesta basada en casos reales

Ningún lago en disputa del mundo se salvó ganando un juicio; se salvaron con gobernanza. El modelo de Mono Lake (California) y el reciente caso de la Laguna de Aculeo en Chile muestran el camino. Seis pasos para Caburga:

1. Datos compartidos	Integrar la red DGA con el monitoreo ciudadano en una plataforma abierta.
2. Nivel-objetivo	Acordar una cota meta para el lago en vez de discutir culpas (modelo Mono Lake).
3. Medir donde importa	Estaciones de caudal en Río Blanco, Trafampulli y Ojos. Hoy no existen.
4. Protección legal	Figura de Santuario/Humedal que obligue a gestión activa (modelo Aculeo, 2025).
5. Gestión de cuenca	Manejar los 335 km² completos y los derechos de agua, no solo el dique.
6. Aprovechar El Niño	Usar la ventana húmeda para acordar con calma; La Niña 2025 ya bajó el lago.

Mensaje central: la ciencia muestra que la sequía manda — lo que la comunidad necesita oír — y a la vez que el dique resta agua valiosa — lo que valida la preocupación vecinal. Ambas cosas son verdad. La salida no es quién gana, sino qué cota acordamos y cómo la cuidamos entre todos.