

Settimana: 20

Materia: Matematica

Classe: 5A

Data: 23/02/26

Integrali:

Esempio: $\int \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) + c$

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx \quad \left(\text{Sost. : } \sqrt{x} = t \right)$$

Orongoo - Tongoo
▷ Si ricorre la x in fz della t

$$\int \frac{1}{1+t} dx = \int \frac{1}{1+t} \cdot 2t dt =$$

$$x = t^2$$

▷ Si deriva a sinistra in x , a destra in t e si aggiunge rispettiv. dx e dt

Linearità.
 $\int \frac{2t}{1+t} dt \quad \boxed{=} \quad 2 \int \frac{t}{1+t} dt =$

$$2 \int \frac{t+1-1}{t+1} dt$$

$$1. dx = 2t dt$$

▷ Ho ricavato dx , lo sostituisco

$$2 \int \left(\frac{t+1}{t+1} - \frac{1}{t+1} \right) dt$$

$$\left(\frac{t+1}{t+1} - \frac{1}{t+1} \right)$$

$$2 \int \left(1 - \frac{1}{t+1} \right) dt = 2 \left[\int 1 dt - \int \frac{1}{1+t} dt \right] =$$

$$2 \left[t - \ln|1+t| \right] + c = 2(\sqrt{x} - \ln|1+\sqrt{x}|) + c$$

Fatto: L'integrale è Lineare, cioè

$$\triangleright \int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad k \in \mathbb{R}$$

$$\triangleright \int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Sim: Si comporta come la derivata

Fatto: È lecito fare sostituzioni come per i limiti. Ricordarsi che il dx (differenziale) va modificato in modo opportuno seguendo il metodo Oregano-tango

n 347

Tip: Sostituire TUTTA la roba che non vi piace

$$\int \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx = \quad \text{Sost: } \begin{aligned} \sqrt{x-1} &= t \\ x-1 &= t^2 \\ x &= t^2+1 \end{aligned} \quad \rightsquigarrow dx = 2t dt$$

$$= \int \frac{t^2+1}{\cancel{t}} \cdot \cancel{2t} dt = 2 \int (t^2+1) dt = 2 \left[\frac{t^3}{3} + t \right] + c$$

$$\frac{2}{3} t^3 + 2t + c = \frac{2}{3} \sqrt{x-1}^3 + 2\sqrt{x-1} + c$$

$$\underline{355}: \int \frac{1}{x - \sqrt{x}} dx = \quad \text{Sost: } \begin{aligned} \sqrt{x} &= t \\ x &= t^2 \end{aligned} \quad \rightsquigarrow dx = 2t dt$$

$$= \int \frac{1}{t^2 - t} \cdot 2t dt = \int \frac{1}{\cancel{t}(t-1)} \cdot \cancel{2t} dt = 2 \int \frac{1}{t-1} dt$$

$$= 2 \ln |t-1| + c = 2 \ln |\sqrt{x}-1| + c$$

$$\underline{356}: \int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \quad \text{Sost: } \begin{aligned} e^x &= t \\ x &= \ln(t) \end{aligned} \quad \rightsquigarrow dx = \frac{1}{t} dt$$

$$\left(= \int \frac{1}{t + \frac{1}{t}} \cdot \frac{1}{t} dt = \int \frac{\cancel{t}}{t^2+1} \cdot \frac{1}{\cancel{t}} dt = \arctg(e^x) + c \right.$$

Alternat.

$$\int \frac{1}{e^x + \frac{1}{e^x}} dx = \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \text{Subst. } e^x = t$$

\uparrow
 $e^x dx = dt$

$$\int \frac{1}{t^2 + 1} dt = \dots = \arctan(e^x) + c$$