

Settimana: 8

Materia: Matematica

Classe: 5C

Data: 3/11/25

Gomez. più compito

$$f(x) = \frac{x^2 + p}{(x+q)^2}$$

- 1) f passa per $(1;0)$
2) $x = -2$ è asintoto

$$0 = \frac{1+p}{(1+q)^2} \rightsquigarrow 1+p = 0 \rightsquigarrow \underline{p = -1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 1}{(x+q)^2} = \infty \rightsquigarrow \text{Per fare } \infty, \text{ Den} \rightarrow 0 \Rightarrow -2+q = 0 \Rightarrow \underline{q = 2}$$

Peri: $f(x) = f(-x)$

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x+2)^2}$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 4x + 4}$$

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x+2)^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4x + 4}$$

Non è pari
Dovete specificare di più!

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 1}{(x+2)^2} \cdot (e^{x+2} - 1) \sin(x+2) = \left(\text{Sost: } \begin{matrix} x+2 = t \\ x \rightarrow -2 \quad t \rightarrow 0 \end{matrix} \right)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t-2)^2 - 1}{t} \cdot \frac{(e^t - 1)}{t} \cdot \frac{\sin t}{t} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{(x+2)^2} \cdot \ln(x+1) = \infty$$

Teoremi sulle funzioni continue

Teorema (continuità delle f_z inverse): Sia $f: D_1 \subseteq \mathbb{R} \rightarrow D_2 \subseteq \mathbb{R}$ ↗ D₁ intervallo
Bigettiva e continua in tutto D_1 . Allora f funzione inversa

$$f^{-1}: D_2 \rightarrow D_1$$


è ancora continua

Definizione: $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{Max}(f)$ = valore più alto raggiunto della funzione
 $\text{min}(f)$ = valore più basso raggiunto della funzione

$$\begin{aligned} \text{Max}(f) &= \text{Max}(\text{Im } f) \\ \text{min}(f) &= \text{min}(\text{Im } f) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \text{Max}(f) &= \text{Max}(\text{Im } f) \\ \text{min}(f) &= \text{min}(\text{Im } f) \end{aligned}} \right\} \text{Non è detto che esistano!}$$

Teorema di Weierstrass: (Weierstrass ← Pronuncia):


Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f ammette sia massimo che minimo.



M è il Massimo
 m è il minimo.

Oss importanti:


(1) L'ipotesi che l'intervallo sia chiuso (da entrambi i lati) è necessaria
Controesempio



In questo esempio un estremo NON è incluso e la funzione in questo caso NON ammette massimo

(2) L'ipotesi che f sia continua è Necessaria
Controesempio

la funzione NON ha massimo,
la palla bianca è
solamente un sup



Pag 1554 n 808

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + x - 2}$$

$$f: D \subseteq [0; 3] \rightarrow \mathbb{R}$$

Ha massimo e/o minimo in $[0; 3]$?

Provo a Verificare le Hip di Weierstrass

(1) Il dominio è un intervallo chiuso?

$$\text{Dom}(f): x^2 + x - 2 \neq 0$$

$$(x+2)(x-1) \neq 0$$


$$\underline{x \neq -2} \vee \underline{x \neq 1}$$

non sta in
 $[0, 3]$

↓
Problema!

$$\leadsto \text{Dom}(f) = [0; 1) \cup (1; 3]$$

Dato che $\text{Dom}(f)$ non è intervallo chiuso, Non posso applicare W.



$$f(0) = 0$$

$$f(3) = \frac{3}{10}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{(x-1)(x+2)} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{(x-1)(x+2)} = +\infty$$

n 809

$$f(x) = \frac{x}{-x^2 + 3x}$$

$$f: D \subseteq [1; 2] \rightarrow \mathbb{R}$$

(1) Dom f: $-x^2 + 3x \neq 0$
 $x(-x+3) = 0$
 $x \neq 0 \vee x \neq 3$ ↗ Fuori dell'intervallo di cui dice il problema


(2) Continuità: ovvio (no problemi o funzioni e tratti)

↪ Posso applicare TDW e la f.g. ammetterà max e min.

Teorema dei valori intermedi: Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.
Siano m e M il minimo e il max di f (Esistono per TDW).
Allora


$$\forall c \in [m; M], \exists x_0 \in [a, b] \text{ t.c. } f(x_0) = c$$

Ovvero ogni numero tra il minimo e il massimo è raggiunto da qualcosa



Fisso un'altezza $c \in [m; M]$, traccio la retta $y = c$ e tale retta interseca il grafico della funzione

Teorema degli zeri: Sia $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzione continua.
 Supponiamo che $f(a) \cdot f(b) < 0$ (in altre parole i numeri $f(a)$ e $f(b)$ sono di segno opposto, cioè uno pos e uno neg).
 Allora $\exists x_0 \in [a; b]$ t.c. $f(x_0) = 0$; cioè la funzione ha almeno uno zero.



Dim: Per il TDW, esistono m e M minimo e massimo.

Dato che $f(a) \cdot f(b) < 0$, allora il minimo deve essere negativo e il massimo deve essere positivo.

Per il teorema dei valori intermedi,
 $\forall c \in [m; M]$, $\exists x_0$ t.c. $f(x_0) = c$

Dato $m < 0$ e $M > 0$, allora posso scegliere $c = 0$
 Di conseguenza $\exists x_0$ t.c. $f(x_0) = 0$
 cioè x_0 è uno zero di f .

□

Pag 1558 n 824

$$f: [0; \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = -1 + x + \sin x$$

Ha qualche zero in $[0; \frac{\pi}{2}]$?

1) La funzione è continua in $[0; \frac{\pi}{2}]$: Sì no prob di dominio o di ricorrido

$$\begin{aligned} 2) f(0) &= -1 + 0 + 0 = -1 \\ f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= -1 + \frac{\pi}{2} + 1 = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

\Rightarrow La funzione ha almeno uno 0 per il Teorema degli zeri.

