

Settimana: 15

Materia: Matematica

Classe: 5A

Data: 17/01/26

Pag 1712 n. 85

1) Verifica & Hip di Rolle ?

2) Se si, trova un max o un min

$$f(x) = x^2 - 5x + 3$$

$$f: [-2; 7] \longrightarrow \mathbb{R}$$

(1) a)  $f$  è continua in  $[-2; 7]$ ? Si benevolmente

b)  $f$  è derivabile in  $(-2; 7)$ ?

$$\hookrightarrow f'(x) = 2x - 5 \quad \text{Nessun problema}$$

$$c) f(-2) = 4 + 10 + 3 = 17$$

$$f(7) = 49 - 35 + 3 = 17$$

} uguali

Si, verifica Rolle ✓

Per trovare il punto in cui  $f'(x) = 0$ ; lo impongo  $2x - 5 = 0$   $\left(x = \frac{5}{2}\right)$

n 101

$$f: [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 1 - 2x + 1$$

Verifica Rolle? (a) Continua in  $[0; 1]$ ?

$$\text{Caso a: } -2x + 1 \geq 0, \quad x \leq \frac{1}{2}$$

$$\hookrightarrow f(x) = -2x + 1$$

$$\text{Caso b: } -2x + 1 \leq 0, \quad x \geq \frac{1}{2}$$

$$f(x) = 2x - 1$$

$$f(x) = \begin{cases} -2x+1 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x-1 & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Il valore assoluto l'ho fatto diventare una  $f_2$  a tratti.

La funzione è localmente continua ovunque tranne che in  $x = \frac{1}{2}$   
Per il pto  $\frac{1}{2}$  faccio lim sinistro e destro

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} (-2x+1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} (2x-1) = 0$$

Continue!

(2) Derivabilità:

$$f'(x) = \begin{cases} -2 & 0 < x < \frac{1}{2} \\ 2 & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$$

La derivata è questa nei punti NON problematici.

Adesso per vedere se esiste  $f'(\frac{1}{2})$  faccio i limiti della derivata a dx e sx (Attenzione, non funzione sempre!)

$$f'_+(\frac{1}{2}) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} 2 = 2$$

$$f'_-(\frac{1}{2}) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} (-2) = -2$$

Dato che  $f'_+(\frac{1}{2}) \neq f'_-(\frac{1}{2})$ ,  $f$  non è derivabile in  $\frac{1}{2}$ , e non vale quindi Rolle.

33

$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = e^x \sqrt[3]{(x-1)^2}$$

$\xrightarrow{(x-1)^{\frac{2}{3}}}$

1) faccio le derivate dove posso

$$f'(x) = e^x \cdot \sqrt[3]{(x-1)^2} + e^x \cdot \frac{2}{3} (x-1)^{-\frac{1}{3}}$$

$$= e^x \left[ \sqrt[3]{(x-1)^2} + \frac{2}{3 \sqrt[3]{x-1}} \right]$$

$$= e^x \left[ \frac{x+1}{3 \sqrt[3]{x-1}} \right]$$

$f'(x)$  no problema tranne che in  $\boxed{x=1}$

Per vedere cosa succede in  $x=1$  si fa con la definizione e si vede che succede

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{1+h} \sqrt[3]{h^2} - e^1 \cdot 0}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{1+h}}{\sqrt[3]{h}} = -\infty$$

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \dots = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{1+h}}{\sqrt[3]{h}} = +\infty$$

$\boxed{x=1 \text{ Cuspide}}$

136  $f(x) = 2e^x + x \quad f: [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$

Lagrange: (a)  $f: [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$  continue  
(b)  $f: (a; b) \longrightarrow \mathbb{R}$  derivabile

$$\Rightarrow \exists c \in (0, 1) \quad \text{t.c.} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

(a)  $f$  è continua? Sì

(b)  $f$  è derivabile  $\leadsto f'(x) = 2e^x + 1$  derivabile ovunque


Vale Lagrange cioè posso risolvere l'equazione:

$$f'(x) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{2e + 1 - 2}{1}$$

$$2e^x + 1 = 2e - 1$$

$$2e^x = 2e - 2 \quad \leadsto e^x = e - 1$$

$$x = \ln(e - 1)$$



176:  $f(x) = \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \left( \frac{1}{x} \right)$

$$\operatorname{Dom}(f) = \{x \neq 0\}$$

$$f: (-\infty; 0) \cup (0; +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$$

Dimostra che la funzione è costante in  $(-\infty; 0)$  e quanto vale?  
 ,, ,, in  $(0; +\infty)$  e quanto vale?

Invoco Lagrange: Derivo.

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$= \frac{1}{1+x^2} + \frac{\cancel{x^2}}{1+x^2} \left( -\frac{1}{\cancel{x}} \right) = 0$$

Dato che  $f'(x) = 0$  la  $f_3$  è costante e vale

$$\frac{\pi}{2} \text{ in } (0; +\infty) \quad (\text{Nicola})$$

$$-\frac{\pi}{2} \text{ in } (-\infty; 0)$$

252 Per quali  $k$  la funzione  $f(x) = -x^3 + (2k-1)x$  è ~~sempre~~ decrescente in  $\mathbb{R}$ ?

Funzione decrescente se  $f'(x) < 0$

$$f'(x) = -3x^2 + (2k-1)$$

Deve essere vero sempre che  $-3x^2 + 2k-1 < 0$

$$x^2 > \frac{2k-1}{3} \quad \text{Sempre}$$

È sufficiente che  $\frac{2k-1}{3} < 0 \Rightarrow 2k-1 < 0 \Rightarrow k < \frac{1}{2}$