

Settimana: 8

Materia: Matematica

Classe: 5A

Data: 1 / 25

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+x}{1+2x} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \left( \frac{1+x}{1+2x} \right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\left[ \frac{\ln(1+x)}{x} - \frac{\ln(1+2x)}{2x} \cdot 2 \right]} = e^{1-2} = e^{-1} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x^3-2x-4)}{x^3-8} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)(x^2+x+2)}{(x^2+2x+4)(x-2)} = \frac{8}{3}$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & 0 & -2 & -4 \\ 2 & & 2 & 4 & 4 \\ \hline & 1 & 2 & 2 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & 0 & 0 & -8 \\ 2 & & 2 & 4 & 8 \\ \hline & 1 & 2 & 4 & 0 \end{array}$$


Derivate (Finalmente)

Problema introduttivo

$$f(x) = x^2 + 10$$


$$g(x) = e^x$$

"Se so dire chi tra  
le due funzioni cresce  
più velocemente, so dire se si incontrano"



La derivata di una funzione in un punto è "in un certo senso" la misura della velocità con cui cresce una funzione.

Def:



Sia  $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione.  
Siano  $A \in \text{Graf}(f)$ ,  $A = (x_A; f(x_A))$

e  $B \in \text{Graf}(f)$ ,  $B = (x_A + h; f(x_A + h))$


Definisco il rapporto incrementale di  $f$  nel punto  $x_A$  come

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{(x_A + h) - x_A} = \frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h}$$

È il rapporto tra i cateti del triangolo ABC e vale

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h} = \tan \alpha$$

Euristica:



Goal: Far andare il punto B fino al punto A in modo che il rapporto incrementale piano piano mi identifichi la retta tangente alla curva in A

Def. Sia  $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ ; sia  $x_0 \in (a; b)$ , definiamo la derivata di  $f$  in  $x_0$  come il limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

(Ovviamente se esiste finito)

Per indicare la derivata scriveremo:

$$f'(x_0)$$

$f$  primo nel punto  $x_0$

$$\frac{df}{dx}(x_0)$$

de  $f$  su de  $x$  in  $x_0$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0)$$

de  $f$  su de  $x$  in  $x_0$ . Per funzioni di più var.

$$Df(x_0) \leftarrow \text{Simbolo del libro}$$


Oss 1) Graficamente parlando  $(h \rightarrow 0) = (\text{il punto B crolla su A})$

2) Per quanto detto, la derivata in un punto è il valore della tangente dell'angolo della retta tangente al grafico in quel punto.

↳ Per le cose viste in III la derivata in un punto è quindi il coeff. angolare della retta tangente al grafico in quel punto.

Esempi: (1)

$$f(x) = 2x + 1$$



Calcolo la derivata in  $x_0 = 1$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(1+h) + 1] - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h} = 2$$

è proprio il coeff. angolare perché la  $tg$  coincide con la retta

$$(2) f(x) = ax^2 + bx + c \quad \rightarrow \text{la tg nel punto } x \text{ è } 2ax + b$$

Caso particolare:  $f(x) = 2x^2 + 3$  Calcolo la derivata in  $x_0 = 2$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(2+h)^2 + 3] - [2(2)^2 + 3]}{h}$$

Coef. angolare di retta

tg a  $f(x)$  in  $x_0 = 2$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[8 + 2h^2 + 8h + 3] - 11}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h^2 + 8h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2h + 8) = 8$$

$$\boxed{f'(2) = 8}$$

Def. Sia  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione e supponiamo che  $\forall x \in (a, b)$ , esista la derivata  $f'(x_0)$ . Diremo che la funzione è Derivabile in ogni punto e possiamo definire la funzione Derivata come

$$f': (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$$

Esempio:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$

▷ Calcolo  $f'(7)$ , se esiste

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(7+h) - f(7)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(7+h)^2 - 7^2}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{49} + h^2 + 14h - \cancel{49}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 14) = 14$$

▷ Calcolo  $f'(x)$ :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x^2} + h^2 + 2xh - \cancel{x^2}}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x+h)}{h} = 2x$$

Ho scoperto che se  $f(x) = x^2$ ,  $f'(x) = 2x$  e diremo la derivata di  $x^2$  è  $2x$

Derivate delle funzioni elementari:

$$\triangleright f(x) = x \quad \rightsquigarrow \quad f'(x) = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x} + h - \cancel{x}}{h} = 1$$

$$\triangleright f(x) = x^n, n \in \mathbb{N} \quad \rightsquigarrow \quad f'(x) = nx^{n-1}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \quad \xrightarrow{\text{Binomio di Newton}} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x^n} + nx^{n-1}h + [\dots + h^n] - \cancel{x^n}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h[nx^{n-1} + h(\dots)]}{h} = nx^{n-1}$$

$$\triangleright f(x) = \sin x \quad \rightsquigarrow \quad f'(x) = \cos x$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cosh + \sin h \cos x - \sin x}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cosh - 1)}{h} + \frac{\sin h \cdot \cos x}{h} = \cos x$$

$$\triangleright f(x) = \cos x \rightsquigarrow f'(x) = -\sin x$$

$$\triangleright f(x) = e^x \rightsquigarrow f'(x) = e^x \rightsquigarrow \text{Esercizio} \uparrow$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x$$

$$\triangleright f(x) = a^x, a > 0 \rightsquigarrow f'(x) = a^x \ln a$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} = a^x \ln a$$

$$\triangleright f(x) = \ln(x) \rightsquigarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{x+h}{x}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} = \left( \begin{array}{l} \text{Sost: } \frac{h}{x} = t \\ h = xt \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} h \rightarrow 0 \\ t \rightarrow 0 \end{array}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{xt} = \frac{1}{x}$$

$$\triangleright f(x) = \log_a x \quad a \neq 1, a > 0 \rightsquigarrow f'(x) = \frac{1}{x} \log_a e \quad \left. \vphantom{\log_a e} \right\} \text{Esercizi}$$


$$\triangleright f(x) = k \rightsquigarrow f'(x) = 0$$

Def. Sia  $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  funzione, definiamo

$$f'_-(x) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{Derivate sinistre}$$

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \quad \text{Derivata destra}$$

Esempio:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = |x-1|$



Obs: Per disegnare vel obs è sufficiente portare tutti i valori negativi in positivi cioè ribaltare rispetto all'asse x

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \stackrel{x=1}{=} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|1-1+h| - |1-1|}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \left(-\frac{h}{h}\right) = -1$$

Ho scoperto che  $f'_-(1) = -1$   
Analogamente  $f'_+(1) = 1$

Ma quindi derivata sx e dx NON coincidono e quindi la funzione NON è derivabile in  $x=1$

Teorema: Sia  $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$  funzione e supponiamo che  $f$  sia derivabile in  $x_0$ . Allora  $f$  è continua in  $x_0$   
( $f$  derivabile in  $x_0 \Rightarrow f$  continua in  $x_0$ )

**LE VICEVERSA È FALSO !!!** Basta vedere esempio sopra

Dim: So che esiste finito  $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$

Voglio dimostrare che  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Scriviamo la seguente uguaglianza:

$$f(x_0+h) = f(x_0) + \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \cdot h$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0+h) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0) + \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}}_{f'(x_0)} \cdot \underbrace{h}_{0}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0+h) = f(x_0) + 0$$

(Cambio di variabile  $x_0+h = x$   $\begin{matrix} h \rightarrow 0 \\ x \rightarrow x_0 \end{matrix}$ )

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad \text{che } \bar{e} \text{ la def. di continuit\`a}$$

□

### Ricettorio per il calcolo delle derivate Parte 1

$$\triangleright [k \cdot f(x)]' = k \cdot f'(x)$$

Esempio:  $[3 \cdot \sin x]' = 3 \cdot (\sin x)' = 3 \cos x$

$$\triangleright [f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

Es:  $(3x+7)' = (3x)' + (7)' = 3$

$$\triangleright [fg]' = f'g + fg'$$

Es:  $(x^2 \cdot \sin x)' = (x^2)' \sin x + x^2 (\sin x)'$   
 $= 2x \sin x + x^2 \cos x$

$$\triangleright \left( \frac{f}{g} \right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$



Page 1629 n 163

$$f(x) = -x^2 + 4x - 12$$

$$f'(x) = -2x + 4$$

166:

$$f(x) = \frac{x^6}{6} - \frac{x^5}{5} - 1$$

$$f'(x) = \frac{6x^5}{6} - \frac{5x^4}{5} = x^5 - x^4$$

174.

$$f(x) = \frac{7x + 5x^3}{x^2} = \frac{7 + 5x^2}{x}$$

$$f'(x) = \frac{(7 + 5x^2)' \cdot x - (7 + 5x^2)(x)'}{x^2} = \frac{10x^2 - 7 - 5x^2}{x^2} = \frac{5x^2 - 7}{x^2}$$

205:  $f(x) = (\cos x - \sin x) \cdot (-\sin x - \cos x)$

$$f'(x) = (\cos x - \sin x)'(-\sin x - \cos x) + (\cos x - \sin x)(-\sin x - \cos x)'$$

$$= [-\sin x - \cos x]^2 + [\cos x - \sin x] [-\cos x + \sin x]$$

$$= (\sin x + \cos x)^2 - (\cos x - \sin x)^2$$

$$= 1 + 2\sin x \cos x - 1 + 2\sin x \cos x = 4\sin x \cos x$$