

Settimana: 8

Materia: Matematica

Classe: 5A

Data: 1 / 25

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+x}{1+2x} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \left( \frac{1+x}{1+2x} \right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\left[ \frac{\ln(1+x)}{x} - \frac{\ln(1+2x)}{2x} \cdot 2 \right]} = e^{1-2} = e^{-1} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x^3-2x-4)}{x^3-8} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)(x^2+x+2)}{(x^2+2x+4)(x-2)} = \frac{8}{3}$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & 0 & -2 & -4 \\ 2 & & 2 & 4 & 4 \\ \hline & 1 & 2 & 2 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & 0 & 0 & -8 \\ 2 & & 2 & 4 & 8 \\ \hline & 1 & 2 & 4 & 0 \end{array}$$

Derivate (Finalmente)

Problema introduttivo

$$f(x) = x^2 + 10$$


$$g(x) = e^x$$

"Se so dire chi tra le due funzioni cresce più velocemente, so dire se si incontrano"



La derivata di una funzione in un punto è "in un certo senso" la misura della velocità con cui cresce una funzione.

Def:



Sia  $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione.  
Siano  $A \in \text{Graf}(f)$ ,  $A = (x_A; f(x_A))$

e  $B \in \text{Graf}(f)$ ,  $B = (x_A + h; f(x_A + h))$


Definisco il rapporto incrementale di  $f$  nel punto  $x_A$  come

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{(x_A + h) - x_A} = \frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h}$$

È il rapporto tra i cateti del triangolo ABC e vale

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h} = \tan \alpha$$

Euristica:



Goal: Far andare il punto B fino al punto A in modo che il rapporto incrementale piano piano mi identifichi la retta tangente alla curva in A

Def. Sia  $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ ; sia  $x_0 \in (a; b)$ , definiamo la derivata di  $f$  in  $x_0$  come il limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

(Ovviamente se esiste finito)

Per indicare la derivata scriveremo:

$$f'(x_0)$$

$f$  primo nel punto  $x_0$

$$\frac{df}{dx}(x_0)$$

de  $f$  su de  $x$  in  $x_0$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0)$$

de  $f$  su de  $x$  in  $x_0$ . Per funzioni di più var.


Oss 1) Graficamente parlando  $(h \rightarrow 0) = (\text{il punto B crolla su A})$

2) Per quanto detto, la derivata in un punto è il valore della tangente dell'angolo della retta tangente al grafico in quel punto.

↳ Per le cose viste in III la derivata in un punto è quindi il coeff. angolare della retta tangente al grafico in quel punto.

Esempi: (1)

$$f(x) = 2x + 1$$



Calcolo la derivata in  $x_0 = 1$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(1+h) + 1] - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h} = 2$$

è proprio il coeff. angolare perché la  $tg$  coincide con la retta

$$(2) f(x) = ax^2 + bx + c \quad \leadsto \text{la tg nel punto } x \text{ è } 2ax + b$$

Caso particolare:  $f(x) = 2x^2 + 3$  Calcolo la derivata in  $x_0 = 2$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(2+h)^2 + 3] - [2(2)^2 + 3]}{h}$$

Coef. angolare di retta

tg a  $f(x)$  in  $x_0 = 2$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[8 + 2h^2 + 8h + 3] - 11}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h^2 + 8h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2h + 8) = 8$$

$$\boxed{f'(2) = 8}$$