

Question **19**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Le furosémide est hypernatrémiant et hyperkaliémiant
- ☐ Les bêta-bloquants sont tous contre indiqués dans l'insuffisance cardiaque chronique
- ☐ La spironolactone est un antialdostérone hyperkaliémiant
- ☐ Le ramipril est un antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2
- ☐ La digoxine est indiquée dans l'insuffisance cardiaque chronique

Les réponses correctes sont : La spironolactone est un antialdostérone hyperkaliémiant, La digoxine est indiquée dans l'insuffisance cardiaque chronique

Question **20**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les effets indésirables majeurs "l'isotrétinoïne", choisissez la ou les proposition(s) fausse(s) :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Sécheresse de la peau et des muqueuses
- ☐ Dépression
- ☐ Tératogène
- ☐ Photosensibilisation
- ☐ Toux sèche

La réponse correcte est : Toux sèche

Question **21**

Non répondue

Noté sur 1,00

Concernant le passage des médicaments dans le lait maternel, quelle est ou quelles sont la ou les bonnes réponses ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Les contraceptifs oestro-progestatifs sont utilisables en cas d'allaitement
- ☐ Une base faible peu ionisée dans le plasma passe mieux qu'un acide faible
- ☐ Les contraceptifs progestatifs micro dosés sont utilisables en cas d'allaitement
- ☐ Il est maximal au moment de la phase d'allaitement
- ☐ La forme libre du médicament passe difficilement dans le lait maternel

Les réponses correctes sont : Il est maximal au moment de la phase d'allaitement, Une base faible peu ionisée dans le plasma passe mieux qu'un acide faible, Les contraceptifs progestatifs micro dosés sont utilisables en cas d'allaitement