

Question **31**

Non répondue

Noté sur 1,00

Citer parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) peut (peuvent) être à l'origine d'un syndrome de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Grossesse pathologique
- ☐ Chirurgie lourde
- ☐ Septicémie bactérienne
- ☐ Leucémie aiguë promyélocytaire (LAM 3)
- ☐ Cancer métastasé

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Septicémie bactérienne, Chirurgie lourde, Grossesse pathologique, Leucémie aiguë promyélocytaire (LAM 3), Cancer métastasé

Question **32**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les valeurs suivantes concernant l'hémogramme d'une femme enceinte en fin de 3^{ème} trimestre de grossesse, indiquez celle(s) qui vous semble(nt) pathologique(s) :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Polynucléaires neutrophiles : $7.10^9/L$
- ☐ Hb : 100g/L
- ☐ Monocytes : $2.10^9/L$
- ☐ Plaquettes : $110.10^9/L$
- ☐ VGM : 105fl

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Polynucléaires neutrophiles : $7.10^9/L$, Plaquettes : $110.10^9/L$, Monocytes : $2.10^9/L$

Question **33**

Non répondue

Noté sur 1,00

Sélectionnez la ou les propositions exactes :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Dans les PTAI aigus, les Ig polyvalentes purifiées par voie IV (ou IgG anti Rhésus D) sont utilisées en traitement d'urgence afin de réduire le risque hémorragique
- ☐ Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont responsables d'agranulocytose
- ☐ Le PTAI de l'enfant se présente généralement sous la forme d'une thrombopénie isolée aigue et sévère dans les suites d'un épisode infectieux viral
- ☐ Dans une anémie régénérative, un Coombs indirect positif permet de poser le diagnostic d'anémie hémolytique auto-immune (AHAI)
- ☐ Une polyglobulie microcytaire chez un patient d'origine marocaine doit faire évoquer le diagnostic de thalassémie hétérozygote

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont responsables d'agranulocytose, Dans les PTAI aigus, les Ig polyvalentes purifiées par voie IV (ou IgG anti Rhésus D) sont utilisées en traitement d'urgence afin de réduire le risque hémorragique, Le PTAI de l'enfant se présente généralement sous la forme d'une thrombopénie isolée aigue et sévère dans les suites d'un épisode infectieux viral, Une polyglobulie microcytaire chez un patient d'origine marocaine doit faire évoquer le diagnostic de thalassémie hétérozygote