

Question **24**

Non répondue

Noté sur 1,00

Une étude sur l'arrêt progressif du tabac en consultation de tabacologie a été publiée par l'Institut de Veille Sanitaire (Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, mai 2015).

L'étude a porté sur 14 960 sujets venus en consultation et ayant arrêté de fumer durant leur suivi.

Les résultats croisant le mode d'arrêt du tabac (avec ou sans réduction) et le type de prise en charge (5 prises en charge possibles) sont les suivants :

	Consultants ayant arrêté sans réduction	Consultants ayant arrêté progressivement
	n (%)	n (%)
Prise en charge comportementale sans prescription pharmacologique	2 002 (14,6)	226 (18,1)
Prise en charge comportementale avec prescription de formes orales de TSN	1 387 (10,1)	248 (19,8)
Prise en charge comportementale avec prescription de patch nicotinique	2 361 (17,2)	148 (11,8)
Prise en charge comportementale avec prescription de patch nicotinique et de formes orales de TSN	5 945 (43,4)	452 (36,1)
Prise en charge comportementale avec prescription de varénicline	1 964 (14,3)	173 (13,8)
2-3 consultations	6 632 (48,4)	0 (0,0)
4-6 consultations	5 673 (41,4)	572 (45,7)
≥7 consultations	1 404 (10,2)	679 (54,3)
Total	13 709 (100,0)	1 251 (100,0)

TSN : traitement de substitution nicotinique.

Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont correctes ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Parmi les consultants ayant arrêté de fumer progressivement, la proportion de sujets venus en consultation au moins 7 fois est plus élevée que celle des sujets venus entre 4 et 6 fois
- ☐ Parmi les consultants ayant bénéficié d'une prise en charge comportementale avec prescription de formes orales de TSN, la proportion de sujets ayant arrêté de fumer sans réduction est plus élevée que celle des sujets ayant arrêté progressivement
- ☐ Parmi les consultants ayant arrêté de fumer sans réduction, la prise en charge la plus prescrite est la prise en charge comportementale avec prescription de patch nicotinique et de formes orales de TSN
- ☐ Dans l'étude, la proportion de prises en charge comportementale sans prescription pharmacologique est plus élevée chez les sujets ayant arrêté progressivement que chez les sujets ayant arrêté sans réduction
- ☐ Parmi les consultants ayant arrêté de fumer progressivement, la prise en charge la moins prescrite est la prise en charge comportementale avec prescription de varénicline

Les réponses correctes sont : Parmi les consultants ayant arrêté de fumer progressivement, la proportion de sujets venus en consultation au moins 7 fois est plus élevée que celle des sujets venus entre 4 et 6 fois, Parmi les consultants ayant arrêté de fumer sans réduction, la prise en charge la plus prescrite est la prise en charge comportementale avec prescription de patch nicotinique et de formes orales de TSN, Parmi les consultants ayant bénéficié d'une prise en charge comportementale avec prescription de formes orales de TSN, la proportion de sujets ayant arrêté de fumer sans réduction est plus élevée que celle des sujets ayant arrêté progressivement, Dans l'étude, la proportion de prises en charge comportementale sans prescription pharmacologique est plus élevée chez les sujets ayant arrêté progressivement que chez les sujets ayant arrêté sans réduction