

Question **27**

Non répondue

Noté sur 1,00

Chez une femme enceinte, une toxoplasmose congénitale est prouvée si :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Des lésions sont observées chez le fœtus par échographie.
- ☐ Il y a présence d'IgM spécifiques dans le liquide amniotique.
- ☐ La mère présente de la fièvre.
- ☐ La mère présente des IgM spécifiques dans son sérum.
- ☐ Une amniocentèse est réalisée.

Les réponses correctes sont : Des lésions sont observées chez le fœtus par échographie., Il y a présence d'IgM spécifiques dans le liquide amniotique.

Question **28**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les éléments de réponses ci-dessous, lesquels sont considérés comme signes de gravité au cours d'un accès palustre à *Plasmodium falciparum* ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Parasitémie supérieure à 4%
- ☐ Ictère
- ☐ Troubles neurologiques
- ☐ Thrombopénie
- ☐ Fièvre à 40°C

Les réponses correctes sont : Parasitémie supérieure à 4%, Ictère, Thrombopénie, Troubles neurologiques

Question **29**

Non répondue

Noté sur 1,00

Cochez les légendes exactes



Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ A : céphalo-thorax
- ☐ C : col de Médicis
- ☐ D : patte (3 paires de pattes)
- ☐ E : abdomen
- ☐ B : rostre replié dans un sillon ventral

Les réponses correctes sont : B : rostre replié dans un sillon ventral, C : col de Médicis, D : patte (3 paires de pattes), E : abdomen