

Question **46**

Non répondue

Noté sur 1,00

Sur une ordonnance d'un enfant de 4 ans, vous avez lu "SRO" 2 à 3 fois /j. Voici une liste de deux exemples de "SRO" ? Choisir la bonne proposition ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Adiaril® et Diaril®
- ☐ Picot® et Picolite®
- ☐ Adiaril® et Picolite®
- ☐ Picot® et Diaril®
- ☐ Adiaril® et Picot®

La réponse correcte est : Adiaril® et Picolite®

Question **47**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quel(s) est (sont) les médicaments suivants qui peuvent provoquer une hypokaliémie ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ La spironolactone
- ☐ Le furosemide
- ☐ Le bisacodyl
- ☐ La prednisone
- ☐ L'amphotericine B par voie orale

Les réponses correctes sont : Le furosemide, Le bisacodyl, La prednisone

Question **48**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle est ou quelles sont la ou les bonnes réponses ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ La méthode AMDEC est utilisée pour prévenir l'iatrogénèse médicamenteuse
- ☐ L'adhésion au traitement est constituée de l'acceptation et de l'observance
- ☐ La présentation unitaire des médicaments doit être privilégiée
- ☐ L'iatrogénèse évitable dépend de trois facteurs

Les réponses correctes sont : La méthode AMDEC est utilisée pour prévenir l'iatrogénèse médicamenteuse, La présentation unitaire des médicaments doit être privilégiée