

Question **3**
Non répondue
Noté sur 1,00

M. Victor B., 38 ans, commercial, est infecté par un HCV de génotype 1. Il vous présente l'ordonnance suivante

Docteur A. Goffrettes
Médecine Générale

12/01/2015

Victor B 38 ans, 62 kgs

Sofosbuvir, Sovaldi, cp à 400 mg : 1/j
Daclatasvir, Daklinza, cp à 60 mg : 1/j
A revoir dans 12 semaines

Consultations sur RDV
tous les jours
de 14h à 18h.



Concernant cette ordonnance, quels conseils doit-on donner à M. Victor B ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ M. Victor B. ne doit jamais interrompre son traitement
- ☐ En cas d'oubli de prise de moins de 12h, il doit immédiatement prendre son traitement
- ☐ Il doit éviter l'automédication
- ☐ Il doit signaler toute anomalie survenant au cours de son traitement
- ☐ Le traitement doit être impérativement pris pendant les repas

Les réponses correctes sont : Le traitement doit être impérativement pris pendant les repas, M. Victor B. ne doit jamais interrompre son traitement, En cas d'oubli de prise de moins de 12h, il doit immédiatement prendre son traitement, Il doit signaler toute anomalie survenant au cours de son traitement, Il doit éviter l'automédication

Question **4**
Non répondue
Noté sur 1,00

Face aux parents d'un nourrisson porteur d'une bronchiolite, quels sont les conseils à leur donner ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Coucher l'enfant en position proclive
- ☐ Éviter le jus d'orange avant le coucher
- ☐ Faire dormir l'enfant fenêtre ouverte
- ☐ Éviter le tabagisme passif
- ☐ Aérer la chambre de l'enfant matin et soir

Les réponses correctes sont : Éviter le tabagisme passif, Coucher l'enfant en position proclive, Aérer la chambre de l'enfant matin et soir