

Question **8**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les 5 affirmations suivantes laquelle ou lesquelles est/sont exactes ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Le principal effet indésirable du Mycophenolate mofetil est la néphrotoxicité tubulaire
- ☐ Everolimus ne nécessite pas de suivi des concentrations sanguines dans le cadre de la prévention du rejet de greffon rénal.
- ☐ Amiodarone augmente nettement les concentrations de ciclosporine par interaction métabolique
- ☐ Tacrolimus est un immunosuppresseur responsable de fréquentes hypotensions orthostatiques
- ☐ Ciclosporine est un immunosuppresseur appartenant à la famille des inhibiteurs de la calcineurine

Les réponses correctes sont : Ciclosporine est un immunosuppresseur appartenant à la famille des inhibiteurs de la calcineurine, Amiodarone augmente nettement les concentrations de ciclosporine par interaction métabolique

Question **9**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle est ou quelles sont la ou les bonnes réponses ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ L'investigateur coordinateur est celui qui prend l'initiative de la recherche biomédicale
- ☐ Un promoteur doit toujours faire appel à une société de recherche sous contrat
- ☐ Lors d'un audit, toutes les versions du protocole doivent être présentées
- ☐ Un promoteur est une personne physique qui dirige et surveille la recherche biomédicale sur un lieu

La réponse correcte est : Lors d'un audit, toutes les versions du protocole doivent être présentées

Question **10**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les 5 affirmations suivantes laquelle ou lesquelles est/ sont exactes ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ L'halopéridol antagonise l'activité de la L DOPA.
- ☐ La Lévodopa n'est pas absorbée au niveau de l'estomac mais au niveau du jéjunum par transport actif
- ☐ La dopathérapie est surtout efficace sur les tremblements mais améliore peu l'akinésie
- ☐ Le benserazide, utilisé dans la prise en charge de la maladie de parkinson, agit par inhibition de la dopadécarboxylase périphérique
- ☐ Le Métoclopramide est l'antiémétique de 1ère intention pour traiter les nausées et les vomissements liés à la dopathérapie

Les réponses correctes sont : Le benserazide, utilisé dans la prise en charge de la maladie de parkinson, agit par inhibition de la dopadécarboxylase périphérique, La Lévodopa n'est pas absorbée au niveau de l'estomac mais au niveau du jéjunum par transport actif, L'halopéridol antagonise l'activité de la L DOPA.