

Question **10**

Non répondue

Noté sur 1,00

Concernant les cytokines, indiquez la (ou les) bonne(s) réponse(s)

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ La nature biochimique des cytokines est très variable : les cytokines peuvent être des protéines, des sucres ou des lipides
- ☐ Les interférons de type 1 (interférons alpha et bêta) possèdent d’importantes propriétés anti-virales.
- ☐ Les cytokines exercent leurs fonctions par l’intermédiaire de la fixation à un récepteur cytoplasmique
- ☐ Les cytokines sont les médiateurs de la communication intercellulaire dans le système immunitaire
- ☐ Infliximab et Adalimumab sont 2 anticorps monoclonaux thérapeutiques dirigés contre le récepteur au TNF

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Les cytokines sont les médiateurs de la communication intercellulaire dans le système immunitaire, Les interférons de type 1 (interférons alpha et bêta) possèdent d’importantes propriétés anti-virales.

Question **11**

Non répondue

Noté sur 1,00

Choisir la ou les proposition(s) exacte(s) pour chacune des affirmations suivantes :
Chez l'homme, les immunoglobulines G

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ sont capables de traverser la barrière placentaire
- ☐ sont reconnus par les macrophages par leur fragment Fab
- ☐ présentent deux paratopes distincts
- ☐ présentent une affinité faible pour l'antigène lors d'une réponse secondaire
- ☐ sont les immunoglobulines les plus importantes dans le sérum d'un individu normal

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : sont les immunoglobulines les plus importantes dans le sérum d'un individu normal, sont capables de traverser la barrière placentaire

Question **12**

Non répondue

Noté sur 1,00

Concernant le cancer du col de l’utérus, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Il peut être prévenu par la détection de lésions précancéreuses
- ☐ Il peut être prévenu par la vaccination
- ☐ Il est associé à une primo-infection par un papillomavirus
- ☐ En France, c’est le 2^{ème} cancer le plus meurtrier chez la femme après le cancer du sein
- ☐ Seuls les géotypes HPV 16 et HPV 18 de papillomavirus sont impliqués dans le développement du cancer du col de l’utérus

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Il est associé à une primo-infection par un papillomavirus, Il peut être prévenu par la vaccination, Il peut être prévenu par la détection de lésions précancéreuses