

Question **63**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, quelle est (quelles sont) celle(s) qui est (sont) exactes ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ La digoxine doit être utilisée dès le stade I de l'insuffisance cardiaque chronique
- ☐ Les IEC permettent de réduire la morbi-mortalité de l'insuffisance cardiaque chronique
- ☐ L'ivabradine est contre-indiquée chez le patient insuffisant cardiaque
- ☐ Le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique a pour objectif d'augmenter la tolérance à l'effort
- ☐ Les bêta-bloquants diminuent la tachycardie observée dans l'insuffisance cardiaque chronique

Les réponses correctes sont : Le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique a pour objectif d'augmenter la tolérance à l'effort, Les IEC permettent de réduire la morbi-mortalité de l'insuffisance cardiaque chronique, Les bêta-bloquants diminuent la tachycardie observée dans l'insuffisance cardiaque chronique

Question **64**

Non répondue

Noté sur 1,00

Concernant le traitement de la tuberculose, indiquer la (les) affirmation(s) exacte(s) :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ L'atteinte neurologique est un effet indésirable majeur de la rifampicine.
- ☐ La rifampicine provoque une coloration rouge ou orangée des urines, des selles, des larmes et des lentilles cornéennes souples.
- ☐ La rifampicine est un inhibiteur enzymatique puissant.
- ☐ La rifampicine est un inducteur enzymatique puissant.
- ☐ La rifampicine agit principalement sur les bacilles intracellulaires car le milieu acide est nécessaire à son activité.

Les réponses correctes sont : La rifampicine est un inducteur enzymatique puissant., La rifampicine provoque une coloration rouge ou orangée des urines, des selles, des larmes et des lentilles cornéennes souples.