

Question **70**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les médicaments suivants utilisés dans le traitement des troubles du rythme cardiaque, lequel (lesquels) exerce(nt) une action résultant essentiellement d'un ralentissement du courant potassique ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ propranolol (AVLOCARDYL)
- ☐ atenolol (TENORMINE)
- ☐ verapamil (ISOPTINE)
- ☐ hydroxyquinidine (SERECOR)
- ☐ amiodarone (CORDARONE)

La réponse correcte est : amiodarone (CORDARONE)

Question **71**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquer la (les) affirmation(s) exacte(s) sur les effets indésirables potentiels des sulfamides hypoglycémiants :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Ils provoquent une prise de poids par effet insulinosécréteur
- ☐ Ils peuvent entraîner des hypoglycémies graves et prolongées prises en charge par injection de sérum glucosé hypertonique en cas de troubles de la conscience.
- ☐ Les hypoglycémies dues aux sulfamides hypoglycémiants sont prises en charge habituellement par injection de Glucagon
- ☐ Les hypoglycémies provoquées par ces médicaments sont mineures et sans séquelles neurologiques possibles
- ☐ Ils induisent une perte de poids par action au niveau du SNC

Les réponses correctes sont : Ils provoquent une prise de poids par effet insulinosécréteur, Ils peuvent entraîner des hypoglycémies graves et prolongées prises en charge par injection de sérum glucosé hypertonique en cas de troubles de la conscience.