

Question **14**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquer la (les) affirmation(s) exacte(s) dans la prise en charge du diabète de type 2 par les gliflozines, nouveaux anti diabétiques :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Leur action dépend du taux d'insulinémie des patients
- ☐ Ces médicaments agissent en provoquant une glycosurie par inhibition de la réabsorption tubulaire du glucose
- ☐ Ils agissent par inhibition sélective du cotransporteur sodium-glucose SGLT2 au niveau rénal
- ☐ Ils peuvent induire un coma par acidose lactique en diminuant la néoglucogénèse hépatique
- ☐ Ces médicaments peuvent entraîner une hypovolémie par excrétion accrue du Na⁺

Les réponses correctes sont : Ces médicaments agissent en provoquant une glycosurie par inhibition de la réabsorption tubulaire du glucose, Ces médicaments peuvent entraîner une hypovolémie par excrétion accrue du Na⁺, Ils agissent par inhibition sélective du cotransporteur sodium-glucose SGLT2 au niveau rénal

Question **15**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ La varénicline (Champix) est utilisée en première intention dans le sevrage tabagique
- ☐ Le bupropion (Zyban) est un dérivé amphétaminique
- ☐ Les patchs nicotiniques sont contre-indiqués chez la femme enceinte
- ☐ Les gommes à mâcher nicotiniques sont à utiliser comme des chewing-gum
- ☐ Les gommes à mâcher et les patchs nicotiniques peuvent être associés dans le sevrage tabagique

Les réponses correctes sont : Le bupropion (Zyban) est un dérivé amphétaminique, Les gommes à mâcher et les patchs nicotiniques peuvent être associés dans le sevrage tabagique