

Question **34**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les drogues suivantes, quelles sont celles qui constituent la base du traitement des leucémies aiguës myéloïdes (LAM) ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Anthracyclines
- ☐ Aracytine
- ☐ Vincristine
- ☐ Corticoïdes
- ☐ Bortézomib

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Anthracyclines, Aracytine

Question **35**

Non répondue

Noté sur 1,00

sélectionnez la ou les proposition(s) vraie(s).

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ L'association d'une thrombopénie et d'une anémie hémolytique avec présence de schizocytes fait évoquer le diagnostic de microangiopathie thrombotique (MAT)
- ☐ L'hyperlymphocytose est définie par un % de lymphocytes supérieur à 60%
- ☐ Le tabagisme chronique peut induire une polynucléose neutrophile
- ☐ À l'arrêt du médicament responsable d'un épisode d'agranulocytose aiguë médicamenteuse, l'apparition d'une monocytose annonce la normalisation ultérieure du nombre de PNN
- ☐ Une étiologie infectieuse doit être recherchée en priorité face à une agranulocytose

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Le tabagisme chronique peut induire une polynucléose neutrophile, À l'arrêt du médicament responsable d'un épisode d'agranulocytose aiguë médicamenteuse, l'apparition d'une monocytose annonce la normalisation ultérieure du nombre de PNN, L'association d'une thrombopénie et d'une anémie hémolytique avec présence de schizocytes fait évoquer le diagnostic de microangiopathie thrombotique (MAT)

Question **36**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quels sont les arguments clinico-biologiques en faveur d'une polyglobulie primitive de type maladie de Vaquez ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Présence de la mutation V617F du gène *JAK2*
- ☐ Thrombocytose
- ☐ Adénopathies
- ☐ Taux d'érythropoïétine sérique augmenté
- ☐ Splénomégalie

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Splénomégalie, Thrombocytose, Présence de la mutation V617F du gène *JAK2*