

Question **16**

Non répondue

Noté sur 1,00

M. Victor B., 38 ans, commercial, est infecté par un HCV de génotype 1. Il vous présente l'ordonnance suivante

Docteur A. Goffrettes
Médecine Générale

Consultations sur RDV
tous les jours
de 14h à 18h.

12/01/2015

Victor B 38 ans, 62 kgs

Sofosbuvir, Sovaldi, cp à 400 mg : 1/j
Daclatasvir, Daklinza, cp à 60 mg : 1/j
A revoir dans 12 semaines



Concernant le **daclatasvir**, quelles sont les réponses exactes ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Il est toujours prescrit en association
- ☐ C'est un inhibiteur de la NS5A
- ☐ Il est actif sur le HIV
- ☐ Il est actif sur tous les génotypes du HCV
- ☐ C'est un inhibiteur de la protéase

Les réponses correctes sont : C'est un inhibiteur de la NS5A, Il est toujours prescrit en association, Il est actif sur tous les génotypes du HCV

Question **17**

Non répondue

Noté sur 1,00

Mme Jeanine V, 27 ans, traductrice, est enceinte de 6 mois. Un bilan biologique a été réalisé qui donne les résultats suivants :

Recherche de l'antigène HBs : négative

Recherche d'anticorps anti-Rubéole :

- de type IgG : négative
- de type IgM : négative

Quels conseils adressez-vous à Mme Jeanine V. ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Aucun de ces conseils n'est adapté
- ☐ Se faire vacciner immédiatement contre la Rubéole
- ☐ Se faire vacciner contre la Rubéole dans les mois qui suivent l'accouchement
- ☐ Se faire vacciner contre la Rubéole dans les jours qui suivent l'accouchement
- ☐ Se faire vacciner contre le HBV après l'accouchement

Les réponses correctes sont : Se faire vacciner contre la Rubéole dans les jours qui suivent l'accouchement, Se faire vacciner contre la Rubéole dans les mois qui suivent l'accouchement, Se faire vacciner contre le HBV après l'accouchement