

Question **49**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquer la (les) affirmation(s) exacte(s) :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ La ciclosporine est un macrolide.
- ☐ La néphrotoxicité est un effet indésirable majeur de la ciclosporine.
- ☐ La ciclosporine inhibe le développement des réactions immunitaires à médiation cellulaire.
- ☐ La ciclosporine inhibe l'activité de la protéine m-TOR qui est une kinase indispensable à la progression du cycle cellulaire.
- ☐ La ciclosporine ne doit pas être associée aux corticoïdes.

Les réponses correctes sont : La ciclosporine inhibe le développement des réactions immunitaires à médiation cellulaire., La néphrotoxicité est un effet indésirable majeur de la ciclosporine.

Question **50**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes : A propos de l'azathioprine (Imurel*) :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ C'est un immunosuppresseur antiprolifératif
- ☐ Nécessite une surveillance de l'hémogramme
- ☐ Est déconseillée en association avec l'allopurinol
- ☐ Est à prendre en dehors des repas
- ☐ C'est une prodrug

Les réponses correctes sont : C'est un immunosuppresseur antiprolifératif, C'est une prodrug, Nécessite une surveillance de l'hémogramme

Question **51**

Non répondue

Noté sur 1,00

Concernant le traitement de la tuberculose, indiquer la (les) affirmation(s) exacte(s) :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Le schéma thérapeutique standard repose sur une trithérapie associant isoniazide, rifampicine et éthambutol.
- ☐ Le RIFINAH (isoniazide associé à la rifampicine) doit être pris en trois prises par jour.
- ☐ Le RIFINAH (isoniazide associé à la rifampicine) doit être pris en une prise par jour à jeun.
- ☐ L'insuffisance hépatique sévère est une contre-indication au traitement par isoniazide.
- ☐ L'insuffisance rénale sévère est une contre-indication au traitement par isoniazide.

Les réponses correctes sont : Le RIFINAH (isoniazide associé à la rifampicine) doit être pris en une prise par jour à jeun., L'insuffisance hépatique sévère est une contre-indication au traitement par isoniazide.