5/	2020 Quiz - Pharmacologie et pharmacie clinique
	Question <b>42</b>
	Non répondue
	Noté sur 1,00
	Quelle est ou quelles sont la ou les propositions exactes ?
	Veuillez choisir au moins une réponse :
	La nicardipine est un traitement de l'hypertension artérielle gravidique
	Les AVK sont utilisés chez la femme enceinte en première intention en cas de TVP
	Le bismuth est utilisable dans l'éradication d'Hélicobacter pylori
	Les IPP sont utilisés à double dose dans les ulcères gastro-duodénaux HP positif
	Le tramadol est contre indiqué chez l'épileptique
	Les réponses correctes sont : Le bismuth est utilisable dans l'éradication d'Hélicobacter pylori, Les IPP sont utilisés à double dose dans les ulcères gastro-duodénaux HP positif, La nicardipine est un traitement de l'hypertension artérielle gravidique, Le tramadol est contre indiqué chez l'épileptique
	Question 43
	Non répondue
	Noté sur 1,00
	Quelle est ou quelles sont la ou les bonnes réponses ?
	Veuillez choisir au moins une réponse :
	La gravité des conséquences d'une erreur médicamenteuse est gradée en quatre niveaux par la Société Française de Pharmacie Clinique
	Effet indésirable et erreur médicamenteuse ont des origines identiques

La réponse correcte est : La retranscription d'une ordonnance doit être bannie

La retranscription d'une ordonnance doit être bannie

Environ 70 % des erreurs médicamenteuses sont évitables