

Question **11**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle est ou quelles sont la ou les bonnes réponses ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ L'adhésion à un traitement par un anticancéreux oral fait intervenir l'acceptation, l'observance et la persistance
- ☐ Les traitements par anticancéreux par voie orale au long cours se multiplient
- ☐ Il existe une relation inverse entre activité DPD (Dihydropyrimidine Déshydrogénase) et taux plasmatique de 5 FU
- ☐ L'incidence d'un syndrome pharmacogénétique est fréquente

Les réponses correctes sont : L'adhésion à un traitement par un anticancéreux oral fait intervenir l'acceptation, l'observance et la persistance, Il existe une relation inverse entre activité DPD (Dihydropyrimidine Déshydrogénase) et taux plasmatique de 5 FU, Les traitements par anticancéreux par voie orale au long cours se multiplient

Question **12**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les antipsychotiques suivants ; lequel ou lesquels appartienne(nt) à la famille des antipsychotiques atypiques ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Risperidone
- ☐ Chlorpromazine
- ☐ Aripiprazole
- ☐ Clozapine
- ☐ Olanzapine

Les réponses correctes sont : Risperidone, Clozapine, Olanzapine, Aripiprazole

Question **13**

Non répondue

Noté sur 1,00

Concernant l'élimination du lithium, quelle est ou quelles sont la ou les bonnes réponses ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Elle est favorisée par la réabsorption au niveau du tube proximal
- ☐ Elle peut être augmentée par la dialyse
- ☐ Elle est favorisée par l'hyponatrémie
- ☐ Elle peut être augmentée par la diurétiques thiazidiques
- ☐ Elle est diminuée par la diurétiques anti-aldostérone

Les réponses correctes sont : Elle peut être augmentée par la dialyse, Elle est diminuée par la diurétiques anti-aldostérone