

Question **35**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquez la(les) proposition(s) exacte(s) concernant les fluoroquinolones :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ les fluoroquinolones ne sont pas absorbées par voie orale
- ☐ les fluoroquinolones peuvent entraîner des troubles du rythme et des torsades de pointe
- ☐ ce sont des antibiotiques toujours actifs sur les staphylocoques méticilline-résistants (SARM)
- ☐ les fluoroquinolones sont indiquées dans le traitement d'infections ostéoarticulaires
- ☐ ce sont des antibiotiques qui agissent en inhibant la réplication de l'ADN bactérien

Les réponses correctes sont : ce sont des antibiotiques qui agissent en inhibant la réplication de l'ADN bactérien, les fluoroquinolones sont indiquées dans le traitement d'infections ostéoarticulaires, les fluoroquinolones peuvent entraîner des troubles du rythme et des torsades de pointe

Question **36**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquez la(les) proposition(s) exacte(s) : La coloration de Gram fait intervenir :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ 2 étapes de lavage à l'éthanol
- ☐ 2 colorants
- ☐ la fuchsine
- ☐ le violet de gentiane
- ☐ une étape utilisant un oxydant à base d'iode

Les réponses correctes sont : 2 colorants, le violet de gentiane, la fuchsine, une étape utilisant un oxydant à base d'iode

Question **37**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquez la(les) proposition(s) exacte(s) à propos de *Clostridium difficile* :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ c'est un bacille à Gram positif aérobie strict non sporulant
- ☐ le traitement des formes peu sévères fait appel en première intention au métronidazole per os
- ☐ le pouvoir pathogène est principalement lié à la sécrétion de toxines
- ☐ il est impliqué dans la survenue de diarrhées dites « post-antibiotiques »
- ☐ il est responsable de diarrhées nosocomiales fréquemment récidivantes

Les réponses correctes sont : il est responsable de diarrhées nosocomiales fréquemment récidivantes, le pouvoir pathogène est principalement lié à la sécrétion de toxines, il est impliqué dans la survenue de diarrhées dites « post-antibiotiques », le traitement des formes peu sévères fait appel en première intention au métronidazole per os

Question **38**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquez la(les) proposition(s) exacte(s) : *Salmonella enterica* est :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ une entérobactérie
- ☐ parfois responsable de toxi-infections alimentaires collectives
- ☐ entéro-invasive
- ☐ capable de se développer uniquement sur des milieux hautement sélectifs
- ☐ souvent transmise par des ovo-produits

Les réponses correctes sont : parfois responsable de toxi-infections alimentaires collectives, une entérobactérie, entéro-invasive, souvent transmise par des ovo-produits