

Question **7**
Non répondue
Noté sur 1,00

M. Jean-Claude M., 47 ans, gérant de magasin, est infecté par le HIV. Il vous présente l'ordonnance suivante :

Docteur A. Goffrettes
Médecine Générale

12/01/2015

Jean Claude M., 47 ans, 75 kgs

Emtricitabine/tenofovir, Truvada, cp à 245/200 mg : 1/j
Darunavir/ritonavir, Prezista, cp à 800/100 mg : 1/j
A revoir dans 6 mois

Consultations sur RDV
tous les jours
de 14h à 18h.



Concernant cette ordonnance, quelles sont les réponses exactes ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ M. Jean-Claude M. doit prendre son traitement à jeun
- ☐ L'association darunavir+ritonavir est une association de 2 antiprotéases
- ☐ L'association emtricitabine+tenofovir est une association de 2 inhibiteurs de la transcriptase inverse
- ☐ Dans le traitement initial d'une infection par le HIV, une trithérapie est toujours conseillée
- ☐ M. Jean-Claude M. doit prendre son traitement à heures fixes

Les réponses correctes sont : L'association darunavir+ritonavir est une association de 2 antiprotéases, L'association emtricitabine+tenofovir est une association de 2 inhibiteurs de la transcriptase inverse, Dans le traitement initial d'une infection par le HIV, une trithérapie est toujours conseillée, M. Jean-Claude M. doit prendre son traitement à heures fixes