

Question **43**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquez la(les) proposition(s) exacte(s) à propos d'*Helicobacter pylori* :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ la majorité des sujets présentant un ulcère gastrique ou duodénal sont porteurs de cette bactérie
- ☐ il s'agit d'une bactérie qui ne supporte pas les milieux à pH acide
- ☐ il s'agit d'une bactérie de forme hélicoïdale qui sécrète une uréase
- ☐ le test respiratoire à l'urée marquée au ¹³C permet un diagnostic indirect de portage de cette bactérie
- ☐ le traitement des ulcères gastriques repose sur l'utilisation exclusive des inhibiteurs de pompe à proton

Les réponses correctes sont : la majorité des sujets présentant un ulcère gastrique ou duodénal sont porteurs de cette bactérie, il s'agit d'une bactérie de forme hélicoïdale qui sécrète une uréase, le test respiratoire à l'urée marquée au ¹³C permet un diagnostic indirect de portage de cette bactérie

Question **44**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquez la(les) proposition(s) exacte(s) concernant les macrolides :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ ce sont des antibiotiques indiqués dans le traitement d'infections graves à bactéries multi-résistantes
- ☐ ce sont des antibiotiques présentant une bonne activité sur les bactéries intracellulaires
- ☐ les interactions médicamenteuses avec les macrolides sont nombreuses
- ☐ ce sont des antibiotiques bactériostatiques
- ☐ ce sont des antibiotiques non absorbés par voie orale

Les réponses correctes sont : ce sont des antibiotiques bactériostatiques, ce sont des antibiotiques présentant une bonne activité sur les bactéries intracellulaires, les interactions médicamenteuses avec les macrolides sont nombreuses

Question **45**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquez la(les) proposition(s) exacte(s) : Les streptocoques :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ sont des cocci à Gram négatif
- ☐ sont aéro-anaérobies facultatifs
- ☐ sont parfois pathogènes
- ☐ ont une catalase
- ☐ sont souvent disposés en chaînettes à l'observation microscopique

Les réponses correctes sont : sont souvent disposés en chaînettes à l'observation microscopique, sont aéro-anaérobies facultatifs, sont parfois pathogènes

Question **46**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquez la(les) proposition(s) exacte(s) : Les toxi-infections alimentaires collectives :

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ touchent au moins deux personnes ayant partagé le même repas
- ☐ impliquent un défaut majeur d'hygiène
- ☐ sont à déclaration obligatoire
- ☐ impliquent uniquement des bactéries
- ☐ nécessitent un développement bactérien dans le tube digestif

Les réponses correctes sont : sont à déclaration obligatoire, touchent au moins deux personnes ayant partagé le même repas