

Question **25**

Non répondue

Noté sur 1,00

Indiquer la (les) proposition(s) exacte(s) concernant le vaccin contre la rubéole

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Il est contre-indiqué pendant la grossesse
- ☐ Il est toujours associé aux vaccins contre la rougeole et les oreillons
- ☐ Il est recommandée à l'âge de 12 mois pour la première injection, 16-18 mois pour la seconde et 6 ans pour la troisième
- ☐ Il est recommandé pour toute femme non vaccinée ayant un projet de grossesse
- ☐ C'est un vaccin vivant atténué

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Il est contre-indiqué pendant la grossesse, Il est toujours associé aux vaccins contre la rougeole et les oreillons, C'est un vaccin vivant atténué, Il est recommandé pour toute femme non vaccinée ayant un projet de grossesse

Question **26**

Non répondue

Noté sur 1,00

Dans l'immunité vis-à-vis d'une bactérie extracellulaire

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ La voie alterne du complément est initiée par les anticorps
- ☐ Les lymphocytes B produisent des perforines
- ☐ L'opsonisation joue un rôle important grâce au système du complément
- ☐ L'opsonisation joue un rôle important grâce aux IgM
- ☐ Les lymphocytes NK phagocytent les bactéries

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est : L'opsonisation joue un rôle important grâce au système du complément

Question **27**

Non répondue

Noté sur 1,00

Concernant les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?

Veuillez choisir au moins une réponse :

- ☐ La maladie de Crohn doit son nom au premier patient chez qui elle a été décrite, William Crohn
- ☐ Dans les pays industrialisés, la prévalence moyenne des MICI est d'environ 10 à 20 cas pour 1000 habitants
- ☐ Les MICI évoluent généralement sur un mode intermittent, avec une alternance de poussées et de rémissions
- ☐ Il existe deux principales formes de MICI : la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique
- ☐ Les MICI touchent principalement les adultes jeunes

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Il existe deux principales formes de MICI : la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, Les MICI touchent principalement les adultes jeunes, Les MICI évoluent généralement sur un mode intermittent, avec une alternance de poussées et de rémissions