

Question **61**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquer la (les) affirmation(s) exacte(s) dans la prise en charge du diabète de type 2 par les gliptines :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Ces médicaments, d'origine peptidique, sont administrés par voie injectable à l'aide de stylos préremplis.
- ☐ Ce sont des inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose (SGLT2) au niveau rénal
- ☐ Ces médicaments peuvent être responsables de troubles infectieux
- ☐ Ce sont des inhibiteurs compétitifs et réversibles d'alpha glucosidases intestinales
- ☐ Ce sont des inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase de type IV (DPP IV)

Les réponses correctes sont : Ce sont des inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase de type IV (DPP IV), Ces médicaments peuvent être responsables de troubles infectieux

Question **62**

Non répondue

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, indiquer la (les) affirmation(s) exacte(s) dans la prise en charge du diabète de type 2 :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Selon les dernières recommandations de l'HAS, on doit prescrire en 1ère intention une gliptine pour le traitement médicamenteux du contrôle glycémique
- ☐ Le but des mesures hygiéno diététiques est de limiter les hyperglycémies postprandiales tout en évitant d'éventuelles hypoglycémies et de limiter aussi certains facteurs de risque cardio-vasculaires
- ☐ Selon les dernières recommandations de l'HAS, on doit prescrire en 1ère intention la metformine pour le traitement médicamenteux du contrôle glycémique
- ☐ La mise en place de mesures hygiéno diététiques efficaces est un préalable nécessaire au traitement médicamenteux du contrôle glycémique pour les patients dont le diabète est nouvellement diagnostiqué et dont l'espérance de vie est > à 15 ans, sans ATCD cardio-vasculaire et sans signes hyperglycémie
- ☐ les mesures hygiéno diététiques peuvent être arrêtées en cas d'anti diabétique prescrit si celui-ci est efficace en permettant le contrôle glycémique chez le patient

Les réponses correctes sont : Selon les dernières recommandations de l'HAS, on doit prescrire en 1ère intention la metformine pour le traitement médicamenteux du contrôle glycémique, La mise en place de mesures hygiéno diététiques efficaces est un préalable nécessaire au traitement médicamenteux du contrôle glycémique pour les patients dont le diabète est nouvellement diagnostiqué et dont l'espérance de vie est > à 15 ans, sans ATCD cardio-vasculaire et sans signes hyperglycémie, Le but des mesures hygiéno diététiques est de limiter les hyperglycémies postprandiales tout en évitant d'éventuelles hypoglycémies et de limiter aussi certains facteurs de risque cardio-vasculaires