

Question **61**

Non répondue

Noté sur 1,00

En cas de suspicion de myélome, devant une hypogammaglobulinémie sans immunoglobuline monoclonale, on doit envisager :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Un myélome à IgD
- ☐ Un myélome à IgA
- ☐ Un myélome non sécrétant
- ☐ Un myélome à chaînes légères
- ☐ Un autre diagnostic qu'un myélome

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Un myélome à chaînes légères, Un myélome non sécrétant, Un autre diagnostic qu'un myélome

Question **62**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la maladie de Willebrand :

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Elle est liée à une anomalie qualitative ou quantitative du facteur Willebrand
- ☐ Le facteur VIII peut être abaissé dans cette maladie
- ☐ C'est la plus fréquente des anomalies constitutionnelles de l'hémostase
- ☐ Elle touche uniquement les sujets de sexe masculin
- ☐ Ses manifestations cliniques sont principalement des hémorragies cutané-muqueuses

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : C'est la plus fréquente des anomalies constitutionnelles de l'hémostase, Elle est liée à une anomalie qualitative ou quantitative du facteur Willebrand, Le facteur VIII peut être abaissé dans cette maladie, Ses manifestations cliniques sont principalement des hémorragies cutané-muqueuses

Question **63**

Non répondue

Noté sur 1,00

L'insuffisance hépatocellulaire sévère s'accompagne habituellement d'un défaut de synthèse d'une ou plusieurs protéines de la coagulation. La(les)quelle(s) ?

Veillez choisir au moins une réponse :

- ☐ Le facteur V
- ☐ Le facteur Willebrand
- ☐ Le facteur VII
- ☐ La protéine C
- ☐ L'antithrombine

Votre réponse est incorrecte.

Les réponses correctes sont : Le facteur VII, Le facteur V, L'antithrombine, La protéine C