

# Primer Parcial (1C 2025)

Ayuda: Recordar que  $\binom{a}{b} \leq a^b$  ¡Recordar leer todo el examen, me bajaron pts pq' lo acoté con cualquier cosa a  $\binom{a}{b}$  unu.

Ej 1: Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas, o si implican la solución a alguna pregunta abierta. En cualquiera de los casos demostrar.

a) Si  $P = NP$ , entonces  $coNP = NP$

b)  $NPSPACE = coNPSPACE$

c) Si  $P \neq NP$  entonces cualquier problema en  $NP$  q' no esté en  $P$  debe ser  $NP$ -hard.

d) Todos los problemas en  $NP$  (salvo los triviales  $(\emptyset, \{a, 1\}^*)$ ) son  $NP$ -completos.

e) SAT es  $PSPACE$ -hard

f) Existe un  $K \in \mathbb{N}$  tal que  $NP \subseteq NDTIME(n^K)$ .

obs: No se da pts. a respuestas sin justificar.

Ej 1:

a) Si  $P = NP$ , entonces  $coNP = NP$

Verdadero

Si  $P = NP$  y sé que  $P = coP$ , puedo ver que  $P = coNP$ , porque  $coNP = coP$  (asocio 1 a 1 lenguajes de  $P$  a  $NP$ , los cuales voy complementando y asociando 1 a 1 lenguajes de  $coP$  a  $coNP$ ) por lo cual,  $NP = coNP$ .

b)  $NPSPACE = coNPSPACE$

Verdadero

Como sé que  $PSPACE = NPSPACE$  (hay un teo. en la teoría sobre esto).

También sé que  $PSPACE = coPSPACE$  (Es la misma  $M$  det. con espacio poly y que nega la salida)

Deduzco que  $NPSPACE = coNPSPACE$  media análogamente al punto a)

c) Si  $P \neq NP$  entonces cualquier problema en  $NP$  q' no esté en  $P$  debe ser  $NP$ -hard.

Falso

Salvo la falsedad si planteamos el Teorema de Ladner.

Si  $P \neq NP \Rightarrow \exists L. L \in NP / L \notin P$  y  $L \notin NP$ -Completo s.i. (def. NP-C)

$\exists L. L \in NP / L \notin P$  y  $(L \notin NP \text{ o } L \notin NP\text{-hard})$  s.i.

$\exists L. L \in NP / (L \notin P \text{ y } L \notin NP) \text{ o } (L \notin P \text{ y } L \notin NP\text{-hard})$  s.i. (contradicción:  $L \in NP$  y  $L \notin NP$ )

$\exists L. L \in NP / L \notin P$  y  $L \notin NP\text{-hard}$

Contradice el punto c

d) Todos los problemas en  $NP$  (salvo los triviales  $(\emptyset, \{a, 1\}^*)$ ) son  $NP$ -completos.

Pregunta abierta.

Sabemos q'  $P \subseteq NP$ , por lo cual, lo anterior implica que si  $L \in P \Rightarrow L \in NP$ -C, lo cual si lo supiésemos podríamos decir que  $P = NP$ , ya que reduciríamos cualquier  $\Pi \in NP$  a cualquier  $L \in P$ , a sea que cualquier  $\Pi \in P$  ( $L$  no trivial).

No sabemos si  $P = NP$ , por lo que d) es una Preg. abierta.

e) SAT es  $PSPACE$ -hard Pregunta abierta.

Si SAT fuese  $PSPACE$ -hard podríamos ver que  $NP = PSPACE$  y esto no se sabe.

La justificación sale de que podría reducir cualquier problema en  $PSPACE$  a  $NP$  (por def. de hardness), también ya sé que  $NP \subseteq PSPACE$ , por lo cual quedaría que  $PSPACE = NP$ .

1) Existe un  $K \in \mathbb{N}$  tal que  $NP \subseteq NDTIME(n^K)$ . Falso

Por el Teorema de jerarquía de tiempos no determinístico.

Q sea, se' que si  $f(n) = o(g(n))$  con  $f$  y  $g$  tiempo construibles, entonces se' que

$$NDTIME(f(n)) \subsetneq NDTIME(g(n))$$

Puedo reemplazar a  $f(n)$  por  $n^K$  y  $g(n)$  por  $n^{K+1}$  y como  $n^K = o(n^{K+1})$  se' que

$$NDTIME(n^K) \subsetneq NDTIME(n^{K+1})$$

Pero  $n^K$  y  $n^{K+1}$  son parte de la definición de  $NP = \bigcup_{c \in \mathbb{N}} NDTIME(n^c)$   $\gamma$

Ej 2: Enunciar y demostrar el teorema de jerarquía de tiempos determinísticos.

Ej 2:

Sea  $f, g$  construibles en tiempo y que  $f(n \log n) = o(g(n))$ , entonces:

$$DTIME(f(n)) \subsetneq DTIME(g(n)).$$

Demo en el Teo 14.

Ej 3: Considerar los siguientes problemas:

BALANCED-3-SAT =  $\{ \langle \varphi \rangle : \varphi \text{ es una fórmula 3CNF satisficible por una asignación q' donde todas las variables a falso como a verdadero} \}$

AT-MOST-3-SAT =  $\{ \langle \varphi \rangle : \varphi \text{ es una fórmula 3CNF y hay una asignación q' que satisface la fórmula q' donde a lo sumo 10 variables a verdadero} \}$ .

Para cada uno decidir si está en P o si es NP-completo (asumimos q'  $P \neq NP$ ). En cualquiera de los casos, demostrar la afirmación.

Ej 3:

AT-MOST-3-SAT  $\in P$  pse ve a ojo pq' tiene un número fijo de var. q' hay que mandar a verdadero.

Para demostrar su pertenencia a P debo hacer una máq. det. poly que compute AM-3S.

$M: \langle \varphi \rangle$   $\binom{n}{10} \leq n^{10}$  con  $n = |\varphi|$

- Genero todas las asignaciones con a lo sumo 10 variables en verdadero y para cada  $v$  hago:  $\rightarrow O(n^{10} \cdot n)$
- if ( $v \models \varphi$ ):  $\rightarrow O(n)$
- ret true
- ret false

Luego, queda mostrar que M decide AM-3S.

Esto se ve ya que M genera todas las asignaciones candidatas a tener 10 variables verdaderas y luego se fija si alguna satisface  $\varphi$ . Si ninguna la hace, termina de generar todas las posibles y devuelve false.

BALANCED-3-SAT  $\in NP$ -Completo

B-3SAT  $\in NP$ :

Para ver esto voy a hacer una máq. N det. poly. que use un certificado u de manera que B-3SAT tenga de verificado a N y de certificado a u.

Certificado: Palabra de  $\{0,1\}^n$  con  $n = |\varphi|$  (para hacer de valoración de  $\varphi$ )

$N: \langle \varphi, u \rangle$

- Verifico que C tenga igual cantidad de ceros que de unos
- Veo que  $u \models \varphi$ .

B-3SAT  $\in NP$ -Hard:

Busco un problema que sé que es NP-hard tal que lo pueda reducir con una f computable poly. a B-3SAT.

Intuitivamente pienso en 3SAT  $\leq_p$  B-3SAT.

$$x \in \text{3SAT} \text{ sii } f(x) \in \text{B-3SAT}$$

Para que suceda esto necesito q'  $f$  transforme a una  $\varphi$  a  $\varphi'$  tal q' si  $\varphi$  es SAT antes ahora  $\varphi'$  tenga una valoración con igual cantidad de 0's que 1's en alguna valoración

$$(l_{11} \vee l_{12} \vee l_{13}) \wedge \dots \wedge (l_{m1} \vee l_{m2} \vee l_{m3}) = \varphi$$

Si tengo:  $(l'_{11} \vee l'_{12} \vee l'_{13}) \wedge \dots \wedge (l'_{m1} \vee l'_{m2} \vee l'_{m3}) = \phi$

Siendo que  $\phi$  tiene la misma estructura que  $\varphi$ , con variables nuevas y  $l_{ij} = \neg l'_{ij}$

O sea, si  $\varphi = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_2) \Rightarrow \phi = (\neg y_1 \vee \neg y_2 \vee \neg y_3) \wedge (\neg y_1 \vee \neg y_2 \vee \neg y_2)$

$$\varphi' = \varphi \wedge \phi$$

La máq.  $M$  det. poly. que uso para computar  $f$  es:

$$M: \langle \varphi \rangle$$

- Genera  $n$  variables proposicionales distintas a las que aparecen en  $\varphi$ .
- Itera por  $\varphi$  y crea  $\phi$  de manera que respete la estructura, pero que por cada  $x_i$  de  $\varphi$  haya un  $\neg y_i$  de  $\phi$  (con  $x_i$  las var. prop. de  $\varphi$  y  $y_i$  las var. prop. de  $\phi$ )

Ej 4: Dado un lenguaje  $\Pi$  y un número natural  $K \in \mathbb{N}$  definimos:

$$\Pi^K = \{x_1 x_2 \dots x_K : x_i \in \Pi, \forall 1 \leq i \leq K\}$$

$$\Pi^* = \bigcup_{K \in \mathbb{N}} \Pi^K$$

(En caso de ser necesario se puede asumir en a) y b) que  $\lambda \notin \Pi$ , donde  $\lambda$  es la cadena vacía (por más q' el resultado sea independiente a esta suposición)).

a) Probar q' para todo  $K \in \mathbb{N}$  vale que si  $\Pi \in P$  entonces  $\Pi^K \in P$ .

b) Probar q' si  $\Pi \in NP$ , entonces  $\Pi^* \in NP$

a)

Si  $\Pi \in P$ , entonces tenga una máq.  $M$  det. poly tal que  $\Pi(M)$ .

Luego, para ver que  $\Pi^K \in P$  haga  $M'$  det. poly. tal que  $\Pi^K(M')$ , de la siguiente forma:

$M': \langle X \rangle$

$$\binom{n}{K} \leq n^K$$

- Hago todas las posibles particiones en  $K$  palabras y por cada una veo que cada palabra de esta partición esté en  $K$  con  $M$ .

$M(y) \rightarrow O(\text{poly})$  por lo dicho antes ( $|Y| \leq |X|$  por q' es una parte de  $X$ ).

de la máq.  $M$

$$O(n^K \cdot \text{poly})$$

El  $K$  es fijo, por lo cual es una cte y es poly.

O sea, puedo ver todas las particiones posibles de  $X$  en en  $O(K n^K)$  con  $n = |X|$ .

A cada partición le evalúo si todos sus elementos están en  $\Pi$  haciendo  $M(x_i)$ .  $O(\text{poly de } M)$

Si están todos retorna true, si no, repito el proceso con otra partición.  $O(1)$

Si ninguna partición retornó true, retorno False.  $O(1)$

$$\hookrightarrow \text{Todo} = O(K n^K \cdot \text{poly de } M).$$

b)

Si  $\Pi \in NP$ , entonces:

$$x \in \Pi \text{ si: } \exists u \in \{0,1\}^{p(|x|)}. M(\langle x, u \rangle) = 1$$

Q'vra  $\Pi^* \in NP$ , o sea que  $\bigcup_{K \in \mathbb{N}} \Pi^K \in NP$

Para ver esto q'q existe  $M'$  det. poly tal que:

$$y \in \Pi^* \text{ si: } \exists c \in \{0,1\}^{q(|y|)}. M'(\langle y, c \rangle) = 1.$$

El  $u$  puede variar según el  $y$

Certificado:  $\langle U, l \rangle$  Donde  $U = \{u_1, u_2, \dots, u_K\}$  donde cada  $u_i$  es un certificado para usar en  $x_i$ , y  $l = \{s_1, s_2, \dots, s_K\}$  donde cada  $s_i$  es un número que indica el tamaño de la palabra  $x_i$ , sirve para dividir  $x_i$ .

$$|U| = O(K p(|x|))$$

$$|l| = O(\log |x| \cdot K)$$

$M': \langle Y, \langle U, l \rangle \rangle \rightarrow O(Kp(|x|) + |Y| + |Y| \cdot \text{poly}(\log M)) = \text{Polinomial}$

- Verifico que  $U$  tenga  $K$  elementos de tamaño  $p(|Y|)$  cada uno  $O(Kp(|Y|))$
- Verifico que todos los elementos de  $l$  sean  $> 0$ , que  $l \neq \emptyset$  y que  $\text{sum}(l) = |x|$   $O(|Y|)$
- Particiono  $Y$  como indica  $l$  y por cada parte  $y_i$  veo que  $M(\langle y_i, u_i \rangle) = 1$   $O(|Y| \cdot \text{poly}(\log M))$
- Si alguna no lo es retorno falso  $O(1)$
- Como toda  $y_i \in \Pi$ , entonces, retorno verdadero.  $O(1)$

De esta forma tengo una máquina polinomial det. que verifica que  $Y \in \Pi^*$  con el certificado  $\langle U, l \rangle$  porque es básicamente que hay una partición de  $Z$  elementos tal que  $Y \in \Pi^Z$  y si con  $\langle U, l \rangle$  ya tengo como partir  $Y$  y cuáles son los certificados para  $M$  tales que me diga si  $y_i \in \Pi$ , puedo resolver el resto en tiempo polinomial con  $M'$ .

$\gamma$