

Disposition of Participant
All Participants as Treated

	Placebo		Low Dose		High Dose		Total	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
Participants in population	86		84		84		254	
Trial Disposition								
Discontinued	24	(27.9)	12	(14.3)	20	(23.8)	56	(22.0)
Adverse Event	18	(20.9)	9	(10.7)	13	(15.5)	40	(15.7)
I/E Not Met	3	(3.5)	0	(0.0)	4	(4.8)	7	(2.8)
Lack of Efficacy	2	(2.3)	2	(2.4)	2	(2.4)	6	(2.4)
Withdrew Consent	1	(1.2)	1	(1.2)	1	(1.2)	3	(1.2)
Participants Ongoing	62	(72.1)	72	(85.7)	64	(76.2)	198	(78.0)
Participant Study Medication Disposition								
Completed	58	(67.4)	25	(29.8)	27	(32.1)	110	(43.3)
Discontinued	28	(32.6)	59	(70.2)	57	(67.9)	144	(56.7)
Adverse Event	2	(2.3)	6	(7.1)	11	(13.1)	19	(7.5)
Death	1	(1.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.4)
I/E Not Met	1	(1.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.4)
Lack of Efficacy	1	(1.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.4)
Sponsor Decision	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(1.2)	1	(0.4)
Withdrew Consent	2	(2.3)	1	(1.2)	2	(2.4)	5	(2.0)

Source: [CDISCpilot: adam-ads]