



数学分析学习笔记

复习整理笔记

作者：阮炜挺

组织：宁波大学数学与统计学院

Given yourself an epsilon of room!

目录

第一章 公式大全	1
1.1 常见函数的泰勒展开式	1
1.2 常见三角恒等式	2
1.3 常见积分公式	3
第二章 实数完备性定理	5
2.1 定理叙述	5
2.2 确界原理	8
2.3 单调有界原理	10
2.4 Cauchy 收敛原理	12
2.5 聚点定理与致密性定理	15
2.6 闭区间套定理	17
2.7 有限覆盖定理	19
2.8 Dedekind 分割定理	21

第一章 公式大全

1.1 常见函数的泰勒展开式

几何级数

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n) \\ \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)\end{aligned}$$

指数和对数函数

$$\begin{aligned}e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)\end{aligned}$$

幂函数

$$\begin{aligned}(1+x)^a &= 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \cdots + \binom{a}{n}x^n + o(x^n) \\ \sqrt{1+x} &= \boxed{1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2} + \frac{1}{16}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}(2n-3)!!}{2^n n!}x^n + o(x^n)\end{aligned}$$

三角函数

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \\ \tan x &= \boxed{x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5} + \cdots + \frac{B_{2n}(-4)^n(1-4^n)}{(2n)!}x^{2n-1} + o(x^{2n})\end{aligned}$$

反三角函数

$$\begin{aligned}\arcsin x &= \boxed{x + \frac{x^3}{6}} + \frac{3}{40}x^5 + \cdots + \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)}x^{2n+1} + o(x^{2n+2}) \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})\end{aligned}$$

1.2 常见三角恒等式

积化和差公式

$$\begin{aligned}\sin A \sin B &= \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)] \\ \cos A \cos B &= \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)] \\ \sin A \cos B &= \frac{1}{2} [\sin(A + B) + \sin(A - B)] \\ \cos A \sin B &= \frac{1}{2} [\sin(A + B) - \sin(A - B)]\end{aligned}$$

和差化积公式

$$\begin{aligned}\sin A + \sin B &= 2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) \\ \sin A - \sin B &= 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right) \\ \cos A + \cos B &= 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right) \\ \cos A - \cos B &= -2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right)\end{aligned}$$

基本恒等式

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

倒数关系

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} \quad \csc x = \frac{1}{\sin x} \quad \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

倍角公式

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

半角公式

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$$

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

三角函数万能代换


令 $t = \tan \frac{x}{2}$ 。

则

$$\tan x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 - t^2}$$

根据勾股定理，我们有 $(2t)^2 + (1 - t^2)^2 = 4t^2 + 1 - 2t^2 + t^4 = t^4 + 2t^2 + 1 = (1 + t^2)^2$ 。

根据三角函数的几何意义，绘出三边关系图：



因此，

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}$$

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

而 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，所以 $x = 2 \arctan t$ 。

则

$$dx = \frac{2}{1 + t^2} dt$$

最终结果：

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}$$

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

$$\tan x = \frac{2t}{1 - t^2}$$

$$x = 2 \arctan t$$

$$dx = \frac{2}{1 + t^2} dt$$

1.3 常见积分公式

重要积分公式

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \, dx = \ln |x + \sqrt{x^2+1}| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \, dx = \ln |x + \sqrt{x^2-1}| + C$$

三角函数积分

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$$

反三角函数积分


$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arccos x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \, dx = \operatorname{arcsec} x + C \quad (|x| > 1)$$

注 由于 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, 那么第二个式子其实也可以写成 $\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = -\arcsin x + C$

 **笔记** 利用以上结果, 我们还可以进行特殊代换, 得到一些常用的积分公式:

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} \, dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} \, dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} \, dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

第二章 实数完备性定理

2.1 定理叙述

定理 2.1 (确界原理)

任何非空集 $E \subset \mathbb{R}$, 若它有上界, 则必有上确界 $\sup E \in \mathbb{R}$. (等价地, 若有下界, 则必有下确界.)

定理 2.2 (单调有界原理)

任何单调递增、有上界的序列 $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$, 必有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}$. (等价地, 单调递减有下界也必有极限.) (所谓有极限, 指有有限极限, 下同.)

定理 2.3 (Cauchy 收敛原理)

序列 $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ 收敛的充分必要条件是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ 当 } m, n > N \text{ 时, 有 } |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

定理 2.4 (致密性定理 (Bolzano-Weierstrass 定理))

(a) 有界数列的定义: 设 $\{x_n\}$ 为一数列, 若 $\exists M > 0$, 满足对任意正整数 n , $|x_n| \leq M$, 则称 $\{x_n\}$ 为有界数列。

(b) 定理内容: 设 $\{x_n\}$ 为一有界数列, 则 $\{x_n\}$ 一定有收敛子列。即存在 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$, 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$ 存在。反之若 $\{x_n\}$ 的任何子列都不收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 。

定理 2.5 (聚点定理)

(a) 聚点的定义: 设 $E \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ 满足: 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}) \cap E \neq \emptyset,$$

则称 x_0 为 E 的聚点。记 E' 为 E 的所有聚点构成的集合。

(b) 定理内容: 设 E 是无穷有界集合, 则 E 至少有一个聚点 (即 $E' \neq \emptyset$)。

定理 2.6 (闭区间套定理)

定义:

设有无穷多个闭区间 $[a_n, b_n]$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 满足以下两个条件:

1. $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$

将这一无穷多个闭区间所构成的集合 $\{[a_n, b_n]\}$ 称为一个闭区间套, 简称区间套。

定理内容:

若 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一个闭区间套, 则存在唯一实数 ξ 满足:

$$\xi \in [a_n, b_n], \quad \forall n = 1, 2, 3, \dots$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$

定理 2.7 (有限覆盖定理)

(a) 定义: 设 $E \subset \mathbb{R}$, $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是一族开区间, 若满足

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \supseteq E,$$

则称 $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 为 E 的开覆盖。若 E 的任何开覆盖都存在有限子覆盖 (即存在有限个 $O_{\lambda_1}, \dots, O_{\lambda_n}$ 仍覆盖 E), 则称 E 是紧的。

(b) 定理内容: 任何有界闭区间 $[a, b]$ 都是紧的 (闭区间上的任一开覆盖必存在有限子覆盖)。

(c) 等价描述: 设 $\{\Delta\}$ 是一组开区间, 若 $\forall x \in [a, b], \exists \Delta_x \in \{\Delta\}$, 使得 $x \in \Delta_x$, 则称 $\{\Delta\}$ 为闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖。定理指出, $[a, b]$ 的任一开覆盖 $\{\Delta\}$ 中, 必存在有限子集 $\{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r\} \subset \{\Delta\}$, $\{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r\}$ 仍为 $[a, b]$ 的一个开覆盖 (称之为有限子覆盖)。

**定理 2.8 (Dedekind 分割定理)**

若将实数分为上、下 (非空的) 两组: A' 和 A , 使得

1. 每个实数必在, 且仅在两组之一;
2. 上组 A' 中的每个数必大于下组 A 中的每个数,

则称 A 和 A' 组成一 Dedekind 分割, 记作 $A|A'$ 。每个 $A|A'$ 确定唯一的实数 ξ 。下面称它为分割点。

Dedekind 定理指出, 此时

1. 要么 $\xi \in A$, 则下组 A 中有最大值 ξ , 而上组 A' 中无最小值;
2. 要么 $\xi \in A'$, 则下组 A 中无最大值, 而上组 A' 中有最小值 ξ 。

该定理非常直观, 意即: 在数轴任何地方, 用法平面去截, 必截得唯一的实数 ξ (表明实轴连续, 无空缺)。该实数 ξ 将数轴分成 $A|A'$ 两半, 要么 $\xi \in A$, 要么 $\xi \in A'$ 。



我们先证明致密性定理 2.5 与聚点定理 2.5 的等价性, 接下来的互证里, 只涉及其中之一。

聚点定理 2.5 \Rightarrow 致密性定理 2.5

证明 设 $\{a_n\}$ 是 \mathbb{R} 中的有界列。

考虑集合 $E := \{a_n \mid n \geq 1\}$, 则 E 是有界集。

- 情形 1. 若 E 是有限集, 则必有某个 a 在 $\{a_n\}$ 中出现无限多次。将相应的项取出, 形成 $\{a_n\}$ 的一个取常值 a 的子列。显然, 该子列收敛到 a 。
- 情形 2. 若 E 是无限集, 则 E 有聚点, 设为 ξ 。构造严格递增的正整数列 $\{n_k\}$ 如下:
 - 在区间 $(\xi - 1, \xi + 1)$ 中取 $n_1 \geq 1$, 使得 $a_{n_1} \in (\xi - 1, \xi + 1)$;
 - 在区间 $(\xi - \frac{1}{2}, \xi + \frac{1}{2})$ 中取 $n_2 > n_1$, 使得 $a_{n_2} \in (\xi - \frac{1}{2}, \xi + \frac{1}{2})$;
 - 依此类推, 对任意 k , 在区间

$$\left(\xi - \frac{1}{k}, \xi + \frac{1}{k}\right)$$

中取 $n_k > n_{k-1}$, 使得 $a_{n_k} \in \left(\xi - \frac{1}{k}, \xi + \frac{1}{k}\right)$ 。

由此可得子列 $\{a_{n_k}\}$ 满足:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \xi$$

因此 $\{a_{n_k}\}$ 是 $\{a_n\}$ 的收敛子列。



致密性定理 2.5 \Rightarrow 聚点定理 2.5:

证明 设点集 S 为一有界无穷点集, 依次任取 S 中不重复的点 (保证极限不为孤立点) 构成数列 $\{a_n\}$, 根据致密性定理, 必存在收敛子列满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \xi$, 由极限定义, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 使 $k > N$ 时有

$$|a_{n_k} - \xi| < \varepsilon,$$

因而 ξ 是聚点。



对于 Dedekind 分割定理, 我们做如下的详细说明。

定义 2.1 (有理数集的切割)

设两个非空有理数集合 A 和 B 满足:

- $\mathbb{Q} = A \cup B$
- $\forall a \in A, \forall b \in B: a < b$

则称 A, B 构成 \mathbb{Q} 的一个切割, 记为:

$$A | B$$

例题 2.1 判断以下是否为有理数集 \mathbb{Q} 的切割

考虑以下四组区间, 对每一组分别取两个区间内的有理数构成两个集合, 判断是否构成 \mathbb{Q} 的一个切割:

$$(-\infty, 2], (2, +\infty)$$

$$(-\infty, 2), [2, +\infty)$$

$$(-\infty, \sqrt{2}), (\sqrt{2}, +\infty)$$

$$(-\infty, 2], [2, +\infty)$$

前三组能构成 \mathbb{Q} 的切割, 最后一组不能构成切割。

注 从上述例子中可以归纳 Dedekind 切割的四种可能情况:

1. A 有最大数, B 无最小数
2. A 无最大数, B 有最小数
3. A 无最大数, B 无最小数
4. A 有最大数, B 有最小数 (不成立)

设 A 有最大数时, 最大数为 a_0 , B 有最小数时, 最小数为 b_0 。这四种情况与前面提到的具体例子相对应, 第四种情形不可能发生, 下面来证明。假设第四种情况成立, 则 $\frac{a_0+b_0}{2}$ 是有理数且 $a_0 < \frac{a_0+b_0}{2} < b_0$ 这样一个既不属于 A 也不属于 B 的有理数存在说明 $A \cup B \neq \mathbb{Q}$, 与切割的定义相矛盾。

情况 1 可以确定一个有理数 a_0 , 情况 2 可以确定一个有理数 b_0 , 但情况 3 则没有确定任何有理数, 这意味着全体有理数的两个补集之间有空隙, 我们将这个空隙定义为无理数。这样我们引入一种对无理数的定义方法。

定义 2.2 (定义无理数)

设 $A | B$ 是有理数集 \mathbb{Q} 的一个切割, 且满足: A 无最大数, B 无最小数。则 $A | B$ 确定了一个无理数 c , 满足: $\forall a \in A, \forall b \in B: a < c < b$ 。该 c 可视为填补有理数间“空隙”的无理数。

定义 2.3 (Dedekind 原理)

设 A, B 是实数域 \mathbb{R} 的两个子集, 它们满足以下三个条件:

- (a) 不空: $A \neq \emptyset$ 且 $B \neq \emptyset$;
- (b) 不漏: $A \cup B = \mathbb{R}$;
- (c) 不乱: 对 $\forall x \in A, y \in B$ 都成立 $x < y$;

则称 $(A | B)$ 为实数域的一个 Dedekind 分割, A 为分割的下集, B 为分割的上集。

定理 2.9 (Dedekind 分割定理)

设 $(A | B)$ 是实数域的一个 Dedekind 分割, 则或者下集 A 中有最大数, 或者上集 B 中有最小数。

等价描述: 设 $(A | B)$ 是实数域的一个 Dedekind 分割, 则存在实数 c 使得 $x \leq c \leq y \quad \forall x \in A, \forall y \in B$ 成立。实数 c 称为分划 $(A | B)$ 的分界点, 且 c 是唯一的。

2.2 确界原理

定理 (确界原理)

任何非空集 $E \subset \mathbb{R}$, 若它有上界, 则必有上确界 $\sup E \in \mathbb{R}$. (等价地, 若有下界, 则必有下确界.)

问题 2.1 用单调有界原理证明确界原理.

证明 设数集 S 非空有上界, 即存在 $a \in S$, 不妨设数 a 不是 S 的上界, 存在数 b 是 S 的上界.

将区间 $[a, b]$ 二等分:

若中点 $\frac{a+b}{2} \in S$, 则取 $a_1 = \frac{a+b}{2}, b_1 = b$;

若中点 $\frac{a+b}{2} \notin S$, 则取 $a_1 = a, b_1 = \frac{a+b}{2}$, 得小区间 $[a_1, b_1]$.

如此无限继续下去, 得两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 其中 $a_n \in S$ 且单调递增有上界 b , b_n 单调递减有下界 a_1 , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0.$$

由单调有界定理知存在 ξ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$, 又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$. 因 $\{b_n\}$ 是 S 的上界, 所以 $\forall x \in S$ 有 $x \leq b_n (n = 1, 2, \dots)$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $x \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$, 所以 ξ 为 S 的上界.

因 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$ 知, 存在 N , 当 $n > N$ 时有 $\xi - \varepsilon < a_n$, 即 $\xi - \varepsilon < a_{N+1}$, 又对所有的 $a_n \in S$, 即存在 S 中的某个数 a_{N+1} , 使得 $\xi - \varepsilon < a_{N+1}$, 故 ξ 为 S 的最小上界. 所以 $\xi = \sup S$.

同理可证非空有下界的数集, 必有下确界. ■

问题 2.2 用 Cauchy 收敛原理证明确界原理.

证明 设数集 S 非空有上界, 即存在 $a \in S$, 不妨设数 a 不是 S 的上界, 存在数 b 是 S 的上界.

将区间 $[a, b]$ 二等分:

若中点 $\frac{a+b}{2}$ 是 S 的上界, 则取 $a_1 = a, b_1 = \frac{a+b}{2}$;

若中点 $\frac{a+b}{2}$ 不是 S 的上界, 则取 $a_1 = \frac{a+b}{2}, b_1 = b$, 得小区间 $[a_1, b_1]$.

如此无限继续下去, 得两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 其中 a_n 不是 S 的上界, b_n 是 S 的上界, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0.$$

下面证明 $\{a_n\}$ 满足柯西收敛准则.

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 知 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N$ 时有 $|b_n - a_n| < \varepsilon$; 又 $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$, 从而 $\forall p$ 有 $|a_{n+p} - a_n| \leq |b_n - a_n| < \varepsilon$, 故 $\{a_n\}$ 满足柯西收敛准则, 从而有极限.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$, 从而也得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$.

再证明 $\xi = \sup S$.

对任意的 n 和任意的 $x \in S$, 因 b_n 是 S 的上界, 所以有 $x \leq b_n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $x \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$, 所以 ξ 为 S 的上界. 而 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$ 知, 存在 N , 当 $n > N$ 时有 $\xi - \varepsilon < a_n$, 即 $\xi - \varepsilon < a_{N+1}$.

又对所有的 $a_n \in S$, 即存在 S 中的某个数 a_{N+1} , 使得 $\xi - \varepsilon < a_{N+1}$, 故 ξ 为 S 的最小上界. 所以 $\xi = \sup S$.

同理可证非空有下界的数集, 必有下确界. ■

问题 2.3 用闭区间套定理证明确界原理.

证明 设数集 S 非空有上界, 即存在 $a \in S$, 不妨设数 a 不是 S 的上界, 存在数 b 是 S 的上界.

将区间 $[a, b]$ 二等分:

若中点 $\frac{a+b}{2}$ 是 S 的上界, 则取 $a_1 = a, b_1 = \frac{a+b}{2}$;

若中点 $\frac{a+b}{2}$ 不是 S 的上界, 则取 $a_1 = \frac{a+b}{2}, b_1 = b$, 得小区间 $[a_1, b_1]$.

如此无限继续下去, 得一区间套 $[a_n, b_n]$, 其中 a_n 不是 S 的上界, b_n 是 S 的上界, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$. 故由区间套定理知, 存在唯一的一点 ξ , 使得 $\xi \in [a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$.

对任意的 $x \in S$, 因 b_n 是 S 的上界, 所以有 $x \leq b_n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $x \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$, 所以 ξ 为 S 的上界.

而 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$ 知, 存在 N , 当 $n > N$ 时有 $\xi - \varepsilon < a_n$, 即 $\xi - \varepsilon < a_{N+1}$, 又对所有的 $a_n \in S$, 即存在 S 中的某个数 a_{N+1} , 使得 $\xi - \varepsilon < a_{N+1}$, 故 ξ 为 S 的最小上界.

所以 $\xi = \sup S$.

同理可证非空有下界的数集，必有下确界。 ■

问题 2.4 用致密性定理证明确界原理。

证明 设 S 是非空有上界的数集，则必有无限多个上界，设 $Q_0 = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$ 为 S 的所有有理数上界。令 $x_n = \min\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ ，显然 $\{x_n\} \in Q_0$ 且单调递减有下界，显然也有上界。

由致密性定理知，存在 ξ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$ 。下面证明 $\xi = \sup S$ 。

(1) 证明是上界：如果存在 $x_0 \in S$ ，使得 $x_0 > \xi$ ，则 $\frac{x_0 - \xi}{2} > 0$ ，所以 $\exists N$ ，使得 $x_N < \xi + \frac{x_0 - \xi}{2} = \frac{x_0 + \xi}{2} < x_0$ ，而 $x_N \in Q_0$ ，这与 x_N 为 S 的上界矛盾。

(2) 证明是最小上界：如果存在 $\xi_0 > 0$ ，对任意的 $x \in S$ 有 $x \leq \xi - \xi_0$ ，由有理数的稠密性知，存在 $r' \in Q$ 使得 $\xi - \xi_0 < r' < \xi$ ，所以 $\forall x \in S$ 有 $x < r'$ ，所以 r' 为 S 的一个上界，即 $r' \in Q_0$ ，这与 $\xi \leq x_{n_k} \leq r'$ 矛盾。

这是由于序列 $\{x_{n_k}\}$ 的构造， x_{n_k} 是从 Q_0 中选取的最小值序列的子列，且 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$ 。由于 $r' \in Q_0$ ，当 n 足够大时， x_{n_k} 必然包含 r' 或更小的值，因此有 $x_{n_k} \leq r'$ 。这意味着极限 ξ 应满足 $\xi \leq r'$ 。然而， r' 的选取满足 $r' < \xi$ ，导致矛盾： $\xi \leq r'$ 与 $r' < \xi$ 同时成立，这是不可能的。因此，原假设“存在 $\xi_0 > 0$ 使得所有 $x \in S$ 有 $x \leq \xi - \xi_0$ ”不成立，说明 ξ 是最小的上界，即 $\xi = \sup S$ 。 ■

问题 2.5 用有限覆盖定理证明确界存在原理。

证明 设 S 为非空有上界的数集， A 为所有上界的集合，取 $M \in A$ 和 $x_0 \in S$ 。

反证法假设： S 无上确界（即无最小上界）。

构造开覆盖：考虑闭区间 $[x_0, M]$ ，对其中每一点 x 分情况讨论：

(1) 若 x 是上界：由于无最小上界，存在更小的上界 $x_1 < x$ 。取 x 的某个邻域 Δ_x ，使得 Δ_x 内的点均为上界（例如取 $\Delta_x = (x_1, x + \varepsilon)$ ）。

(2) 若 x 不是上界：存在 $x_2 \in S$ 使得 $x_2 > x$ 。取 x 的邻域 Δ_x ，使得 Δ_x 内的点均小于 x_2 ，从而都不是上界（例如取 $\Delta_x = (x - \varepsilon, x_2)$ ）。

所有这样的 Δ_x 构成 $[x_0, M]$ 的一个开覆盖。

应用有限覆盖定理：由有限覆盖定理，存在有限个子开区间 $\{\Delta_{x_1}, \Delta_{x_2}, \dots, \Delta_{x_k}\}$ 覆盖 $[x_0, M]$ 。

M 是上界，故覆盖 M 的邻域 Δ_{x_k} 必为情况 (1)，即 Δ_{x_k} 内全为上界。若相邻邻域 $\Delta_{x_{k-1}}$ 与 Δ_{x_k} 有交集，则 $\Delta_{x_{k-1}}$ 也必为情况 (1)。否则，若 $\Delta_{x_{k-1}}$ 为情况 (2)，其内部全为非上界，与 Δ_{x_k} 的上界区域矛盾。依次向左分析每个邻域，最终覆盖 x_0 的邻域也必为情况 (1)，即 x_0 是上界。

$x_0 \in S$ ，若 x_0 是上界，则 x_0 为 S 的最大元素，即 $\sup S = x_0$ ，与原假设“无上确界”矛盾。这是由于通过有限覆盖定理，闭区间 $[x_0, M]$ 被有限个邻域覆盖。从 M 开始，所有邻域必须为情况 (1)（上界区域），否则会在交界处产生逻辑矛盾（某点同时属于上界和非上界）。最终推导出 x_0 是上界，但 $x_0 \in S$ ，意味着 x_0 是 S 的上确界，与反证假设矛盾。因此，原假设错误， S 必有上确界。 ■

问题 2.6 用 Dedekind 分割定理证明确界原理。

证明 先证明非空有上界的数集必有上确界。

设非空有上界的数集 S 的全体上界组成集合 \tilde{B} ，则

$$\tilde{B} = \{x \mid \forall t \in S : x \geq t\},$$

取 \tilde{B} 的补集为

$$\tilde{A} = \{x \mid x \notin \tilde{B}\},$$

则 \tilde{A} 和 \tilde{B} 是 \mathbb{R} 的一个划分。

要证明 S 有上确界，即是要证明 \tilde{B} 有最小数。根据 Dedekind 切割定理，只需证明 \tilde{A} 没有最大数即可。

\tilde{A} 由 \mathbb{R} 中不是 S 上界的数组成，所以对 $\forall x \in \tilde{A}$ ，存在 $t \in S$ 使得 $x < t$ 。取 (x, t) 区间内任意一个数 x' 。因为 $x' < t$ ，所以 x' 不是 S 的上界，故 $x < x' \in \tilde{A}$ 。

换句话说，对 \tilde{A} 中任意一个数 x ，我们都能在 \tilde{A} 中找到比他更大的数 x' ，所以 \tilde{A} 没有最大数。

根据 Dedekind 切割定理， \tilde{B} 有最小数，即 S 有上确界。

用类似的方法可以证明非空有下界的数集必有下确界。 ■

2.3 单调有界原理

定理 (单调有界原理)

任何单调递增、有上界的序列 $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$, 必有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}$. (等价地, 单调递减有下界也必有极限.) (所谓有极限, 指有有限极限, 下同.)

问题 2.7 用确界原理证明单调有界原理。

证明 不妨设 $\{a_n\}$ 为单调递增且有上界的序列。由确界原理知 $\{a_n\}$ 必有上确界, 令 $\alpha = \sup_n \{a_n\}$, 由上确界的定义可知: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, s.t. $\alpha - \varepsilon < a_N < \alpha$, 那么当 $n \geq N$ 时, 有 $\alpha - \varepsilon < a_N \leq a_n < \alpha < \alpha + \varepsilon$, 故当 $n \geq N$ 时, 有 $\alpha - \varepsilon < a_n < \alpha + \varepsilon$, 即 $|a_n - \alpha| < \varepsilon$. 由此可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$. ■

问题 2.8 用 Cauchy 收敛原理证明单调有界原理。

证明 只证递增有上界数列必有极限的情形。不妨设 $\{x_n\}$ 为递增有上界数列, 下面用反证法证明数列 $\{x_n\}$ 有极限。假设 $\{x_n\}$ 不存在极限。由柯西收敛准则知, $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n > N$, 使得 $x_n - x_N = |x_n - x_N| > \varepsilon_0$ 。

依次取 $N_1 = 1, \exists n_1 > N_1$ 使得 $x_{n_1} - x_1 > \varepsilon_0$;

取 $N_2 = n_1, \exists n_2 > n_1$ 使得 $x_{n_2} - x_{n_1} > \varepsilon_0$;

.....

取 $N_k = n_{k-1}, \exists n_k > n_{k-1}$ 使得 $x_{n_k} - x_{n_{k-1}} > \varepsilon_0$ 。

把以上式子相加得 $x_{n_k} - x_1 > k\varepsilon_0$, 对任意的实数 G , 当 $k > \frac{G-x_1}{\varepsilon_0}$ 时有 $x_{n_k} > G$, 这与 $\{x_n\}$ 有上界矛盾。故数列 $\{x_n\}$ 有极限。 ■

问题 2.9 用致密性定理证明单调有界原理。

证明 不妨设数列 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界 M 。由于 $\{x_n\}$ 单调递增, 其下界显然为 x_1 (即对任意 $n \geq 1$, 有 $x_n \geq x_1$)。因此 $\{x_n\}$ 是有界数列 (既有上界又有下界)。根据致密性定理, $\{x_n\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi.$$

下证 ξ 为 $\{x_n\}$ 的极限。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $K > 0$, 使得当 $k > K$ 时, 有 $|x_{n_k} - \xi| < \varepsilon$, 即

$$\xi - \varepsilon < x_{n_k} < \xi + \varepsilon.$$

取 $N = n_{K+1}$, 则当 $n > N$ 时, 由于 $\{x_n\}$ 单调递增, 存在子列下标 n_k 满足 $n \leq n_k$ (因 $\{n_k\}$ 严格递增且趋于无穷), 从而

$$\xi - \varepsilon < x_{n_{K+1}} \leq x_n \leq x_{n_k} < \xi + \varepsilon.$$

因此 $|x_n - \xi| < \varepsilon$ 对任意 $n > N$ 成立, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi.$$

问题 2.10 用闭区间套定理证明单调有界原理。

证明 只证递增有上界数列必有极限的情形。不妨设 $\{x_n\}$ 为递增有上界数列, 取闭区间 $[a_1, b_1]$, 使 a_1 不是数列 $\{x_n\}$ 的上界 (如 $a_1 = x_1 - 1$), b_1 是数列 $\{x_n\}$ 的上界, 则 $[a_1, b_1]$ 包含数列 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 而在 $[a_1, b_1]$ 外至多含有数列 $\{x_n\}$ 的有限项。

将 $[a_1, b_1]$ 二等分为两个小区间, 其中必有一小区间含有数列 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 而在此小区间外至多含有数列 $\{x_n\}$ 的有限项, 记这样的小区间为 $[a_2, b_2]$ 。

无限继续下去, 可得一闭区间列 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足区间套定理, 故存在唯一的 $\xi \in [a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$), 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$

由极限关系知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\xi - \varepsilon < a_n < b_n < \xi + \varepsilon.$$

取 $n_0 > N$, $[a_{n_0}, b_{n_0}]$ 含有数列 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 即 $\exists M$ 使 $x_M \in [a_{n_0}, b_{n_0}]$, 则当 $m > M$ 时, 有 $x_m \in [a_{n_0}, b_{n_0}]$ 。否则, $\exists m_1 > M$ 有 $b_{n_0} < x_{m_1}$, 则在 $[a_{n_0}, b_{n_0}]$ 中最多只有数列 $\{x_n\}$ 的前 m_1 项, 与前提矛盾。

从而当 $m > M$ 时, 有

$$\xi - \varepsilon < a_{n_0} \leq x_m \leq b_{n_0} < \xi + \varepsilon,$$

亦即 $|x_m - \xi| < \varepsilon$ 。故 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists M$, 当 $m > M$ 时有 $|x_m - \xi| < \varepsilon$, 所以数列 $\{x_n\}$ 的极限为 ξ 。■

问题 2.11 用有限覆盖定理证明单调有界原理。

证明 不妨设数列 $\{x_n\}$ 递增有界, 且 $a \leq x_n \leq b$ 。假设 $\{x_n\}$ 的极限不存在, 则对任意 $x_0 \in [a, b]$, x_0 都不是 $\{x_n\}$ 的极限。于是存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意 N , 当 $n > N$ 时, 有 $|x_n - x_0| \geq \varepsilon_0$ 。因此, 存在 x_0 的邻域 $U(x_0, \frac{\varepsilon_0}{2})$, 其中只含有 $\{x_n\}$ 的有限项。

令 $H = \{U(x, \frac{\varepsilon_x}{2}) \mid x \in [a, b]\}$, 则 H 是闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖。根据有限覆盖定理, 存在 H 的有限子覆盖, 即存在 $U(x_1, \frac{\varepsilon_1}{2}), U(x_2, \frac{\varepsilon_2}{2}), \dots, U(x_k, \frac{\varepsilon_k}{2})$, 使得

$$\bigcup_{i=1}^k U(x_i, \frac{\varepsilon_i}{2}) \supseteq [a, b].$$

由于每个 $U(x_i, \frac{\varepsilon_i}{2})$ 只含有 $\{x_n\}$ 的有限项, 它们的并集也至多含有 $\{x_n\}$ 的有限项。然而 $[a, b]$ 包含 $\{x_n\}$ 的所有项 (无穷多项), 这与有限覆盖的结论矛盾。因此, 假设不成立, $\{x_n\}$ 必有极限。■

问题 2.12 用 Dedekind 分割定理证明单调有界原理。

证明 设递增数列 $\{x_n\}$ 有上界 M , 即 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq M$ 。目标是证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且有限。

考虑将实数集划分为两个集合 A 和 A' :

- A' : 包含所有数列 $\{x_n\}$ 的上界, 即满足 $x_n \leq a$ 对所有 n 成立的实数 a 。
- A : 包含所有不是上界的实数, 即存在至少一个 $x_n > a$ 。

该分割满足以下条件:

- A' 非空: 因为 M 是上界, 故 $M \in A'$ 。
- A 非空: 取 $a = x_1 - 1$, 显然 $x_1 > a$, 故 $a \in A$ 。
- 对任意 $a \in A$ 和 $a' \in A'$, 有 $a < a'$, 因为存在 $x_n > a$, 而 $x_n \leq a'$ 。

由戴德金定理, 存在唯一实数 α 是该分割的界数。即 α 是 A' 的最小元, 也是 A 的上确界。因为对任意 $a \in A$, 存在 $x_n > a$, 故 A 无最大元, 从而 α 是 A' 的最小元。

证明 A 无最大元 (即 α 必为 A' 的最小元):

1. 任取 $a \in A$: 由 A 的定义, 存在某项 $x_{n_0} > a$ (因 a 不是上界)
2. 构造 $a + \tau \in A$: 取 $\tau = \frac{x_{n_0} - a}{2} > 0$, 则:
 - $a + \tau < x_{n_0}$
 - $a + \tau$ 仍不是 $\{x_n\}$ 的上界 (因 $x_{n_0} > a + \tau$), 故 $a + \tau \in A$
3. 结论: 对任意 $a \in A$, 总存在更大的数 $a + \tau \in A$, 因此 A 无最大元

α 的性质与数列关系

由于 α 是 A' 的最小元, 具有以下特性:

1. 上界性: $\forall n, x_n \leq \alpha$ (因 $\alpha \in A'$ 是上界)
2. 最小性: 任何比 α 小的数 $\alpha - \varepsilon$ 均属于 A (即不是上界), 从而存在 $x_N > \alpha - \varepsilon$

于是对所有 n 有 $x_n \leq \alpha$ 。

下面证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$:

对任意 $\varepsilon > 0$, 由于 α 是 A' 的最小元, 故 $\alpha - \varepsilon \in A$, 即存在某个 $x_N > \alpha - \varepsilon$ 。由于数列递增, 对任意 $n > N$ 有 $x_n \geq x_N > \alpha - \varepsilon$ 。又因为 α 是上界, 故 $x_n \leq \alpha$, 从而

$$\alpha - \varepsilon < x_n \leq \alpha \Rightarrow |x_n - \alpha| < \varepsilon$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ 。

综上, 递增有上界数列必有极限且该极限为有限实数。■

2.4 Cauchy 收敛原理

定理 (Cauchy 收敛原理)

序列 $\{x_n\} \subset \mathbb{R}$ 收敛的充分必要条件是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{当 } m, n > N \text{ 时, 有 } |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

命题 2.1

满足 Cauchy 条件的数列是有界的。

证明 设 $\{x_n\}$ 是 \mathbb{R} 中的 Cauchy 列。根据 Cauchy 列的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对所有 $m, n \geq N$, 有

$$|x_m - x_n| < \varepsilon.$$

特别地, 取 $\varepsilon = 1$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对所有 $n \geq N$,

$$|x_n - x_N| < 1.$$

由绝对值不等式可得

$$|x_n| = |x_n - x_N + x_N| \leq |x_n - x_N| + |x_N| < 1 + |x_N|.$$

因此, 对所有 $n \geq N$, 有

$$|x_n| < 1 + |x_N|.$$

而对于 $n < N$ 的有限项 x_1, x_2, \dots, x_{N-1} , 取

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N-1}|\},$$

则对所有 $n < N$, 有 $|x_n| \leq M$.

综上, 对所有 $n \in \mathbb{N}$,

$$|x_n| \leq \max\{M, 1 + |x_N|\},$$

即 $\{x_n\}$ 有界。 ■

问题 2.13 用确界原理证明 Cauchy 收敛原理。

证明 必要性:

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \eta$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $m, n > N$ 时, 有

$$|x_n - \eta| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |x_m - \eta| < \frac{\varepsilon}{2}$$

那么,

$$|x_n - x_m| = |(x_n - \eta) - (x_m - \eta)| \leq |x_n - \eta| + |x_m - \eta| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$


充分性:

- 构造非空有界数集: 设 $S = \{x \mid (-\infty, x) \cap \{x_n\} \text{ 是空集或有限数集}\}$ 。
- 确界存在性: 由于满足 Cauchy 条件的数列是有界的, 显然 S 是非空有上界的数集。由确界原理, 数集 S 有上确界, 不妨令 $\zeta = \sup S$ 。
- 极限点的性质:
 - 对任意 $\varepsilon > 0$, $(-\infty, \zeta) \cap \{x_n\}$ 是无限集 (假设为有限集, 则意味着从某项开始所有 $x_n \geq \zeta$, 那就会导致 ζ 不是 S 的最小上界, 矛盾)。
 - $(-\infty, \zeta - \varepsilon) \cap \{x_n\}$ 至多含有 $\{x_n\}$ 的有限多项。
这是由于 S 为非空且有上界的集合, 且 ζ 为 S 的上确界, 故由 S 的定义可知 $(-\infty, \zeta - \varepsilon) \cap \{x_n\}$ 至多含有 $\{x_n\}$ 的有限多个点。

• 因此 $(\zeta - \varepsilon, \zeta + \varepsilon)$ 含有 $\{x_n\}$ 的无限多项。

4. 收敛性证明: 取柯西列的子列 $x_{n_k} \in (\zeta - \varepsilon, \zeta + \varepsilon)$, $k = 1, 2, \dots$, 且有 $n_1 < n_2 < \dots$ 。取 $N_1 = \max\{N, n_1\}$, 则当 $n > N_1$ 时, 总存在 $n_k > N_1$ 使得

$$|x_n - \zeta| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - \zeta| < 2\varepsilon$$

 **笔记** 定义: 任给 $\varepsilon > 0$, 若数列 $\{a_n\}$ 中至多只有有限项落在邻域 $U(a, \varepsilon)$ 之外, 则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于极限 a 。这个充分性证明的思路就是, 先假设 S 是有限点集, 再得出 S 有上确界的结论。一个集合有上确界 ζ , 则在 $(\zeta - \varepsilon, \zeta + \varepsilon)$ 区间就有无限个点, 这是由上确界的定义确定的。由此得到要证明的结论。

问题 2.14 用单调有界原理证明 Cauchy 收敛原理。

证明 只证充分性 (必要性同上)。由命题 2.1 知数列 $\{x_n\}$ 有界, 不妨设 $a \leq x_n \leq b$ 。用如下的方法取得 $\{x_n\}$ 的一个单调子列 $\{x_{n_k}\}$:

1. 取 $x_{n_k} \in \{x_n\}$, 使 $[a, x_{n_k}]$ 或 $[x_{n_k}, b]$ 中含有无穷多的 $[a, b]$ 中的项;
2. 在 $[a, x_{n_k}]$ 或 $[x_{n_k}, b]$ 中取得 $x_{n_{k+1}} \in \{x_n\}$ 且满足条件 1;
3. 取项时方向一致, 要么由 $a \rightarrow b$, 要么由 $b \rightarrow a$ 。

由数列 $\{x_n\}$ 的性质可知, 以上三点可以做到。这样, 取出一个数列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ 且 $\{x_{n_k}\}$ 是一个单调有界数列, 则它必有限, 设为 ξ 。下面证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。

由柯西条件及 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$ 知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 当 $m, n, k > N$ 时有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$ 和 $|x_{n_k} - \xi| < \varepsilon$ 同时成立。

当 $n > N$, 取 $m = n_k (\geq k > N)$ 时得 $|x_n - \xi| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - \xi| < 2\varepsilon$ 。所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。 ■

问题 2.15 用致密性定理证明 Cauchy 收敛原理。

证明 只证充分性 (必要性同上)。由命题 2.1 知数列 $\{x_n\}$ 有界。

根据致密性定理知 $\{x_n\}$ 必存在收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$ 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$ 。

下面证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。

由柯西条件及 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$ 知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 当 $m, n, k > N$ 时有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$ 和 $|x_{n_k} - \xi| < \varepsilon$ 同时成立。

当 $n > N$ 时, 取 $m = n_k (\geq k > N)$ 时得 $|x_n - \xi| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - \xi| < 2\varepsilon$ 。所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。 ■

问题 2.16 用闭区间套定理证明 Cauchy 收敛原理。

证明 只证充分性。由柯西条件知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, $\forall m, n \geq N$ 有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$ 。取 $m = N$, 则当 $n \geq N$ 时有 $|x_N - x_n| < \varepsilon$, 即 $x_N - \varepsilon < x_n < x_N + \varepsilon$, 即在区间 $[x_N - \varepsilon, x_N + \varepsilon]$ 内含有 $\{x_n\}$ 中除有限项外的几乎所有的项。

令 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 则 $\exists N_1$, 在区间 $[x_{N_1} - \frac{1}{2}, x_{N_1} + \frac{1}{2}]$ 内含有 $\{x_n\}$ 中除有限项外的几乎所有的项, 记该区间为 $[a_1, b_1]$ 。

再令 $\varepsilon = \frac{1}{2^2}$, 则 $\exists N_2 (> N_1)$, 在区间 $[x_{N_2} - \frac{1}{2^2}, x_{N_2} + \frac{1}{2^2}]$ 内含有 $\{x_n\}$ 中除有限项外的几乎所有的项, 记 $[a_2, b_2] = [x_{N_2} - \frac{1}{2^2}, x_{N_2} + \frac{1}{2^2}] \cap [a_1, b_1]$, 它也含有 $\{x_n\}$ 中除有限项外的几乎所有的项, 且 $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$, $b_2 - a_2 \leq \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{1}{2}$; 依次继续令 $\varepsilon = \frac{1}{2^3}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$, 得一闭区间列 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足:

- (i) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$;
- (ii) $b_n - a_n \leq \frac{1}{2^{n-1}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$;
- (iii) 每个区间中都含有 $\{x_n\}$ 中除有限项外的几乎所有的项。

由区间套定理, 故存在唯一的 $\xi \in [a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ 。

再证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ 知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, $\exists n > N$ 时有 $\xi - \varepsilon < a_n < b_n < \xi + \varepsilon$, 即 $[a_n, b_n] \subset U(\xi, \varepsilon)$, 由 $[a_n, b_n]$ 中含有 $\{x_n\}$ 中除有限项外的几乎所有的项得, $U(\xi, \varepsilon)$ 中含有 $\{x_n\}$ 中除有限项外的几乎所有的项。即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。 ■

问题 2.17 用有限覆盖定理证明 Cauchy 收敛原理。

证明 由命题 2.1 知数列 $\{x_n\}$ 有界。

下面证明 $\{x_n\}$ 有极限。不妨设 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 假设 $\{x_n\}$ 的极限不存在, 所以 $\forall x_0 \in [a, b]$, x_0 都不是 $\{x_n\}$ 的极限, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall N$, 当 $n > N$ 时有 $|x_n - x_0| \geq \varepsilon_0$, 则存在 x_0 的某邻域 $U(x_0, \frac{\varepsilon_0}{2})$ 中只含有 $\{x_n\}$ 的有限项。

令 $H = \{U(x, \frac{\varepsilon_0}{2}) \mid x \in [a, b]\}$, 则 H 是闭区间 $[a, b]$ 的一个无限开覆盖, 由有限覆盖定理知, 必存在有限

子覆盖。不妨设存在 $U(x_1, \frac{\varepsilon_1}{2}), U(x_2, \frac{\varepsilon_2}{2}), \dots, U(x_k, \frac{\varepsilon_k}{2})$ 是 $[a, b]$ 的一个有限开覆盖, 即

$$\bigcup_{i=1}^k U(x_i, \frac{\varepsilon_i}{2}) \supseteq [a, b],$$

而每个 $U(x_i, \frac{\varepsilon_i}{2})$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 只含 $\{x_n\}$ 的有限项, 从而它们的并也只含 $\{x_n\}$ 的有限项, 这与 $\{x_n\}$ 是无限点集矛盾。故假设不成立, $\{x_n\}$ 必有极限。 ■

问题 2.18 用 Dedekind 分割定理证明 Cauchy 收敛原理。

证明 设数列 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 列, 则

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n, m > N, |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$\forall x \in \mathbb{R}$, 若 $[x, \infty)$ 内只含有 $\{x_n\}$ 的有限多项, 则归入上集 B 中, 令 $A = \mathbb{R} \setminus B$ 。

根据 Dedekind 分割定理知: 或上集 B 有最小数, 或下集 A 有最大数。记分割点为 ξ , 满足

$$\forall \varepsilon > 0, \xi - \varepsilon \in A, \xi + \varepsilon \in B$$

由上集 B 中只有 $\{x_n\}$ 的有限多项知, 对于上述 $\varepsilon > 0$,

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}^+, \forall m > N_1, \xi - \frac{\varepsilon}{2} < x_m \leq \xi < \xi + \frac{\varepsilon}{2}$$

取 $N_2 = \max\{N, N_1\}$, 则有

$$\forall n, m > N_2, |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

进而可得

$$-\frac{\varepsilon}{2} < x_n - x_m < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \xi - \varepsilon < x_n < \xi + \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$$

■

2.5 聚点定理与致密性定理

定理 (聚点定理)

设 E 是无穷有界集合, 则 E 至少有一个聚点 (即 $E' \neq \emptyset$)。

定理 (致密性定理 (Bolzano-Weierstrass 定理))

设 $\{x_n\}$ 为一有界数列, 则 $\{x_n\}$ 一定有收敛子列。即存在 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$, 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$ 存在。反之若 $\{x_n\}$ 的任何子列都不收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 。

问题 2.19 用确界原理证明聚点定理。

证明 设 S 是有界无限点集, 则由确界原理有 $\eta = \sup S$, $\xi = \inf S$ 。

- 若 η, ξ 中有一点是 S 的聚点, 那么结论已成立。
- 若 η, ξ 都不是 S 的聚点, 令

$$E := \{x \in \mathbb{R} \mid S \text{ 中仅有有限个数小于 } x\}.$$

显然 E 非空且有上界。令 $\eta' = \sup E$, 则由 E 的构造方法可知, $\forall \varepsilon > 0$, 必有 $\eta' + \varepsilon \notin E$ (上确界加一个正数必不在 E 中), 那么由 E 的定义知 S 中有无限个数小于 $\eta' + \varepsilon$, 又由于 S 中仅有有限个数小于 η' , 则 S 中必有无限个数小于 $\eta' + \varepsilon$ 大于 η' 。所以 $(\eta' - \varepsilon, \eta' + \varepsilon)$ 中含有 S 的无限个数, 故 η' 是 S 的聚点。 ■

问题 2.20 用单调有界原理证明致密性定理。

证明 设数列 $\{x_n\}$ 是有界数列, 首先证明 $\{x_n\}$ 中存在单调子数列。

(1) 若 $\{x_n\}$ 中存在单调递增子数列 $\{x_{n_k}\}$, 则得证。

(2) 若 $\{x_n\}$ 中无单调递增子数列, 那么 $\exists n_1$, 当 $n > n_1$ 时恒有 $x_{n_1} > x_n$; 同样在 $\{x_n\} (n > n_1)$ 中也无单调递增子数列, 于是又 $\exists n_2$, 当 $n_2 > n$ 时恒有 $x_{n_2} < x_n < x_{n_1}$; 如此无限进行下去, 便可得到一严格递减子数列 $\{x_{n_k}\}$ 。

由上可知, $\{x_n\}$ 中存在单调子数列 $\{x_{n_k}\}$, 而 $\{x_n\}$ 有界, 所以 $\{x_{n_k}\}$ 有界。故由单调有界定理知, $\{x_{n_k}\}$ 必收敛, 即有界数列 $\{x_n\}$ 必有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 。 ■

问题 2.21 用 Cauchy 收敛原理证明致密性定理。

证明 设数列 $\{x_n\}$ 是有界数列, 不妨设 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 即 $[a, b]$ 中包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项。对 $[a, b]$ 二等分, 则至少有一个小区间包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 记这样的小区间为 $[a_1, b_1]$, 再将 $[a_1, b_1]$ 二等分, 又得到包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项的小区间 $[a_2, b_2]$, 无限进行下去, 得一闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 每个 $[a_n, b_n]$ 都包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项。

易证 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为柯西数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ 。现构造收敛子列如下:

取 n_1 使得 $x_{n_1} \in [a_1, b_1]$; 取 $n_2 > n_1$ 使得 $x_{n_2} \in [a_2, b_2]$; \cdots 取 $n_k > n_{k-1}$ 使得 $x_{n_k} \in [a_k, b_k]$; \cdots

由于 $|a_k - b_k| = \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$ 且 $x_{n_k}, \xi \in [a_k, b_k]$, 故有

$$|x_{n_k} - \xi| \leq \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

即 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$, 从而得到 $\{x_n\}$ 的一个收敛于 ξ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 。 ■

问题 2.22 用闭区间套定理证明致密性定理。

证明 设数列 $\{x_n\}$ 是有界数列, 不妨设 $\{x_n\} \subseteq [a, b]$, 即 $[a, b]$ 中包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项。对 $[a, b]$ 二等分, 则至少有一个小区间包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 记这样的小区间为 $[a_1, b_1]$, 再将 $[a_1, b_1]$ 二等分, 又得到包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项的小区间 $[a_2, b_2]$, 无限进行下去, 得一闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足:

(i) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] (n = 1, 2, \cdots)$;

(ii) $b_n - a_n \leq \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$;

(iii) 每个 $[a_n, b_n]$ 都包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项。

由区间套定理, 故存在唯一的 $\xi \in [a_n, b_n] (n = 1, 2, \cdots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ 。

在 $[a_1, b_1]$ 中任取 $\{x_n\}$ 的一项, 记为 x_{n_1} ; 由于 $[a_2, b_2]$ 中包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项, 因此必含有 x_{n_1} 以后的无穷多项, 在这些项中取一项, 记为 x_{n_2} (满足 $n_2 > n_1$); 继续下去, 即可得 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$, 其中 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 且 $a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$. 由夹逼定理, 令 $k \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$$

即 $\{x_n\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. ■

问题 2.23 用有限覆盖定理证明致密性定理。

证明 设数列 $\{x_n\}$ 是有界数列, 不妨设 $\{x_n\} \subset [a, b]$. 若数列 $\{x_n\}$ 中有无限多相等的项, 则由这些项组成 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 是一个常数列, 且收敛。

若数列 $\{x_n\}$ 中相等的项只有有限项, 即 $\{x_n\}$ 中有无穷多个不同的项. 则在 $[a, b]$ 内至少存在一点 x_0 , 对任意的正数 δ , 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内含有 $\{x_n\}$ 中的无穷多项。

事实上, 假若不然, 对于 $[a, b]$ 内的每一点 x , 存在正数 δ_x , 在 $(x - \delta_x, x + \delta_x)$ 内仅有 $\{x_n\}$ 中的有限项; 考虑所有这样的开区间组成的无限开区间集 $H = \{(x - \delta_x, x + \delta_x) \mid x \in [a, b]\}$, H 覆盖了闭区间 $[a, b]$, 则由有限覆盖定理知, 存在 H 中的有限个开区间 $H^* = \{(x_k - \delta_k, x_k + \delta_k) \mid k = 1, 2, \cdots, n\}$ 也覆盖了 $[a, b]$, 并且每个 $(x_i - \delta_i, x_i + \delta_i)$ 中都仅含有 $\{x_n\}$ 的有限项, 与前提矛盾。

于是, 对于 $\delta_k = \frac{1}{k}$ ($k = 1, 2, \cdots$), 在 $(x_k - \delta_k, x_k + \delta_k)$ 内取 $\{x_n\}$ 的点, 组成 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足 $|x_{n_k} - x_0| < \delta_k \leq \frac{1}{k}$, 令 $k \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$$

即 $\{x_n\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. ■

问题 2.24 用 Dedekind 分割定理证明聚点定理。

证明 设 S 是一个非空有上界的实数集, 定义两个集合 A 和 B 分别如下:

$$B = \{b \in \mathbb{R} \mid \forall x \in S, x < b\}, \quad A = \mathbb{R} \setminus B.$$

即 B 由所有比 S 中的数都大的实数组成, A 则为 B 的余集. 下证 $(A \mid B)$ 是实数域的一个 Dedekind 分割。

- (1) 不空: 由于 S 有上界, 可设实数 M 是 S 的一个上界, 令 $a = M + 1$, 则 a 大于 S 中的所有数, 从而 $a \in B$, 所以 $B \neq \emptyset$. 又由于 S 非空, 任取 $x_0 \in S$, 则 $x_0 \in A$, 说明 $A \neq \emptyset$;
- (2) 不漏: 根据 A 与 B 的定义有 $A \cup B = \mathbb{R}$;
- (3) 不乱: 设 $x \in A, y \in B$, 由 $x \in A$ 可知 $x \notin B$, 从而存在 $z \in S$, 使 $x \leq z$. 而由 $y \in B$ 和 $z \in S$ 可知必有 $z < y$. 由 $x \leq z$ 和 $z < y$ 可得 $x < y$, 即 A 中的数都比 B 中的数小。

因此, $(A \mid B)$ 是实数域的一个 Dedekind 分割. 根据 Dedekind 原理可知, 存在实数 c 使得

$$x \leq c \leq y \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

由于 $x \leq c$ 对所有 $x \in S$ 成立 (因为 $S \subseteq A$), 这表明 c 是 S 的一个上界. 另外, 对任意 $\varepsilon > 0$, $c - \varepsilon < c$, 故 $c - \varepsilon \in A$, 从而存在 $x' \in S$ 使得 $x' > c - \varepsilon$. 这意味着 c 是 S 的最小上界 (上确界), 接下来证明 c 是 S 的聚点。

1. 邻域内至少有一个点: 由上确界定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x' \in S$ 使得

$$c - \varepsilon < x' \leq c,$$

故 $x' \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \cap S$.

2. 邻域内有无限多个点 (反证法): 假设存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $(c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0) \cap S$ 只有有限个点 $\{x_1, \dots, x_k\}$. 取

$$\delta = \min\{c - x_i\} > 0,$$

则 $(c - \delta, c) \cap S = \emptyset$. 这意味着 $c - \delta$ 也是 S 的上界, 与 c 是最小上界矛盾。

3. 结论: 因此, $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \cap S$ 必须包含无限多个点, 即 c 是 S 的聚点. ■

2.6 闭区间套定理

定理 (闭区间套定理)

定义:

设有无穷多个闭区间 $[a_n, b_n]$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 满足以下两个条件:

1. $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$

将这一无穷多个闭区间所构成的集合 $\{[a_n, b_n]\}$ 称为一个闭区间套, 简称区间套。

定理内容:

若 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一个闭区间套, 则存在唯一实数 ξ 满足:

$$\xi \in [a_n, b_n], \quad \forall n = 1, 2, 3, \dots$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$



问题 2.25 用确界原理证明闭区间套定理。

证明 令数集 $S = \{a_n\}$, 显然 S 非空有上界 (例如 b_1), 故由确界定理知, S 存在上确界, 设 $\xi = \sup S$ 。下面证明 ξ 即为所求。

因 ξ 为 S 的一个上界, 故 $a_n \leq \xi$ ($n = 1, 2, \dots$)。再由 ξ 为 S 的最小上界知, 假设由某个 $b_m < \xi$, b_m 不是 S 的上界, 即 $\exists a_k > b_m$, 这与 $\{[a_n, b_n]\}$ 为区间套矛盾 ($a_i > b_j$)。所以对任意的 b_n 都有 $b_n \geq \xi$, 故得 $a_n \leq \xi \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$)。

假设还有另外的 $\xi' \in [a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $|\xi - \xi'| \leq |a_n - b_n| \rightarrow 0$, 故 $\xi = \xi'$, 从而唯一性得证。 ■

问题 2.26 用单调有界原理证明闭区间套定理。

证明 由 (i) 知 $\{a_n\}$ 为递增有界数列, 由单调有界定理知 $\{a_n\}$ 有极限 ξ , 且有 $a_n \leq \xi$ ($n = 1, 2, \dots$), 同理, 递减有界数列 $\{b_n\}$ 也有极限, 由区间套的条件 (ii) 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$ 且 $b_n \geq \xi$ ($n = 1, 2, \dots$) 所以有 $a_n \leq \xi \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$)。

假设还有另外的 $\xi' \in [a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $|\xi - \xi'| \leq |a_n - b_n| \rightarrow 0$, 故 $\xi = \xi'$, 从而唯一性得证。 ■

问题 2.27 用 Cauchy 收敛原理证明闭区间套定理。

证明 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时有 $|b_n - a_n| < \varepsilon$ 。由于 $\{a_n\}$ 单调递增, $\{b_n\}$ 中的每一个元素都是 $\{a_n\}$ 的上界, 故 $\forall m > n > N$, 有 $a_n \leq a_m \leq b_m \leq b_n$, 所以

$$|a_m - a_n| = a_m - a_n \leq b_n - a_n = |b_n - a_n| < \varepsilon,$$

$$|b_m - b_n| = b_n - b_m \leq b_n - a_n = |b_n - a_n| < \varepsilon.$$

故由柯西收敛准则知, $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 都收敛, 再由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 知极限相同, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ 。

下面证明 $\xi \in [a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$)。

用反证法: 若 $\exists N_1$ 使 $\xi < a_{N_1}$, 由 $\{a_n\}$ 单调递增知, 当 $n > N_1$ 时有 $a_n > a_{N_1} > \xi$, 所以 $|a_n - \xi| = a_n - \xi \geq 0$, 两边取极限有 $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - \xi) < 0$, 与前提矛盾。若 $\exists N_2$ 使 $\xi > b_{N_2}$, 由 $\{b_n\}$ 单调递减知, 当 $n > N_2$ 时有 $\xi > b_n > b_{N_2}$, 所以 $|b_n - \xi| = \xi - b_n \geq 0$, 两边取极限有 $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\xi - b_n) < 0$, 与假设矛盾。故 $\xi \in [a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$)。

最后证明 ξ 是唯一的。

假设还有另外的 $\xi' \in [a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $|\xi - \xi'| \leq |a_n - b_n| \rightarrow 0$, 故 $\xi = \xi'$, 从而唯一性得证。 ■

问题 2.28 用致密性定理证明闭区间套定理。

证明 由已知条件知, $\{a_n\}$ 单调递增有界, $\{b_n\}$ 单调递减有界, 根据致密性定理, 存在 $\{b_n\}$ 的子列 $\{b_{n_k}\}$ 收敛,

设 $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} = \xi$ 。

由 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一个区间套, 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} (b_{n_k} - a_{n_k}) = 0$, 推出 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \xi$, 由 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的单调性可推出, $\forall k$, 有 $\xi \in [a_{n_k}, b_{n_k}]$ 。又 $\forall n, \exists k$, 使得 $[a_{n_k}, b_{n_k}] \subset [a_n, b_n]$, 故 $\xi \in [a_n, b_n]$ 。

最后证明 ξ 是唯一的。

假设还有另外的 $\xi' \in [a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$, 则 $|\xi - \xi'| \leq |a_n - b_n| \rightarrow 0$, 故 $\xi = \xi'$, 从而唯一性得证。 ■

问题 2.29 用有限覆盖定理证明闭区间套定理。

证明 用反证法。假设 $[a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$ 没有公共点, 则 $[a_1, b_1]$ 上的任何一点都不是 $\{[a_n, b_n]\}$ 的公共点, 从而 $\forall x \in [a_1, b_1]$, 总存在一个开区间 $(x - \delta_x, x + \delta_x)$, 使得 $(x - \delta_x, x + \delta_x)$ 与所有的 $[a_n, b_n]$ 无交集, 即存在某个 $[a_{n_x}, b_{n_x}]$ 使得 $[a_{n_x}, b_{n_x}] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x) = \emptyset$ 。

当 x 取遍 $[a_1, b_1]$ 上的所有点时, 就得到一无限开区间集 $H = \{(x - \delta_x, x + \delta_x) | x \in [a_1, b_1]\}$ 覆盖了闭区间 $[a_1, b_1]$, 由有限覆盖定理, 存在有限个开区间 $H = \{(x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) | i = 1, 2, \dots, k\}$ 覆盖 $[a_1, b_1]$, 其中 $[a_{n_{x_i}}, b_{n_{x_i}}] \cap (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) = \emptyset$ 。

因为 $[a_{n_{x_i}}, b_{n_{x_i}}]$ 只有有限个, 由闭区间套定理的条件知, 它们是一个套一个, 因此其中一定有一个最小区间, 设为 $[a_{n_0}, b_{n_0}]$, 这时 $[a_{n_0}, b_{n_0}] \cap (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) = \emptyset (i = 1, 2, \dots, k)$ 。

从而 $[a_{n_0}, b_{n_0}] \cap \bigcup_{i=1}^k (x_i - \delta_{x_i}, x_i + \delta_{x_i}) = \emptyset$, 这与 $[a_{n_0}, b_{n_0}] \subseteq [a_1, b_1]$ 矛盾。

所以 $[a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$ 应有公共点。 ■

问题 2.30 用 Dedekind 分割定理证明闭区间套定理。

证明 设 $[a_n, b_n]$ 为一列闭区间套。令 $\{a_n\}$ 全体上界为上类 B , 令 $A = \mathbb{R} \setminus B$ 。由已知

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_{n-1}, b_{n-1}] \supset [a_n, b_n]$$

可知

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq b_n \leq \dots \leq b_2 \leq b_1,$$

所以有结论:

- (1) 不空: 由于 $b_1 \in B, a_1 \in A$, 则 A, B 两类不空;
- (2) 不漏: 由于 $A = \mathbb{R} \setminus B$, 则 A, B 两类不漏;
- (3) 不乱: $\forall a \in A, \forall b \in B$, 可知 a 不是 $\{a_n\}$ 的上界, 因此存在 $x \in \{a_n\}$ 使 $a < x$ 。又 b 为 $\{a_n\}$ 的上界, 所以 $x \leq b$, 则有 $a < x \leq b$, 即得 $a < b$, 故 A, B 不乱。

因此, (A, B) 是实数域的一个 Dedekind 分割。此时我们运用 Dedekind 原理知, 存在唯一的 $c, \forall a \in A, \forall b \in B$, 有 $a < c \leq b$ 。所以

$$\forall n, a_n \leq c \leq b_n,$$

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

■

2.7 有限覆盖定理

定理 2.10 (有限覆盖定理)

(a) 定义: 设 $E \subset \mathbb{R}$, $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是一族开区间, 若满足

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \supseteq E,$$

则称 $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 为 E 的开覆盖。若 E 的任何开覆盖都存在有限子覆盖 (即存在有限个 $O_{\lambda_1}, \dots, O_{\lambda_n}$ 仍覆盖 E), 则称 E 是紧的。

(b) 定理内容: 任何有界闭区间 $[a, b]$ 都是紧的 (闭区间上的任一开覆盖必存在有限子覆盖)。

(c) 等价描述: 设 $\{\Delta\}$ 是一组开区间, 若 $\forall x \in [a, b], \exists \Delta_x \in \{\Delta\}$, 使得 $x \in \Delta_x$, 则称 $\{\Delta\}$ 为闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖。定理指出, $[a, b]$ 的任一开覆盖 $\{\Delta\}$ 中, 必存在有限子集 $\{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r\} \subset \{\Delta\}$, $\{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_r\}$ 仍为 $[a, b]$ 的一个开覆盖 (称之为有限子覆盖)。

♥

问题 2.31 用确界原理证明有限覆盖定理。

证明 设 H 为 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 令数集 $S = \{x | a < x \leq b, [a, x] \text{ 能被 } H \text{ 中的有限个开区间覆盖}\}$, 显然 S 有上界 b , 因为 a 点的邻域 $(a - \delta, a + \delta)$ 必含有 $[a, b]$ 中的点, 设为 x , 则开区间 $(a - \delta, a + \delta)$ 必覆盖 $[a, x]$, 故 S 非空。由确界存在定理知 S 必有上确界, 设 $\xi = \sup S$ 。

下面证明 $\xi = b$ 。反证法: 若 $\xi \neq b$, 则 $a < \xi < b$, 由 H 覆盖闭区间 $[a, b]$ 知, 一定存在 $(\alpha_i, \beta_i) \in H$, 使 $\xi \in (\alpha_i, \beta_i)$, 取 x_1, x_2 使 $a < x_1 < \xi < x_2 < \beta_1$, 且 $x_1 \in S$, 则 $[a, x_1]$ 能被 H 中有限个开区间覆盖, 把 (α_1, β_1) 加进去, 就可推出 $x_2 \in S$, 这与 $\xi = \sup S$ 矛盾, 故 $\xi = b$, 即定理的结论成立。■

问题 2.32 用单调有界原理证明有限覆盖定理。

证明 设 H 为 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 假设 H 不存在有限子覆盖, 则对 $[a, b]$ 二等分作区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 使得每个 $[a_n, b_n]$ 都不存在有限子覆盖。根据区间套的做法知, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是单调有界数列, 故由单调有界定理可推出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时有 $\xi - \varepsilon < a_n < \xi + \varepsilon, \xi - \varepsilon < b_n < \xi + \varepsilon$, 从而 $[a_n, b_n] \subset (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$ 。这表明 $[a_n, b_n]$ 已被 $(\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$ 所覆盖, 这与 $[a_n, b_n]$ 的做法矛盾。于是有限覆盖定理成立。■

问题 2.33 用 Cauchy 收敛原理证明有限覆盖定理。

证明 设 H 为 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 假设 H 不存在有限子覆盖, 则对 $[a, b]$ 二等分作区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 使得每个 $[a_n, b_n]$ 都不存在有限子覆盖。

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时有 $|b_n - a_n| < \varepsilon$ 。由于 $\{a_n\}$ 单调递增, $\{b_n\}$ 中的每一个元素都是 $\{a_n\}$ 的上界, 故 $\forall m > n > N$, 有 $a_n \leq a_m \leq b_m \leq b_n$, 所以

$$|a_m - a_n| = a_m - a_n \leq b_n - a_n = |b_n - a_n| < \varepsilon,$$

$$|b_m - b_n| = b_n - b_m \leq b_n - a_n = |b_n - a_n| < \varepsilon.$$

故由柯西收敛准则知, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都收敛, 再由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 知极限相同, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ 。

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时有 $\xi - \varepsilon < a_n < \xi + \varepsilon, \xi - \varepsilon < b_n < \xi + \varepsilon$, 从而 $[a_n, b_n] \subset (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$ 。这表明 $[a_n, b_n]$ 已被 $(\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$ 所覆盖, 这与 $[a_n, b_n]$ 的做法矛盾。

于是有限覆盖定理成立。■

问题 2.34 用致密性定理证明有限覆盖定理。

证明 设 H 为 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 假设 H 不存在有限子覆盖, 则对 $[a, b]$ 二等分作区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 使得每个 $[a_n, b_n]$ 都不存在有限子覆盖。

根据闭区间套的做法知, $\{b_n\}$ 为有界数列, 故由致密性定理知, 存在 $\{b_n\}$ 的子数列 $\{b_{n_k}\}$ 收敛, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} = \xi$, 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} (b_{n_k} - a_{n_k}) = 0$ 知 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \xi$, 显然 $\xi \in [a, b]$ 。

由 $[a, b]$ 被 H 覆盖知, 存在开区间 $(\alpha, \beta) \in H$, 使 $\xi \in (\alpha, \beta)$, 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} b_{n_k} = \xi$ 知, 存在充分大的 K 使得 $[a_{n_K}, b_{n_K}] \subset (\alpha, \beta)$, 这与 $[a_{n_K}, b_{n_K}]$ 不能被 H 有限覆盖矛盾。■

问题 2.35 用闭区间套定理证明有限覆盖定理。

证明 用反证法。假设定理的结论不成立, 即不能用 H 中有限个开区间来覆盖 $[a, b]$ 。

将 $[a, b]$ 等分为两个子区间, 则其中至少有一个子区间不能用 H 中的有限个开区间来覆盖。记这个子区间为 $[a_1, b_1]$, 则 $[a_1, b_1] \subseteq [a, b]$, 且 $b_1 - a_1 = \frac{1}{2}(b - a)$ 。

再将 $[a_1, b_1]$ 等分为两个子区间, 同样, 其中至少有一个子区间不能用 H 中的有限个开区间来覆盖, 记这个子区间为 $[a_2, b_2]$, 则 $[a_2, b_2] \subseteq [a_1, b_1]$, 且 $b_2 - a_2 = \frac{1}{2^2}(b - a)$ 。

重复上述步骤并不断地进行下去, 则得到一个闭区间列 $\{[a_n, b_n]\}$, 它满足:

- (i) $[a_n, b_n] \supseteq [a_{n+1}, b_{n+1}] (n = 1, 2, \dots)$;
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$;
- (iii) 每一个 $[a_n, b_n]$ 都不能用 H 中有限个开区间来覆盖,

由区间套定理, 存在唯一的一点 $\xi \in [a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$ 。由于 H 是 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 故存在开区间 $(\alpha, \beta) \in H$, 使 $\xi \in (\alpha, \beta)$ 。于是当 n 充分大时有 $[a_n, b_n] \subseteq (\alpha, \beta)$ 。这表明 $[a_n, b_n]$ 只须用 H 中的一个开区间 (α, β) 就能覆盖, 这与挑选 $[a_n, b_n]$ 时的假设“不能用 H 中有限个区间来覆盖”相矛盾。从而证得必存在属于 H 的有限个开区间能覆盖 $[a, b]$ 。■

问题 2.36 用 Dedekind 分割定理证明有限覆盖定理。

证明 设 \mathcal{U} 是闭区间 $[a, b]$ 的开覆盖, 构造集合 $A = (-\infty, x]$, 其中 $x \in [a, b]$, 并且 $[a, x]$ 能用 \mathcal{U} 中有限个开区间覆盖。

由于 $a \in A$ (此时的 $[a, a] = \{a\}$), 所以 $A \neq \emptyset$ 。同时, 因为 $\forall y > b, y \notin A$, 所以 $A^c \neq \emptyset$ 。而 $A^c = (x, +\infty)$, 显然 $\forall p \in A, q \in A^c$, 有 $p < q$, 所以 A^c 满足 Dedekind 定理的条件。

根据 Dedekind 定理, 存在唯一实数 ξ , 使得 $\xi = \max A$ 。

A^c 是开区间, 不可能有最小值, 所以这里直接能得到 $\xi \in A$ 。

根据 A 的定义可知 $\xi \in [a, b]$ 且 $[a, \xi]$ 能被有限覆盖。而因为 a 被 \mathcal{U} 中某个开区间覆盖, 即存在 $U_0 \in \mathcal{U}$, 使得 $a \in U_0$ 。在 $U_0 \cap (a, b)$ 中取一点 x_0 , 那么 $[a, x_0] \subset U_0$ 就能被有限个开区间 (即 U_0) 覆盖, 所以 $x_0 \in A \Rightarrow a < x_0 \leq \xi$ 。

假设 $\xi < b$, 则 (a, b) 是 ξ 的开邻域, 因此存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $(\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon) \subset (a, b)$ 。

另一方面, 因为 $[a, \xi]$ 被有限覆盖, 记作 $[a, \xi] \subset \bigcup_{i=1}^n U_i$, 所以存在某个 U_i , 使得 $\xi \in U_i$ 。而 $(\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon) \cap U_i$ 依然是 ξ 的开邻域, 所以存在开球 $B(\xi, r) = (\xi - r, \xi + r) \subset (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon) \cap U_i$ 。取一点 $y_0 \in (\xi, \xi + r) \subset U_i$, 那么 $[\xi, y_0] \subset U_i$ 。

从而 $[a, \xi] \cup [\xi, y_0] \subset \bigcup_{i=1}^n U_i \cup U_i$, 即 $[a, y_0] \subset \bigcup_{i=1}^n U_i$, 因此 $y_0 \in A$, 与 $y_0 \in (\xi, \xi + r) \Rightarrow y_0 > \xi$ 矛盾。

所以 $\xi = b$, 即 $[a, b]$ 能被有限覆盖。■

2.8 Dedekind 分割定理

定理 (Dedekind 分割定理-裴书版)

若将实数分为上、下（非空的）两组： A' 和 A ，使得

1. 每个实数必在，且仅在两组之一；
2. 上组 A' 中的每个数必大于下组 A 中的每个数，

则称 A 和 A' 组成一 Dedekind 分割，记作 $A|A'$ 。每个 $A|A'$ 确定唯一的实数 ξ 。下面称它为分割点。

Dedekind 定理指出，此时

1. 要么 $\xi \in A$ ，则下组 A 中有最大值 ξ ，而上组 A' 中无最小值；
2. 要么 $\xi \in A'$ ，则下组 A 中无最大值，而上组 A' 中有最小值 ξ 。

该定理非常直观，意即：在数轴任何地方，用法平面去截，必截得唯一的实数 ξ （表明实轴连续，无空缺）。该实数 ξ 将数轴分成 $A|A'$ 两半，要么 $\xi \in A$ ，要么 $\xi \in A'$ 。

定义 (Dedekind 原理)

设 A, B 是实数域 \mathbb{R} 的两个子集，它们满足以下三个条件：

- (a) 不空： $A \neq \emptyset$ 且 $B \neq \emptyset$ ；
- (b) 不漏： $A \cup B = \mathbb{R}$ ；
- (c) 不乱：对 $\forall x \in A, y \in B$ 都成立 $x < y$ ；

则称 $(A|B)$ 为实数域的一个 Dedekind 分割， A 为分割的下集， B 为分割的上集。

定理 (Dedekind 分割定理)

设 $(A|B)$ 是实数域的一个 Dedekind 分割，则或者下集 A 中有最大数，或者上集 B 中有最小数。

等价描述：设 $(A|B)$ 是实数域的一个 Dedekind 分割，则存在实数 c 使得 $x \leq c \leq y \quad \forall x \in A, \forall y \in B$ 成立。实数 c 称为分划 $(A|B)$ 的分界点，且 c 是唯一的。

问题 2.37 用确界原理证明 Dedekind 分割定理。

证明 设 $(A|B)$ 是实数域 \mathbb{R} 的一个 Dedekind 分割。

我们将证明：上集 B 中存在最小元（或下集 A 中存在最大元的情况类似）。由于 $B \neq \emptyset$ 且对任意 $x \in A, y \in B$ 有 $x < y$ ，可知 B 在实数集中有下界。

根据确界原理， B 的下确界存在，记为 $\beta = \inf B$ 。

我们考虑两种可能：

- 若 $\beta \in B$ ，则 β 是 B 的最小元，结论成立；
- 若 $\beta \notin B$ ，由于 $A \cup B = \mathbb{R}$ 且 $A \cap B = \emptyset$ ，必有 $\beta \in A$ 。

反证法：假设 $\beta \notin B$ 则 $\beta \in A$ 。

由 A 中无最大元 $\exists \alpha \in A, \alpha > \beta$

因为 $\forall x \in B, x > \beta \Rightarrow \beta = \min B, \alpha > \beta = \min B$ ，这意味着 $\alpha \in B$ ，矛盾！

问题 2.38 用单调有界原理证明 Dedekind 分割定理。

证明 设 \mathbb{R} 上一个 Dedekind 分割 $(A|B)$ 。不妨设 A 中无最大元，现证 B 中有最小元。

构造单调数列 $\{a_n\}$ 和单调数列 $\{b_n\}$ ， $\{a_n\} \subseteq A$ ， $\{b_n\} \subseteq B$ 。

$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ ，由单调有界定理，知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$ ，知 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \eta$ 。

$b_n > a_n$ ，由保序性 $\eta \geq \xi$ ， $0 \leq \eta - \xi \leq b_n - a_n \rightarrow 0$ ， $n \rightarrow \infty$ ， $\eta = \xi$ 。

现证 ξ 即 B 中最小元。若 $\xi \in A$ ，由 A 中无最大元， $\exists x \in A, x > \xi$ 。 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \eta = \xi$ ， $\exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N$ ， $|b_n - \xi| < \varepsilon \Rightarrow \xi > b_n - \varepsilon$ 。故 $x > \xi > b_n - \varepsilon$ ，可得 $x \geq b_n \Rightarrow x \in B$ 矛盾。故 $\xi \in B$ ，且 $\forall n \in \mathbb{N}^+, \xi \leq b_n$ ， ξ 即 B

的最小元。 ■

问题 2.39 用 Cauchy 收敛原理证明 Dedekind 分割定理。

证明 设 $(A | B)$ 是全体实数 \mathbb{R} 的任意一个分割。由于 $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, 可以任取 $a_1 \in A$, $b_1 \in B$, 则 $b_1 > a_1$ 。将区间 $[a_1, b_1]$ 等分为二:

如果分点 $\frac{a_1+b_1}{2} \in A$, 则取右半区间 $[a_2, b_2] = \left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right]$; 如果 $\frac{a_1+b_1}{2} \in B$, 则取左半区间 $[a_2, b_2] = \left[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}\right]$ 。无论如何选择, 都有 $a_2 \in A$, $b_2 \in B$ 。

如此继续下去, 得到闭区间列 $\{[a_n, b_n]\}$, 满足:

- (i) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$)
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$
- (iii) $a_n \in A$, $b_n \in B$ ($n = 1, 2, \dots$)

由 (i) 和 (ii) 可知数列 $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$ 是 Cauchy 数列, 因而收敛。设其极限为 $c \in \mathbb{R}$ 。

若 $c \in A$, 可证 c 必为 A 的最大值。事实上, 假如存在 $x \in A$ 使得 $c < x$, 取 $\varepsilon = x - c > 0$, 则 $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset A$ 。由 (iii), 每个 $b_n \notin (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$, 这与数列收敛于 c 矛盾。因此 c 为 A 的最大值, 此时 B 无最小值。

类似地, 若 $c \in B$, 则 c 必是 B 的最小值, 此时 A 无最大值。

这就证明了: 对实数集的任意分割 $(A | B)$, 要么 A 有最大值且 B 无最小值, 要么 B 有最小值且 A 无最大值, 即 $(A | B)$ 是一个 Dedekind 分割。 ■

问题 2.40 用闭区间套定理证明 Dedekind 分割定理。

证明 设 \mathbb{R} 上的 Dedekind 分割 $A|B$ 。不妨设 A 中无最大元, 现证 B 中必有最小元。

任取 a, b , $a \in A, b \in B$, 将闭区间 $[a, b]$ 采用 Bolzano 二分法 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 。其中包含有 A 和 B 元素的记作 $[a_n, b_n]$, 依次取可得一系列闭区间序列 $\{[a_n, b_n]\}$ ($n = 1, 2, \dots$), $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 。

由闭区间定理, $\exists \xi \in [a_n, b_n]$ ($n = 1, 2, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 。

反证假设 $\xi \in A$, A 中无最大元, $\exists x > \xi$, $x \in A$ 。

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, $\forall n > N$, $|b_n - \xi| < \varepsilon$, 故 $b_n < \xi + \varepsilon$ 。

$x > \xi > b_n - \varepsilon$, $x \geq b_n$, b_n 单调递减, $x \in B$ 矛盾。

故 $\xi \in B$, 现证 $\xi = \min B$ 。

反证假设 $\exists \eta \in B$, $\eta < \xi$, 取 $\varepsilon = \eta - \xi > 0$, 由 $b_n < \xi + \varepsilon$, 知 $b_n < 2\xi - \eta$ 。

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, $\forall n > N$, $|a_n - \xi| < \varepsilon$ 故 $a_n > \xi - \varepsilon > \eta$ 。

故 $[a_n, b_n] \subset (\eta, 2\xi - \eta)$, $(\eta, 2\xi - \eta)$ 包含在 B 中, 无 A 中元素, 与构造矛盾。 ■

问题 2.41 用致密性定理证明 Dedekind 分割定理。

证明 设 $A|B$ 是 \mathbb{R} 上的一个 Dedekind 分割, A 中无最大值, 现证 B 中有最小值。

任取 a, b , $a \in A, b \in B$, 且 $[a, b]$ 利用 Bolzano 二分法。

$\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 至少有一个既含 A 的元素又含 B 的元素, 记作 $[a_n, b_n]$ 。

这是因为将 $[a, b]$ 分为两个子区间,

$$\left[a, \frac{a+b}{2}\right] \quad \text{和} \quad \left[\frac{a+b}{2}, b\right].$$

中点 $\frac{a+b}{2}$ 要么属于 A , 要么属于 B (因为 $A \cup B = \mathbb{R}$)。

情况分析:

- 如果 $\frac{a+b}{2} \in A$:
 - 右子区间 $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 包含 $\frac{a+b}{2} \in A$ 和 $b \in B$ 。
- 如果 $\frac{a+b}{2} \in B$:
 - 左子区间 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 包含 $a \in A$ 和 $\frac{a+b}{2} \in B$ 。

依次取分 $\{[a_n, b_n]\}$ ($n = 1, 2, \dots$)

显然 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, $\{b_n\}$ 单调递减有下界。

由致密性定理知, $\{a_n\}$ 存在收敛子列 $\{a_{n_k}\}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \xi$ 。

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N, |a_{n_k} - \xi| < \varepsilon$ 即 $\xi - \varepsilon < a_{n_k} < \xi + \varepsilon$

$\forall n > N, \forall k \geq n$, 由 $\{a_n\}$ 单调递增 $n > N$ 时, $\xi - \varepsilon < a_{n_k} < a_n < \xi + \varepsilon$ 故 $\{a_n\}$ 收敛于 ξ , 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0 \Rightarrow \{b_n\}$ 收敛于 ξ . 则 A 中无最大值, 易证 $\xi \in B$ (反证法, 如 2.38 中的过程)。

现证 ξ 是 B 中最小元, 反证假设 $\exists \eta < \xi, \eta \in B$, 那么 $[a_n, b_n] \subseteq (\eta, 2\xi + \varepsilon)$, 此区间必在 B 中, 与闭区间套既包含 B 中元素又包含 A 中元素矛盾! ■

问题 2.42 用有限覆盖定理证明 Dedekind 分割定理。

证明 (裴书版定理符号) 用有限覆盖定理证明 Dedekind 定理。设全体实数被分别为非空的 A, A' 两组, A, A' 组成一个 Dedekind 分割 $A|A'$, 即 $\mathbb{R} = A \cup A', A \cap A' = \emptyset$, 且 $\forall x \in A, x' \in A'$, 恒有 $x < x'$ 。要证明 Dedekind 定理, 就是要证明: 每个 Dedekind 分割 $A|A'$, 确定存在某 $\xi \in \mathbb{R}$, 使得

- i) 要么 $\xi \in A, \xi$ 是 A 的最大值, 此时 A' 无最小值;
- ii) 要么 $\xi \in A', \xi$ 是 A' 的最小值, 此时 A 无最大值。

这等价于说下面两种 (反面) 情况皆不会发生:

- iii) A 有最大值, 且 A' 有最小值;
- iv) A 无最大值, 且 A' 无最小值。

亦等价于说: 实数是连续的, 对每个分割 $A|A'$, 都必确定唯一实数 ξ 作为分割点。

首先, 证明情况 iii) 不会发生。(反证法) 假设 $\alpha = \max A, \beta = \min A'$, 那么: 若 $\alpha < \beta$, 则与 $A \cup A' = \mathbb{R}$ 矛盾; 若 $\alpha = \beta$, 则与 $A \cap A' = \emptyset$ 矛盾; 若 $\alpha \geq \beta$, 则 $(A \text{ 中之数}) < (A' \text{ 中之数})$, 矛盾。

其次, 用有限覆盖定理证明情况 iv) 也不会发生。(反证法) 假设 A 无最大值, 且 A' 无最小值 (看有什么矛盾)。

取 $a \in A, b \in A'$, 则 $\forall x \in [a, b]$: 若 $x \in A$, (因 A 无最大值) 当 $r_i > 0$ 充分小时 $x + r_i$ 也应属于 A 。于是小开区间 $(x - r_i, x + r_i) \subset A$; 同理, 因 A' 无最小值, 若 $x \in A'$, 当 $r_i > 0$ 充分小时 $x - r_i$ 也应属于 A' , 从而应有 $(x - r_i, x + r_i) \subset A'$ 。可见 $[a, b]$ 上每点可找到如此的小区间, 全体 $\{(x - r_i, x + r_i)\}_{x \in [a, b]}$ 便组成 $[a, b]$ 上的一组开覆盖。利用有限覆盖定理, 应存在有限子覆盖。注意, 既然有有限个小开区间覆盖 $[a, b]$, 相邻两个小开区间必有公共点, 故相邻的小区间要么只含 A 之成员, 要么只含 A' 之成员。于是这个有限子覆盖, 要么全是 A 之成员, 要么全是 A' 之成员。这与最初的选择 $(a \in A, b \in A')$ 矛盾, 这就证明了情况 iv) 不可能发生。Dedekind 定理获证。 ■