

Arbeidskrav 1 - Arbeidsfysiologisk rapport

Påvirker tidspunkt på dagen VO2maks?

Hanne N. Kjærstad, Jonas Amundsen, Marit Heinemann og Merete S. Lien

2026-09-16

HSV (Helse og sosialvitenskapelig fakultet)

Arbeidskrav 1 - Kvantitativ metode og statistikk

Høst 2026

Studieprogram: Treningsfysiologi

Emnekode: IDR4000

Introduksjon

Døgnvariasjoner i fysiologiske prosesser kan ha avgjørende betydning for prestasjon og konkurranserresultat. Dette er særlig gjeldende i tilfeller hvor tidspunktet for utøverens toppprestasjon ikke samsvarer med konkurransetidspunktet. Tidligere forskning viser at eksplosive parametere, som anaerob kraft og hopp høyde, kan være høyere på ettermiddagen og kvelden, med optimal prestasjon mellom kl. 13.00 og 20.00 (Knaier et al., 2022). På lik linje har Kang et al. (2023) rapportert at utholdenhetsprestasjon, målt i tid til utmattelse, kan være bedre på kvelden sammenlignet med morgenen.

Når det gjelder døgnvariasjoner i det maksimale oksygenopptaket (VO_2 maks), er bildet langt mer usikkert og det er mindre klar evidens for at slike variasjoner eksisterer. Knaier et al. (2022) fant begrenset evidens for systematiske variasjoner i maksimal utholdenhet gjennom dagen. Dette støttes av funnene til Kang et al. (2023), som ikke fant noen signifikant forskjell i VO_2 maks på tvers av ulike testtidspunkter.

Variasjoner i måleresultater og fysisk prestasjon kan imidlertid påvirkes av flere faktorer. Kusumoto et al. (2021) konkluderte med at faktorer som søvn, fysisk aktivitet, ernæring og øvrige individuelle forskjeller, kan være en medvirkende årsak til svingninger i prestasjon gjennom dagen. Det er derfor avgjørende å kontrollere slike faktorer ved sammenligning av VO_2 maks mellom ulike testtidspunkter.

På bakgrunn av begrensende evidens for døgnvariasjoner i VO_2 maks var formålet med miniprojektet å undersøke i hvilken grad døgnrytmen påvirker det maksimale oksygenopptaket hos aktive studenter. Basert på dette ble følgende problemstilling utarbeidet:

Problemstilling

I hvilken grad vil tidspunkt på dagen påvirke VO_2 maks hos aktive studenter?

Metode

Deltakere

Utvalget i denne studien besto av sju deltakere, kjønnsfordelt med tre kvinner og fire menn. Én av de mannlige deltakerne ble ekskludert fra studien på grunn av at test 2 ikke lot seg gjennomføre. Øvrige deltakerne var i alderen 23 til 28 år, og hadde en gjennomsnittlig alder på 24,8 år med et standardavvik på 1,8 år. Deltakerne i studien er presentert i tabell 1. Samtlige deltakere var både kjent med og hadde selv erfaring med gjennomføring av maksimale fysiologiske laborasjonstester fra tidligere. Alle deltakerne ble bekreftet friske og skadefrie på testtidspunktene.

```

library(tidyverse)
library(knitr)
library(readxl)

tabell_deltakere <- read.csv("data/behandlet/behandlet_vo2maks.csv")

tabell_deltakere <- tabell_deltakere |>
  select(deltager,
         kjonn,
         alder) |>

  distinct() |>

  mutate(kjonn = if_else(kjonn == "m", "Mann", "Kvinne"))

colnames(tabell_deltakere) <- c("Deltaker", "Kjønn", "Alder (år)")

kable(tabell_deltakere)

```

Tabell 1: Oversikt over deltakerne med kjønn og alder

Deltaker	Kjønn	Alder (år)
P01	Mann	23
P02	Kvinne	23
P03	Kvinne	25
P04	Mann	25
P05	Kvinne	25
P06	Mann	28

Statistisk analyse

Alle dataene som ble innhentet fra de fysiologiske laborasjonene ble opprinnelig dokumentert og organisert i Excel, og ved hjelp av pakken readxl ble disse rådataene importert til RStudio for videre bearbeiding. Datasettet ble videre filtrert til å kun inkludere de seks deltakerne som fullførte to testsituasjoner, i tillegg til at kun relevante variabler ble tatt med for videre analyse.

Gjennomsnitt og standardavvik, samt grafiske fremstillinger ble utformet i R ved hjelp av pakkene tidyverse, ggplot2 og knitr. For å undersøke om det var en signifikant forskjell i relativ VO_2 maks mellom morgen- og kveldstest, ble det benyttet en lineær regresjonsmodell med VO_2 maks som en avhengig variabel og starttidspunkt som en uavhengig variabel. Den

lineære regresjonsmodellen tok høyde for at datasettet hadde et parret design ved å legge til deltakerne som nok en uavhengig variabel, og med dette ble det kontrollert for individuelle fysiske forskjeller mellom deltakerne. Ut fra den lineære regresjonsmodellen ble det hentet ut en p -verdi, som ble vurdert opp mot det statistiske signifikansnivået på 0.05.

Beskrivelse av datainnhenting

Dataene ble innhentet under arbeidsfysiologiske tester gjennomført på testlabben ved Universitet i Innlandet på Lillehammer med frivillige deltakerne rekruttert blant studentene. Kroppsvekt ble registrert før hver test. Testing av VO_2 maks ble gjennomført på en motorisert tredemølle (Woodway) med en konstant stigning på 10,5%. Starthastigheten ble satt til 6 km/t for jentene og 8 km/t for guttene. Farten økte med 1 km/t hvert minutt til deltakerne oppnådde fysisk utmattelse. Under testene ble VO_2 maks målt ved indirekte kalorimetri (Vyntus). VO_2 maks ble beregnet av gjennomsnittet av de to høyeste påfølgende 30-sekunders målingene. Hjerterefrekvens (slag/min) ble målt kontinuerlig med telemetrisk pulsmåler (pulsbelte tilkoblet klokke eller Vyntus) og registrert hvert halvt minutt. Laktatkonsentrasjonen ble målt fra en blodprøve tatt ett minutt etter avsluttet test og analysert med Biosen C-line, og opplevd anstrengelse ble vurdert ved hjelp av Borgs 6-20 skala. I tillegg ble testvarighet og høyeste hastighet oppnådd notert.

Resultater

Studien fant ingen statistisk signifikant forskjell i VO_2 maks mellom morgen- og kveldstest, som vist ved p -verdi = 0.580 i figur 1. Gjennomsnittlig VO_2 maks var stabilt med $54.2 \pm 8.2 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ om morgenen og $53.9 \pm 7.8 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ på kvelden. Den gjennomsnittlige forskjellen mellom betingelsene var dermed $-0.3 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$. De fleste av deltakerne hadde tilnærmet stabile målinger mellom morgen- og kveldstest, med unntak av deltaker 2 som hadde en svak økning på kveldstesten og deltaker 4 som hadde en svak reduksjon på kveldstesten. Det var store individuelle forskjeller mellom testdeltakerne.

```
library(tidyverse)
library(knitr)
library(readxl)

tabell <- read.csv("data/behandlet/behandlet_vo2maks.csv")

mod <- lm(VO2_maks_rel ~ starttidspunkt + deltager, data = tabell)
pval <- round(coef(summary(mod))[2, 4], 5)

tabell <- tabell |>
```

```

mutate(starttidspunkt = factor(starttidspunkt, levels = c("Morgen", "Kveld")))

fig_resultater <- ggplot(data = tabell,
                        aes(x = starttidspunkt, y = V02_maks_rel,
                            group = deltager,
                            color = deltager)) +

geom_line(linewidth = 0.7) +

geom_point(size = 1.5,
           color = "black",
           fill = "grey") +

labs(
  x = "Tid på døgnet",
  y = "V02-maks (ml/kg/min)",

  color = "Deltager") +

scale_y_continuous(
  limits = c(45, 70),
  breaks = seq(45, 70, by = 5),
  expand = c(0, 0)) +


theme_linedraw() +

annotate("segment", x = 1, xend = 2, y = 67, yend = 67) +
annotate("segment",
        x = c(1, 2),
        xend = c(1, 2),
        y = c(67, 67),
        yend = c(66, 66)) +

annotate("text", label = paste0("P-verdi = ", pval),
        x = 1.5, y = 68)

print(fig_resultater)

```



Figur 1: Individuelle relative VO2maks-verdier ved morgen- og kveldstesting. Linjene forbinder de to målingene fra samme deltaker

Når det gjelder de øvrige inkluderte variablene, viste studien liten forskjell mellom testtidspunktene. Gjennomsnittlig hjerterefrekvens var marginalt høyere på morgenen med 198 ± 10 bpm, til forskjell fra 195 ± 10 bpm på kvelden. Laktatverdier målt ett minutt i etterkant av avsluttet test viste tilnærmet like resultater mellom testtidspunktene med $10,11 \pm 2,91$ mmol/L på morgenen vs. $10,53 \pm 2,99$ mmol/L på kvelden. RER og Borg var sammenlignbare ved begge testtidspunkter.

Gjennomsnittlige verdier med standardavvik for de inkluderte variablene på de ulike starttidspunktene står beskrevet i tabell 2.

```
library(tidyverse)
library(knitr)
library(kableExtra)

tabell_resultater <- read.csv("data/behandlet/behandlet_vo2maks.csv")

tabell_resultater <- tabell_resultater |>
  mutate(starttidspunkt = factor(starttidspunkt, levels = c("Morgen", "Kveld"))) |>
  group_by(starttidspunkt) |>
```

```

summarise(
  snitt_vo2 = mean(VO2_maks_rel, na.rm = TRUE),
  avvik_vo2 = sd(VO2_maks_rel, na.rm = TRUE),
  snitt_hf = mean(HF_maks, na.rm = TRUE),
  avvik_hf = sd(HF_maks, na.rm = TRUE),
  snitt_laktat = mean(la_maks, na.rm = TRUE),
  avvik_laktat = sd(la_maks, na.rm = TRUE),
  snitt_RER = mean(RER_maks, na.rm = TRUE),
  avvik_RER = sd(RER_maks, na.rm = TRUE),
  snitt_borg = mean(borg_maks, na.rm = TRUE),
  avvik_borg = sd(borg_maks, na.rm = TRUE),
  snitt_alder = mean(alder, na.rm = TRUE),
  avvik_alder = sd(alder, na.rm = TRUE)
) |>

mutate(
  VO2maks = paste0(round(snitt_vo2, 1), " ± ", round(avvik_vo2, 1)),
  Hjertefrekvens = paste0(round(snitt_hf, 0), " ± ", round(avvik_hf, 0)),
  Laktat = paste0(round(snitt_laktat, 2), " ± ", round(avvik_laktat, 2)),
  RER = paste0(round(snitt_RER, 2), " ± ", round(avvik_RER, 2)),
  Borg = paste0(round(snitt_borg, 0), " ± ", round(avvik_borg, 0)),
  Alder = paste0(round(snitt_alder, 1), " ± ", round(avvik_alder, 1))
) |>

select(starttidspunkt,
  VO2maks,
  Hjertefrekvens,
  Laktat,
  RER,
  Borg) |>

pivot_longer(cols = -starttidspunkt, names_to = "Variabel", values_to = "verdi") |>
pivot_wider(names_from = starttidspunkt, values_from = "verdi")

kable(tabell_resultater, format = "latex", booktabs = TRUE) |>
  kable_styling(latex_options = c("hold_position", "scale_down"))

```

Tabell 2: Deskriptiv statistikk for morgen- og kveldstester

Variabel	Morgen	Kveld
VO ₂ maks	54.2 ± 8.2	53.9 ± 7.8
Hjertefrekvens	198 ± 10	195 ± 10
Laktat	10.11 ± 2.91	10.53 ± 2.99
RER	1.17 ± 0.06	1.19 ± 0.06
Borg	19 ± 1	19 ± 1

Diskusjon

Denne studien undersøkte i hvilken grad tidspunkt på dagen påvirker VO_2 maks hos aktive studenter. Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell i VO_2 maks mellom morgen og kveld. Funnet står i tråd med Knaier et al. (2022) og Kang et al. (2023) som fant begrenset til ingen evidens for systematiske variasjoner i maksimal utholdenhetsprestasjon gjennom dagen. Samtidig fant Knaier et al. (2019) at VO_2 maks kan variere gjennom dagen for idrettsutøvere. Så her strider studiens funn med forskningen. Dette kan tyde på at døgnvariasjonen i VO_2 maks kan variere mellom studier og individer.

En viktig begrensning i dette prosjektet var at hver deltaker kun gjennomførte én morgen- og én kveldstest. Det er derfor vanskelig å avgjøre om en eventuell forskjell i VO_2 maks skyldes tidspunkt på døgnet eller dag-til-dag-variasjon. Flere målinger på hvert tidspunkt ville gitt et bedre grunnlag for å vurdere om forskjeller faktisk skyldes tidspunktet på dagen, men dette var ikke praktisk mulig å gjennomføre i dette miniprojektet.

En annen begrensende faktor er studiens utvalgsstørrelse. Det var kun seks deltakere som gjennomførte to tester hver. Dette utvalget gir begrenset statistisk styrke, og det er derfor mulig at en eventuell forskjell i VO_2 maks ikke ble oppdaget i denne studien. Resultatet $p = 0,580$ viser til ingen signifikant forskjell i dette utvalget, men gir ikke grunnlag for å konkludere med at det ikke finnes noe døgnvariasjon i VO_2 maks. Det var også individuelle forskjeller mellom deltakerne når det gjaldt forskjell i VO_2 maks mellom morgen og kveld. Dersom enkelte deltakere hadde høyere VO_2 maks om morgenen og andre høyere om kvelden, kan disse motsatt individuelle responsene redusere den gjennomsnittlige forskjellen på gruppenivå. Slik individuell variasjon er også funnet av Knaier et al. (2019). Det parrede testdesignet er en styrke ved studien, ettersom de samme deltakerne gjennomførte både morgen og kveldstest. Dette reduserte betydningen av stabile individuelle forskjeller fordi hver deltaker i praksis fungerte som sin egen kontroll.

Det ble ikke påvist noen statistisk signifikant forskjell i relativ VO_2 maks mellom morgen- og kveldstesting. Funnene indikerer med det at testtidspunktet ikke hadde avgjørende betydning, men det er viktig å bemerke at dette er gjeldende for denne studiens utvalg. Videre forskning med større utvalg kan bidra med en ytterligere avklaring med høyere statistisk styrke.

Referansliste

- Kang, J., Ratamess, N. A., Faigenbaum, A. D., Bush, J. A., Finnerty, C., DiFiore, M., Garcia, A., & Beller, N. (2023). Time-of-day effects of exercise on cardiorespiratory responses and endurance performance—A systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(10), 2080–2090.<https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004497>
- Knaier, R., Qian, J., Roth, R., Infanger, D., Notter, T., Wang, W., Cajochen, C., & Scheer, F. A. J. L. (2022). Diurnal variation in maximum endurance and maximum strength performance: A systematic review and meta-analysis. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 54(1), 169–180. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002773>
- Kusumoto, H., Ta, C., Brown, S. M., & Mulcahey, M. K. (2021). Factors contributing to diurnal variation in athletic performance and methods to reduce within-day performance variation: A systematic review. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(12S), S119–S135. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003758>

Vedlegg 1

Kildekoden til dette prosjektet finnes på: <https://github.com/MereteSL9/arbeidskrav-1.git>