

Line search. Matrix calculus.

Seminar

Optimization for ML. Faculty of Computer Science. HSE University

Theory recap. Differential

- Differential $df(x)[\cdot] : U \rightarrow V$ in point $x \in U$ for $f(\cdot) : U \rightarrow V$:

$$f(x+h) - f(x) = \underbrace{df(x)[h]}_{\text{differential}} + o(\|h\|)$$

$U \rightarrow V$	\mathbb{R}	\mathbb{R}^n	$\mathbb{R}^{n \times m}$
\mathbb{R}	$f'(x)dx$	$\nabla f(x)dx$	$\nabla f(x)dx$
\mathbb{R}^n	$\nabla f(x)^T dx$	$J(x)dx$	—
$\mathbb{R}^{n \times m}$	$tr(\nabla f(X)^T dX)$	—	—

Theory recap. Differential

- Differential $df(x)[\cdot] : U \rightarrow V$ in point $x \in U$ for $f(\cdot) : U \rightarrow V$:

$$f(x+h) - f(x) = \underbrace{df(x)[h]}_{\text{differential}} + \bar{o}(\|h\|)$$

- Canonical form of the differential:

$U \rightarrow V$	\mathbb{R}	\mathbb{R}^n	$\mathbb{R}^{n \times m}$
\mathbb{R}	$f'(x)dx$	$\nabla f(x)dx$	$\nabla f(x)dx$
\mathbb{R}^n	$\nabla f(x)^T dx$	$J(x)dx$	—
$\mathbb{R}^{n \times m}$	$tr(\nabla f(X)^T dX)$	—	—

Theory recap. Differentiation Rules

- Useful differentiation rules and standard derivatives:

Differentiation Rules

$$dA = 0$$

$$d(\alpha X) = \alpha(dX)$$

$$d(AXB) = A(dX)B$$

$$d(X + Y) = dX + dY$$

$$d(X^T) = (dX)^T$$

$$d(XY) = (dX)Y + X(dY)$$

$$d(\langle X, Y \rangle) = \langle dX, Y \rangle + \langle X, dY \rangle$$

$$d\left(\frac{X}{\phi}\right) = \frac{\phi dX - (d\phi)X}{\phi^2}$$

Standard Derivatives

$$d(\langle A, X \rangle) = \langle A, dX \rangle$$

$$d(\langle Ax, x \rangle) = \langle (A + A^T)x, dx \rangle$$

$$d(\text{Det}(X)) = \text{Det}(X) \langle X^{-T}, dX \rangle$$

$$d(X^{-1}) = -X^{-1}(dX)X^{-1}$$

Matrix Calculus. Problem 1

Example

Find $\nabla f(x)$, if $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x + c$.

Matrix Calculus. Problem 2

Example

Find $\nabla f(X)$, if $f(X) = \text{tr}(AX^{-1}B)$

- $h(x) = f(g(x)) \Rightarrow dh(x_0)[dx] = df(g(x_0))[dg(x_0)[dx]]$

Matrix Calculus. Problem 3

i Example

Find the gradient $\nabla f(x)$ and hessian $\nabla^2 f(x)$, if $f(x) = \frac{1}{3}\|x\|_2^3$

- $$d^2 f(x)[h_1, h_2] = d \left(df(x) \left[\underbrace{h_1}_{\text{fixed when take outer } d(\cdot)} \right] \right) [h_2]$$

Matrix Calculus. Problem 3

i Example

Find the gradient $\nabla f(x)$ and hessian $\nabla^2 f(x)$, if $f(x) = \frac{1}{3}\|x\|_2^3$

- $d^2 f(x)[h_1, h_2] = d \left(df(x) \left[\underbrace{h_1}_{\text{fixed when take outer } d(\cdot)} \right] \right) [h_2]$
- Canonic form for $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$: $d^2 f(x)[h_1, h_2] = h_1^T \underbrace{\nabla^2 f(x)}_{\text{hessian}} h_2$