HWS-H Regensburg, Anlage D 2.4 LBP (Stand: 26.03.2024) - Zusammenfassende Darstellung Bestand Fischfauna Regensburg (Datenquellen: Fachberatung für Fischerei 11/2021)

Fischart deutsch	*Fischart wissenschaftlich*	RL BY	V	RL D	BNat SchG	FFH-Anhang	Anzahl Individuen Donau Regensburg Fluss-km 2380,3 - 2381,4			Anzahl Individuen Donau Regensburg Fluss-km 2380,4(5;7) - 2381,4			Anz. Individ. Donau-Nordarm Fluss-km 2380,1 - 2381,6 u. Steinerne Brücke - Dultplatz			Anz. Individ. Donau-Nordarm	Anz. Individ. Donau-Oberwasser	Anz.I Individ. Donau-Unterwasser	Anz. Individ. Fischpass Regensburg	Gesamtzahl	*Sterlet Besatz Donau*	*Messstelle 9931 Donaustauf*	Laichzeit Fischarten	Schonzeit / Mindestmaße Bayern	Kurzinfos Fischarten
							30.07.2014 (BNGF)[1]	22.10.2014 (BNGF)[1]	03.08.2011 (BNGF)[2]	14.04.2010 (o.A.)[2]	12.08.2008 (o.A.)[2]	28.10.2008 (o.A.)[2]	14.04.2010 (o.A.)[2]	12.08.2008 (o.A.)[2]	27.10.2008 (o.A.)[2]	13.10.2015 (FW, AR, FFB)[1]	Winter 2010/11 (Ache)[1]	Winter 2010/11 (Ache)[1]	Apr.-Okt. 2012 (BGF)[3]		*Mai 2021 (DP)*	*Gesamtzahl 2014, 2016, 2018 (LfU 2019)*[1]	(LfU, LfV)	§ 11 AVBayFiG 2018	(LfU, LfV, BfN, WESO)
Aal	***Anguilla anguilla***	**3**		**2**	**b**		**124**	**43**	**293**	**115**	**152**	**150**	**14**	**65**	**90**		**34**	**115**	**73**	**1268**		***172***	**Spätwinter - Frühling (Sargassosee, Westatlantik)**	**-- 50 cm**	nachtaktiver Bodenfisch; Habitate: Fließ- und Stillgewässer aller Art; wandert zum Laichen in die Sargassosee (Westatlantik), nach 2-3 Jahren als Glasaale in Europa, Nordafrika wieder flussaufwärts ziehend
Aitel, Döbel	*Squalius cephalus*	*		*			1016	563	112	22	48	100	19	31	28	18	65	83	13	**2118**		*307*	April - Juni	--	Habitate: schnell strömende Fließgewässer aller Art; in der Jugend schwarmbildend in Ufernähe, später Einzelgänger im Freiwasser; Laichablage an Wasserpflanzen, Steinen oder Wurzeln; dient als Wirt der Bachmuschel
Bachforelle	***Salmo trutta forma fario***	**V**		*			**1**		**1**	**4**		**1**				**1**			**3**	**11**			**Okt. - Febr.**	**Jan. - Feb. 26 cm**	Leitart der Forellenregion; Habitate: klare, kühle, sauerstoffreiche Bäche, Flüsse, Bergseen; strukturreiche Wasserläufe mit Versteckmöglichkeiten; standorttreu; Ablaichen flussaufwärts auf stark überströmten, seichten Kiesbänken
Bachsaibling	*Salvelinus fontinalis*	nb		nb															1	**1**			Okt. - Dez.	Jan-Feb 20 cm	**Neozoe, potenziell invasiv**; Habitate: kalte, sauerstoffreiche, fließende und stehende Gewässer, weniger strukturreich, mit Einstandsmöglichkeiten; Kieslaicher
Barbe	***Barbus barbus***	*	**!**	*		**V**	**3**	**4**	**9**		**1**	**62**		**1**				**2**	**1**	**83**		***4***	**Mai - Juli**	**1. Mai - 15. Juni 40 cm**	geselliger Grundfisch klarer, sauerstoffreicher Mittelläufe mit Sand- oder Kiesgrund; Leitfisch Barbenregion; dämmerung- und nachaktiv; Ablaichen über flachen, überströmten Kiesbänken, Junglarven verdriften in flache Uferbereiche; Winterruhe in tieferen, ruhigeren Zonen
Bitterling	***Rhodeus amarus***	*		*		**II**													**1**	**1**		***52***	**April - Juni**	**ganzjährig**	gesellig lebend in flachen, stehenden oder langsam fließenden, sommerwarmen Gewässern mit Pflanzenwuchs (z.B. Altarme, verkrautete Weiher, Tümpel), sandigen Böden mit Mulmauflage; meidet tiefgründig verschlammte Gewässer; Ableichen ab 17 °C Wassertemperatur in Afteröffnung einer Fluss- oder Teichmuschel; schwimmfähige Jungfische verlassen die Muschel
Blaubandbärbling	*Pseudorasbora parva*	nb		nb																		3	Mitte März - Juni	--	**Neozoe, potenziell invasiv**; Herkunft: Ostasien; Habitat: besiedelt Flüsse, Seen, Staugewässer, Sandgruben, Fischteiche; meidet sommerkalte, schnell strömende Gewässer, kann sie aber durchwandern; Männchen bereitet zur Fortpflanzungszeit handtellergroße Laichareale durch Untergrundsäuberung vor
Brachse, Brasse, Blei	*Abramis brama*	*		*			1			1	4		1	4				2	9	**22**			Mai - Juni	--	Habitate: stehende, langsam fließende Unterläufe größerer Flüsse mit weichem Grund; Leitfisch Brachsenregion; bodenorientierter, gesellig lebender Fisch, nachts in seichten, weichen Uferbereichen nach Nahrung suchend; Laichzeit: Schwarmbildung, Eiablage an flachen, pflanzenreichen Uferstellen, Larven heften sich an Wasserpflanzen, Winterruhe an tiefen, geschützten Stellen im Schwarm
Donau-Kaulbarsch	*Gymnocephalus baloni*	G		*	s	II, IV					1				1					2			April - Mai	ganzjährig	Fisch der Barben- und Brachsenregion; endemische Art innerhalb der Gewässersysteme von Donau, Dnjestr und Dnjepr; versteckte Lebensweise; Habitate: harter Untergrund, moderate Strömung, strukturreich, Versteckplätze (z.B. Totholz); scheint Hauptstrom zu bevorzugen, zur Laichzeit, ggf. auch zum Überwintern, Aufsuchen strömungsberuhigter Nebenarme, Altwasser; Ablaichen durch oberflächliche Abgabe der Eier auf Steinen, Kies, Wasserpflanzen; Nahrung: benthische Makroinvertebraten; dämmerungs- und nachtaktiv; leichte Verwechslung mit Kaulbarsch, v.a. bei Jungfischen
Donau-Stromgründling (Weissflossengründling)	***Romanogobio vladykovi (Gobio albipinatus)***	**V**		*		**II**		**1**				**2**								**3**		***1***	**Mai - Juni**	**ganzjährig**	Habitate: langsam strömende, tiefere Bereiche des Flussbetts, weichgründige Altarme, Resttümpel von Überschwemmungsgebieten; sammelt sich an tiefen Gewässerstellen zu Schwärmen; Ablaichen auf gut durchströmten Kiesbänken; relativ unempfindlich gegenüber Gewässerverschmutzung
Dreist. Stichling	*Gasterosteus aculeatus*	*		*			2										5	3	8	**18**			März - Juli	--	marine Wanderformen ziehen zur Laichzeit ins Süßwasser, stationäre Formen bewohnen Tümpel, Altwasserarme, langsam fließende Gewässer; Ableichen in Nest aus Pflanzenmaterial, Brutpflege
Flussbarsch, Barsch	*Perca fluviatilis*	*		*			54	61	99	10	6	64	2	10	10	9	141	83	1093	**1642**		*441*	März - Juni	--	Habitate: stehende und fließende Gewässer, v.a. Stellen mit üppiger Vegetation; Eiablage an Wasserpflanzen und Wurzelwerk, Jungbarsche verweilen meist in Schwärmen am Grund, ältere leben räuberisch als Einzelgänger; sehr anpassungsfähig
Frauennerfling	***Rutilus virgo***	**3**		**3**		**II, V**	**1**	**2**								**5**			**2**	**10**		***10***	**April - Mai**	**März - Juni 30 cm**	Bodenfisch im strömenden Wasser der tiefen Flussbetten; laicht in strömungsberuhigten Uferzonen mit dichtem Pflanzenbewuchs (Eier an Pflanzen, Steinen haftend); Jungfische bleiben in geschützten Bereichen flacher Buchten und Altwässer
Giebel	*Carassius auratus gibelio*	*		*					2	1						1		3	13	**20**		*1*	Mai - Juli	--	Habitate: stehende und langsam fließende Gewässer mit dichter Vegetation, weichem Grund; gesellig, anspruchslos; stammt aus Ostasien, Sibirien; Rogner können sich durch Jungfernzeugung fortpflanzen

Fischart deutsch	*Fischart wissenschaftlich*	RL BY	V	RL D	BNat SchG	FFH-Anhang	Anzahl Individuen Donau Regensburg Fluss-km 2380,3 - 2381,4			Anzahl Individuen Donau Regensburg Fluss-km 2380,4(5;7) - 2381,4			Anz. Individ. Donau-Nordarm Fluss-km 2380,1 - 2381,6 u. Steinerne Brücke - Dultplatz			Anz. Individ. Donau-Nordarm	Anz. Individ. Donau-Oberwasser	Anz.I Individ. Donau-Unterwasser	Anz. Individ. Fischpass Regensburg	Gesamtzahl	*Sterlet Besatz Donau*	*Messstelle 9931 Donaustauf*	Laichzeit Fischarten	Schonzeit / Mindestmaße Bayern	Kurzinfos Fischarten
							30.07.2014 (BNGF)[1]	22.10.2014 (BNGF)[1]	03.08.2011 (BNGF)[2]	14.04.2010 (o.A.)[2]	12.08.2008 (o.A.)[2]	28.10.2008 (o.A.)[2]	14.04.2010 (o.A.)[2]	12.08.2008 (o.A.)[2]	27.10.2008 (o.A.)[2]	13.10.2015 (FW, AR, FFB)[1]	Winter 2010/11 (Ache)[1]	Winter 2010/11 (Ache)[1]	Apr.-Okt. 2012 (BGF)[3]		*Mai 2021 (DP)*	*Gesamtzahl 2014, 2016, 2018 (LfU 2019)* [1]	(LfU, LfV)	§ 11 AVBayFiG 2018	(LfU, LfV, BfN, WESO)
Gründling	***Gobio gobio***	*	!	*															**15**	**15**			**Mai - Juni**	--	schwarmbildender Grundfisch in klaren, stehenden und fließenden Gewässern mit sandigem, kiesigem Grund; Eiablage in flachen Bereichen an Steinen und Wasserpflanzen
Güster	***Blicca björkna***	V		*			**1**							**1**					**11**	**13**			**Mai - Juni**	--	Habitate: Seen, Altwässer, Stauräume, langsam fließende Flüsse und Bäche der Brachsenregion; lebt meist bodenorientiert in kleinenn Schwärmen, anspruchslos; Ablaichen in Schwärmen an seichten, pflanzenbestandenen Uferbereichen, an Wasserpflanzen; Winterruhe in tieferen Gewässerstellen
Hasel	*Leuciscus leuciscus*	*		*			61	29	5	1	1	2	1	1		2	3	2	10	**118**		*2*	März - Mai	--	Habitate: schnell strömende, kühle, saubere Wasserläufe der Barben- und Äschenregion; geselliger Oberflächenfisch; Ablaichen im Flachwasser an sandigen, kiesigen Stellen, Eier haften an Pflanzenteilen und Steinen
Hecht	*Esox lucius*	*		*			9	3	8	2	1	15	3	2	4		6	5		**58**		*2*	Febr. - Mai	15. Feb. - 15. Apr. 50 cm	Habitate: Ufergebiete langsam fließender und stehender Gewässer mit kiesigem Unterstand; standorttreuer Einzelgänger; Eiablage über seichten, pflanzenbestandenen Uferbereichen, überschwemmten Wiesen, Gräben
Huchen	***Hucho hucho***	**2**	**!!**	**2**		**II, V**														**0**			**März-Mai**	**15. Feb. - 31. Mai 90 cm**	Habitate: ganzjährig in stark-mäßig stömenden größeren Fließgewässern; kaltes klares, sauerstoffreiches Wasser mit tiefen Kolken als Versteck; gut durchströmte Kiesrücken und -bänke als Laichhabitat (meist in Seitengewässern); Nahrung: Nasen, Barben, Lauben
Karpfen	***Cyprinus carpio***	V		*				**1**											**1**	**2**		***1***	**Mai - Juli**	**-- 35 cm**	Habitate: stehende, langsam fließenden Gewässer (Altwässer, Teiche); bodenorientierter, scheuer Fisch, meist nachaktiv; Winterruhe an tiefern Stellen; Fortpflanzung bei Wassertemperaturen von 18-20 ° C, Eiablage in seichten, pflanzenbestanden Stellen; Larven haften an Wasserpflanzen
Kaulbarsch	*Gymnocephalus cernua*	*		*					1			1			1	1			84	**88**			März - Mai	--	Habitate: größere Fließgewässer der Barben- und Brachsenregion, aber auch stehende Gewässer, Brackwasser; geselliger Bodenfisch; Eiablage an flachen Uferstellen
Kesslergrundel	*Ponticola kessleri*	nb		nb			5	1	248	24	12	187			8	3	203	58		**749**		*59*	März - Mai	ganzjährig	**Neozoe, potenziell invasiv**; Habitate: Boden- und Uferzone der Küstengebiete und großen Zuflüsse des Schwarzen Meeres, strukturreiche Lebensräume; in Expansionsgebieten v.a. Blocksteinufer; Laich wird an Unterseite harter Strukturen angebracht; Nahrung: Mollusken, Insektenlarven, Krebse, kleine Fische
Laube, Ukelei	*Alburnus alburnus*	*		*			24824	604	619	655	n.e.		1315	n.e.		3	95	1041	3667	**32823**		*2352*	April - Juni	--	Habitate: langsam fließende und stehende Gewässer der Barben- und Brachsenregion; lebt im Schwarm meist in Ufernähe dicht unter der Wasseroberfläche (Insektenjagd); wichtiger Futterfisch für Raubfische; Ablaichen im flachen Uferbereich an Steinen, Wurzelwerk
Marmorierte Grundel	*Proterorhinus semilunaris*	*		nb				2	115								12	6		**135**		*61*	April - Mai	k.A.	**Neozoe, potenziell invasiv**; Habitate: Küsten des Schwarzen und Asow'schen Meeres, mündende Flusssystemen von Donau, Bug und Dnepr; besiedelt Gewässergrund größerer Flüsse und Seen, nutzt Lückenraum zwischen Steinen, Wurzeln und Wasserpflanzen; bevorzugt aber kleinere Flüsse des Tieflandes, v.a. schlammige Abschnitte mit reichem Pflanzenwuchs, Sümpfe und Tümpel
Nackthalsgrundel	*Neogobius gymnotrachelus*	nb		nb																		*97*	April - Juli	--	**Neozoe, potenziell invasiv**; Habitate:Herkunft aus dem Ponto-Kaspischen Faunenkreis; besiedelt neben Küstenreegionen auch Flussmündungen und Unterläufe größerer Fließgewässer; d.h. Brack- und Süßwasser geringer Salinität, bevorzugt sandiges, schlammiges Sohlsubstrat mit Versteckmöglichkeiten (Totholz, Makrophyten, Steine); in Espansionsgeboeten der oberen Donau lebt die Art nur vereinzelt im Bereich von Blocksteinufern; Ablaichen auf Unterseite von Hartteilen (Steine, Gehölz)
Nase	***Chondrostoma nasus***	**3**	**!**	**V**			**52**	**5**	**10**	**12**	**27**		**17**	**19**		**5**		**10**	**1**	**158**		***7***	**März - Mai**	**März - Apr. 30 cm**	Habitate: schnell fließende Gewässer der Barben- und Äschenregion, selten in Seen; bodennaher Schwarmfisch, schabt Nahrung von Steinen des Untergrundes ab; zieht zum Laichen in Schwärmen in Flussoberläufe, Ablaichen an sehr seichten, stark strömenden Stellen mit kiesigem bis grobsteinigem Grund
Nerfling, Aland	*Leuciscus idus*	*		*			209	54	13		16		1	21		27	11	5	19	**376**		*446*	März - Mai	-- 30 cm	Habitate: Unterläufe mittlerer und größerer Fließgewässer u. Seen; lebt in kleinen Schwärmen, hält sich v.a. nahe der Wasseroberfläche, z.T. in Grundnähe auf; Laichablage in Flussoberläufen auf Steinen oder Wasserpflanzen
Rotauge, Plötze	*Rutilus rutilus*	*		*			162	12	88	16	9	1	21	23	2	10	111	165	608	**1228**		*571*	April - Mai	--	Schwarmfisch stehender, langsam fließende Gewässer; anpassungsfähig; Ablaichen in Gruppen im Flachwasserbereich an Pflanzen, Wurzeln oder Steinen; wichtiger Futterfisch für Raubfische
Rotfeder	*Scardinius erythrophthalmus*	*		*				1												**1**			April - Mai	--	Schwarmfisch der stehenden oder langsam fließenden Gewässer mit Pflanzenbewuchs, bevorzugt Ufer- und Oberflächennähe; Laichablage an flachen, vegetationsreichen Stellen, Larven haften am Substrat

Fischart deutsch	*Fischart wissenschaftlich*	RL BY	V	RL D	BNat SchG	FFH-Anhang	Anzahl Individuen Donau Regensburg Fluss-km 2380,3 - 2381,4			Anzahl Individuen Donau Regensburg Fluss-km 2380,4(5;7) - 2381,4			Anz. Individ. Donau-Nordarm Fluss-km 2380,1 - 2381,6 u. Steinerne Brücke - Dultplatz			Anz. Individ. Donau-Nordarm	Anz. Individ. Donau-Oberwasser	Anz.I Individ. Donau-Unterwasser	Anz. Individ. Fischpass Regensburg	Gesamtzahl	*Sterlet Besatz Donau*	*Messstelle 9931 Donaustauf*	Laichzeit Fischarten	Schonzeit / Mindestmaße Bayern	Kurzinfos Fischarten
							30.07.2014 (BNGF)[1]	22.10.2014 (BNGF)[1]	03.08.2011 (BNGF)[2]	14.04.2010 (o.A.)[2]	12.08.2008 (o.A.)[2]	28.10.2008 (o.A.)[2]	14.04.2010 (o.A.)[2]	12.08.2008 (o.A.)[2]	27.10.2008 (o.A.)[2]	13.10.2015 (FW, AR, FFB)[1]	Winter 2010/11 (Ache)[1]	Winter 2010/11 (Ache)[1]	Apr.-Okt. 2012 (BGF)[3]		*Mai 2021 (DP)*	*Gesamtzahl 2014, 2016, 2018 (LfU 2019)*[1]	(LfU, LfV)	§ 11 AVBayFiG 2018	(LfU, LfV, BfN, WESO)
Rutte, Quappe	***Lota lota***	*		**V**			**10**	**6**	**21**	**6**	**10**	**15**	**3**	**7**	**7**		**2**	**8**	**1**	**96**		***6***	**November - März**	**-- 30 cm**	Habitate: kühle, klare, sauerstoffreiche Still- und Fließgewässer; dämmerungs- und nachtaktiv, v.a. in der kalten Jahrezeit, im Sommer z.T. längere Ruhephasen; laicht stromaufwärts über sandig-kiesigen Stellen ab
Schied, Rapfen	***Aspius aspius***	*		*		**II, V**	**48**	**3**	**5**	**1**	**3**		**4**		**2**		**2**	**1**	**8**	**77**		***88***	**April - Juni**	**Apr. - Mai 40 cm**	Habitate: strömungsreiche Abschnitte von Fließgewässern, Seen; Jungfische leben in Oberflächennähe, Ernährung von Kleintieren aller Art; im Alter Einzelgänger in uferfernen Freiwasserzonen, erbeutet Fische durch Attacken an der Oberfläche; Ablaichen in strömungsreichen, kiesigen Gewässerabschnitten, Jungfische werden durch die Strömung in ruhigere Wasserzonen verdriftet
Schleie	*Tinca tinca*	*		*											1				3	**4**		*2*	Mai - Juli	-- 26 cm	Habitate: stehende, langsam fließende Gewässer, Altarme, Stillgewässer mit schlammigem Untergrund und reichem Pflanzenbewuchts (Kraut- und Schilfzonen); dämmerungs-, nachtaktiv; Nahrungssuche am Boden (Bodentiere, Pflanzen); Laichablage an Wasserpflanzen; gesellig, anpassungsfähig; Winterruhe eingegraben im Schlamm
Schneider	***Albunoides bipunctatus***	*		**V**			**1**	**6**												**7**			**Mai - Juni**	**ganzjährig**	Habitate: klare, sauerstoffreiche Fließgewässer mit stärkerer Strömung; meist im Schwarm in Ufernähe anzutreffen; Ablaichen an seichten, überströmten Stellen mit kiesigem Grund, Eier haften fest an Substrat
Schrätzer	***Gymnocephalus schraetser***	**2**		**2**		**II, V**													**4**	**4**			**April - Mai**	**ganzjährig**	bodenlebender Fisch, bevorzugt mäßig strömende Bereiche mit sandig-kiesigem Grund; Aufenthalt in kleinen Gruppen an tiefsten Stellen des Gewässers; laicht im tiefen Wasser sauberer Kiesbänke
Streber	***Zingel streber***	**2**		**2**		**II**												**1**		**1**			**März - April**	**ganzjährig**	Habitate: tiefe Gewässerabschnitte mit schnell strömendem bis reißendem Wasser; nachaktiv, hält sich tagsüber unter Steinen u.ä. verborgen; Laichhabitat: flache, unverschlammte, stark überströmte Kiesbänke, Eiablage an Steinen im Uferbereich; hohe Ansprüche an Wasserqualität, O2-Gehalt, Schlammablagerungen werden gemieden
Schwarzmundgrundel	*Neogobius melanostomus*	nb		nb			981	1125	11371	345	9	74	34	5	19	23	1694	4263	283	**20226**		*19591*	Mai - September	k.A.	**Neozoe, invasiv**; Habitate: Boden- und Uferzone der Küstengebiete und großen Zuflüsse des Schwarzen Meeres, strukturreiche Lebensräume; in Expansionsgebieten v.a. Blocksteinufer; Laich wird an Unterseite harter Strukturen angebracht; Nahrung: Mollusken, Bodentiere, Fischlaich
Sonnenbarsch	*Lepomis gibbosus*	nb		nb																		*2*	April - Juni	--	**Neozoe, potenziell invasiv;** Herkunft: östliches Nordamerika; Habitat: kleine, flache Seen und Tümpel, aber auch ruhige, dicht bewachsene Uferzonen von Flüssen und größeren Seen; klares Wasser; Ablaichen in Laichmulden in Ufernähe, Brutpflege
Wels, Waller	*Silurus glanis*	*		*			7	10	20	9	12	21		4	7		6	22		**118**		*9*	April - Juni	--	Habitate: tiefere stehende und langsam fließende Gewässer, v.a. trübe nicht zu kalte Gewässer mit weichem Grund; dämmerungs-, nachaktiver einzelgängerischer Raubfisch; Winterruhe an tiefen Stellen, oft im Schlamm eingegraben; Laichablage in nestähnlichen Mulden im pflanzenbestandenen Uferbereich; Nahrung: Fische, kleine Säugetiere, Amphibien, z.T. Wasservögel
Zährte, Rußnase	***Vimba vimba***	**V**		**3**			**240**	**11**	**4**				**1**		**1**			**2**		**259**		***47***	**Mai - Juli**	**--**	bodennaher Schwarmfisch mit verschiedenen Rassen; Vorkommen im Mittel-, Unterlauf größerer Flüsse, auch Seen; stationäre und wandernde Populationen; zur Laichzeit Wanderung flussaufwärts, Eiablage über flachem, steinig-kiesigem Grund auch an pflanzenbestandenen Stellen
Zander	*Sander lucioperca*	*		*			12	3	14					2			6		10	**47**		*17*	April - Juni	15. März - 30. Apr. 50 cm	Habitate: größere, tiefe, planktontrübe stehende oder fließende Gewässer mit festem Grund; Ablaichen in Nestgruben (z.B. Wurzeln, versunkene Äste), Brutpflege
Zingel	***Zingel zingel***	**2**		**2**		**II, V**		**2**	**2**	**1**					**1**				**2**	**8**			**März - Mai**	**ganzjährig**	Bodenfisch, nachaktiv; Habitate: strömungsreiche, relativ flache Gewässerabschnitte; Ablaichen an stark überströmten flachen Kiesbänken, die einer dynamischen Veränderung unterliegen
Zobel	***Ballerus sapa***	**3**		*															**99**	**99**			**April - Mai**	**--**	Habitate: untere Fließgewässerabschnitte der Barben- und Brachsenregion; stehende, langsam fließende Gewässer und Brackwasser; Ablaichen in schnell strömenden Abschnitten des Hauptstroms mit steinigem, sedimentfreiem Flussbett, an Steinen, Wasserpflanzen; gesellig, Nahrungssuche am Boden; lebt v.a. in der Donau, im Rhein

Fischart deutsch	*Fischart wissenschaftlich*	RL BY	V	RL D	BNat SchG	FFH-An-hang	Anzahl Individuen Donau Regensburg Fluss-km 2380,3 - 2381,4			Anzahl Individuen Donau Regensburg Fluss-km 2380,4(5;7) - 2381,4			Anz. Individ. Donau-Nordarm Fluss-km 2380,1 - 2381,6 u. Steinerne Brücke - Dultplatz			Anz. Individ. Donau-Nordarm	Anz. Individ. Donau-Oberwasser	Anz.I Individ. Donau-Unterwasser	Anz. Individ. Fischpass Regensburg	Gesamt-zahl	*Sterlet Besatz Donau*	*Messstelle 9931 Donaustauf*	Laichzeit Fischarten	Schonzeit / Mindestmaße Bayern	Kurzinfos Fischarten
							30.07.2014 (BNGF)[1]	22.10.2014 (BNGF)[1]	03.08.2011 (BNGF)[2]	14.04.2010 (o.A.)[2]	12.08.2008 (o.A.)[2]	28.10.2008 (o.A.)[2]	14.04.2010 (o.A.)[2]	12.08.2008 (o.A.)[2]	27.10.2008 (o.A.)[2]	13.10.2015 (FW, AR, FFB)[1]	Winter 2010/11 (Ache)[1]	Winter 2010/11 (Ache)[1]	Apr.-Okt. 2012 (BGF)[3]		*Mai 2021 (DP)*	*Gesamtzahl 2014, 2016, 2018 (LfU 2019)[1]*	(LfU, LfV)	§ 11 AVBayFiG 2018	(LfU, LfV, BfN, WESO)
Sterlet (Besatz)	**Acipenser ruthenus**	**1**		**1**	**b**	**V**				**2010: k.A.**			**2010: k.A.**								**6000**		**April - Juni**	**ganzjährig**	Familie: Störe; lebt in Flüssen Nordrusslands, welche ins Kaspische-, das Asowsche- und das Schwarze-, Weiße Meer und die Karasee münden; bevorzugt schnell fließendes Wasser; durch Gewässerverschmutzung und -verbauung ist Rückkehr zu Laichplätzen verhindert, zudem auch durch Überfischung vom Aussterben bedroht; daher Besatzmaßnahmen in vielen Ländern durchgeführt (hier: Regensburg, Donau-Arme unterhalb Staustufe); Ablaichen in Flussoberläufen bei Niedrigwasser und Wassertemperaturen von ca. 12-17 ° C auf kiesigen Untergründen in Wassertiefen von 2-15 m, Strömungsgeschwindigkeit von 1,5 - 4 m/s; Larven verweilen in ruhigen Flachwasserzonen, in die sie nach dem Schlüpfen mit der Strömung verdriftet werden
Beifang										n.e.	1 Donau-Kaulbarsch	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.										
Gesamtergebnis							**27824**	**2552**	**13060**	**1225**	**312**	**695**	**1436**	**196**	**182**	**108**	**2396**	**5880**	**6043**	**61909**	***6000***				

Fett = i.R. der Eingriffsregelung zu untersuchende Art, d.h. Art mit besonderem Status (außer FFH-RL Anhang IV-Arten): Schutz nach BNatSchG, FFH-RL Anhang II, V (Bayerische Referenartenliste 11/2020), Rote Liste Status, Verantwortungsart
grau = der Huchen wurde bei den vorliegenden Untersuchungen nicht nachgewiesen, ist aber eine potenziell im PA 5 und Umgebung vorkommende Art

Farblich hinterlegt:

--

Art gem. Anhang IV FFH-Richtlinie, einzige saP-relevante Fischart >> Einzelartbetrachtung siehe dort
Besatz Sterlet im Mai 2021 in die Donauarme unterhalb der Staustufe; Beifang (n.e. = nicht eingetragen)
Laichzeiten: Frühjahrslaicher; laichen in Übergangszeit (Winter-Frühjahr; Frühjahr-Herbst); Winterlaicher
Schonzeiten: teil des Jahres/Mindestmaß; ganzjährig; keine Schonzeiten

Befischungsmethode:
[1] Methode: Elektrobefischung [3] Methode: Reusenbefischung
[2] Methode: keine Angabe, k.A.

RL BY - Rote Liste Bayern Fische und Rundmäuler 2021; RL D - Rote Liste Deutschland Fische und Neunaugen 2009
0 - ausgestorben, verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R - extrem selten, V - Vorwarnliste, D - Daten unzureichend, * ungefährdet, nB - nicht bewertet, k.A. - keine Angabe, nicht aufgeführt

Schutzstatus nach BNatSchG
b - besonders geschützt, s - streng geschützt

V - Verantwortungsart (nach Gruttke et al. 2004), übernommen von RL D in die RL BY
!! - in besonders hohem Maße verantwortlich, ! - in hohem Maße verantwortlich, (!) - in besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich, [leer] - allgemeine Verantwortlichkeit oder bisher keine besondere Verantwortlichkeit festgestellt

Datenquellen Bestand Fischfauna:
BNFG - Büro für Naturschutz- Gewässer- und Fischereifragen (2014): Fangergebnisse der Elektrobefischungen in der Donau bezüglich Kühlwassereinleitung des Kraftwerks Irsching. Donau Regensburg - Flusskilometer 2380,3 - 2381,4.
BNFG - Büro für Naturschutz- Gewässer- und Fischereifragen (2011): Befischung Donau Regensburg - Flusskilometer 2380,3 - 2381,4.
FW - Fischereigenossenschaft Winzer, AR - Anglerbund Regensburg, FFB - Fachberatung für Fischerei (2015): Funktionskontrolle der ökologischen Umgestaltung des Donau-Nordarms. Befischungsstrecke ca. 50 m und punktuell.
BGF - Büro für Gewässerökologie und Fischbiologie (2012): Kurzzusammenfassung Fischpassuntersuchung Regensburg. Reusenbefischung von April - Oktober (Beprobung von 67 vollständigen 24 Stundenzyklen).
Ache, M. (2011): Vorläufige Ergebnisse der Elektrobefischung im Rahmen des Projektes 109 des LFV Bayern e.V. Gesamtzahl Fische in je 15 untersuchten Abschnitten von 200 m Länge des Donau-Oberwassers und des Donau-Unterwassers. Naab und Regen sind hier nicht dargestellt.
o.A. (2010): Einzelstreckenbefischung Regensburg 2010: Einzelstreckenbefischung Regensburg am 14.04.2010. Strecke 1 und 4: Donau Fluss-Kilometer 2380,4 - 2381,4. Strecke 2: Donau-Nordarm Steinerne Brücke bis Dultplatz, Strecke 3: Fluss-Kilometer 2380,1 - 2380,6.
o.A. (2008): Einzelstreckenbefischung Regensburg 2008: Einzelstreckenbefischungen Regensburg am 12.08.2008, 27.-28.10.2008. Strecke 1 (links) und 4 (rechts): Donau Fluss-Kilometer 2380,4(5 oder 7) - 2381,4. Strecke 2: Donau-Nordarm Steinerne Brücke bis Dultplatz, Strecke 3: Fluss-Kilometer 2380,1 - 2380,6.
DP Donaupost (30.05.2001): Bezirk setzt 6000 Jungstöre in die Donau ein. Besatz der Donauarme in Regensburg unterhalb der Staustufe durch Fischexperten der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberpfalz.
LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2019): Plausibilisierungsbericht zur fischökologischen Bewertung nach WRRL im FWK 1_F348. Stammdaten Messstrecke 9931, Brücke Donaustauf, Mitte. Stand: 15.11.2019.

Informationen zu Fischarten:
AVBayFiG - Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2004 (GVBl. S. 177, 178, ber. S. 270) BayRS 793-3-L, zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Juli 2018 (GVBl. S. 633).
LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2020): Bayerische Referenzliste der Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie, Stand: 11/2020. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/ffh/tier_pflanzenarten/doc/referenzliste_ii_iv_v_ffh_arten.pdf, Abruf am 11.01.2022.
LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2022): Arteninformation Donau-Kaulbarsch. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Gymnocephalus+baloni, Abruf am 11.01.2022.
LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2012): NATURA 2000 - Tier- und Pflanzenarten: Fische und Rundmäuler.
BfN – Bundesamt für Naturschutz [Hrsg.] (2016): FFH-VP-Info: Fachinformationssystem zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, Stand "02. Dezember 2016". Wirkfaktoren, Empfindlichkeiten, Auswirkungen. Elektronisch veröffentlicht unter URL: www.ffh-vp-info.de, Abruf im Januar 2022.
BfN – Bundesamt für Naturschutz [Hrsg.] (2022): Arten-Handbuch Fische. Portraits wichtiger invasiver und potenziell invasiver Fische. Elektronisch veröffentlicht unter URL: https://neobiota.bfn.de/handbuch/fische.html, Abruf am 11.01.2022.
LFV - Landesfischreiverband Bayern (2022): Fischartenlexikon. Fische bayerischer Gewässer. Elektronisch veröffentlicht unter URL: https://lfvbayern.de/fischen/angelfischerei/fischlexikon, Abruf am 11.01.2022.
WESO GmbH (2022): Fischlexikon.eu. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.fischlexikon.eu/fischlexikon/index.php, Abruf am 11.10.2022.