Anlage F 5.5

Hochwasserschutz Regensburg
Unterer Wöhrd

Untersuchung von drei Bäumen mit Mulmhöhlen auf Vorkommen von Eremit und Potentialabschätzung für weitere totholzbewohnende Käferarten der FFH Anhang IV Liste

Büro für Ornitho-Ökologie
Dr. Richard Schlemmer
Proskestr. 5, 93059 Regensburg
Tel.: 0941 / 58 65 45

Bearbeiter:
Dr. Richard Schlemmer (Dipl.-Biol.)
Thomas Hörbrand (Dipl.-Biol.)

im Auftrag des
Wasserwirtschaftsamts Regensburg
Landshuter Str. 59
93053 Regensburg

1. Februar 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Anlass und Aufgabenstellung **1**

2 Ökologie des Ermitenkäfers **1**

3 Methodik **2**

4. Ergebnisse **2**

Zusammenfassung **4**

Literaturverzeichnis **5**

1 Anlass und Aufgabenstellung

In den Bäumen Nr. 409, 413 und 39 am Unteren Wöhrd in Regensburg wurden Mulmhöhlen festgestellt. Da es sich um Laubbäume handelt, konnte ein Vorkommen des Eremiten nicht ausgeschossen werden. In der vorliegenden Untersuchung soll das Vorkommen des Eremiten in diesen Höhlen geprüft werden. Zusätzlich soll eine Potentialanalyse für totholzbewohnende Käferarten der FFH-Anhang IV Liste gemacht werden.

2 Ökologie des Ermitenkäfers

Der Eremit oder Juchtenkäfer (*Osmoderma eremita*) ist ein 24–30 mm großer Käfer aus der Gruppe der Blatthornkäfer (*Scarabaeidae*). Hinsichtlich seiner Gestalt erinnert er stark an Rosenkäfer, mit denen er nahe verwandt ist. Die Tiere riechen nach Juchtenleder.

Der Eremit ist im gesamten Lebenszyklus auf sehr alte Bäume mit Mulmhöhlen angewiesen. Er bevorzugt einzeln stehende Bäume, besonders Laubbäume wie Eichen, Linden, Weiden oder Buchen mit dickem Stamm. Aber auch Eschen, Kastanien oder Walnussbäume besiedelt der Käfer. REITER (1909) nennt Linde und Weide, SCHAFFRATH (2003) alte Eichen als bevorzugte Bäume. Entscheidend für die Besiedelung ist ein mäßig, aber ausreichend feuchter Holzmulmkörper im Inneren des Stammes, der sich erst in entsprechend alten und mächtigen Bäumen mit adäquatem Stammdurchmesser bilden kann.

Der Eremit ist ein Sommertier und wird in der Regel im Juli und August gefunden. Nachweise von Imagines sind aber ab Mai/Juni bis in den Oktober hinein möglich. Im Mulm erfolgt die Paarung, woran sich die Eiablage anschließt. Die Individualentwicklung dauert in unseren Breiten drei bis vier Jahre. Nachdem drei Larvenstadien durchlaufen sind, erfolgt im Spätsommer die Verpuppung, die nach der Überwinterung als Vorpuppe innerhalb eines Kokons erst im Folgefrühjahr abgeschlossen wird (SCHAFFRATH 2003).

Ausgehend von alten Brutbäumen mit großen Baumhöhlen, die als Reservoir- bzw. Spenderbäume fungieren, können in der Nachbarschaft auch Bäume mit kleineren Höhlen besiedelt werden, die auch als „Satellitenbäume“ bezeichnet werden. Nach STEGNER (2009) sind die Käfer in einem Baum als lokale Population anzusehen. Sind in unmittelbarer Nachbarschaft weitere Bäume besiedelt gilt die Population jedes einzelnen Baumes als Metapopulation. Aufgrund der

schwachen Ausbreitungstendenz und der geringen Mobilität der Eremitenkäfer werden alle besiedelten Bäume, die nicht weiter als 500m voneinander entfernt sind, zu einem Bestand zusammengefasst.

3 Methodik

Die Untersuchung der Bäume und Mulmprobenentnahme wurde am 28.1.2022 durchgeführt. Mit Hilfe eines Akkustaubsauger mit Schlauch wurde Mulm aus den Höhlen gesaugt und anschließend makroskopisch mit einem Binokular bei 10 – 20-facher Vergrößerung auf Chitinreste und Kotpillen des Eremitenkäfers untersucht. Zudem wurde am Stammfuß und in Wurzelnischen nach Mulm und Kotpillen gesucht.

4. Ergebnisse

Baum 409

Eine alte Kastanie (BHD 80cm) zwischen Strasse und Gehweg. In 3 Meter Höhe befindet sich donauseitig eine ausgeprägte Auslochfaulung mit dreifach verzweigter Höhle, die sich bis in den Zentralstamm fortsetzt. Die Tiefe der Höhle wurde durch Sondierung mit etwa 60cm bestimmt. Aus der Höhle wurde ca. 1 Liter dunkler und feuchter Mulm entnommen. Bei der Untersuchung wurden keine Spuren (Chitinreste, Kotpillen) des Eremitenkäfers gefunden. Die Konsistenz des Mulms und die Grösse der Höhle erscheinen jedoch für eine Besiedelung mit Eremitenkäfer potentiell geeignet. Ein Potential für die Besiedelung mit weiteren Käfern der FFH Anhangsliste IV ist nicht gegeben.

Baum 409: Kastanie links Mulmprobe, rechts Baumhöhle mit Mulm

Baum 413

Eine alte Kastanie (BHD 70cm) zwischen Strasse und Gehweg mit einer südseitgen Auslochfaulung in 3,20 Meter Höhe, ca. 30x40cm. Die Astlochfaulung war zur Zeit der Begutachtung mit Wasser gefüllt und ist deshalb nicht für eine Besiedelung mit dem Eremitenkäfer geeignet. Die Baumhöhle besitzt aufgrund des stehenden Wassers kein Potential für Eremitenkäfer oder weitere Totholzkäfer der FFH Anhangsliste IV.

Baum 413 Kastanie mit wassergefüllter Baumhöhle

Baum 39

Der Apfelbaum (BHD 55cm) in einem bestehenden Obstgarten hat in 2,50 Metern Höhe durch Hauptstammbruch eine Baumhöhle die sich im Zentralstamm senkrecht bis zum Boden fortsetzt. Oben hat die Höhle eine nicht regengeschützte Öffnung von ca. 20x20cm und eine Tiefe von 60cm. Der gesamte Stamm ist aber bis zum Boden durchgefault und hat in ca. 20cm über dem Boden eine 10x15cm Öffnung aus der Mulm austritt. Sowohl aus der oberen und unteren Öffnung, als auch vom Boden konnte Mulm entnommen werden. Es wurden im Mulm keine Hinweise auf den Eremitenkäfer gefunden. Da fast der gesamte zentrale Stamm von der oberen Öffnung bis zum Stammgrund durchgefault ist, bietet der Baum kein Potential mehr für eine Besiedelung durch den Eremitenkäfer.

Baum 039 Apfelbaum

Baum 039 Links: Mulmprobe untere Höhlenöffnung, rechts: Mulmprobe obere Höhlenöffnung

Zusammenfassung

An den drei untersuchten Bäumen auf dem Unteren Wöhrd in Regensburg wurden keine direkten Besiedelungsspuren, Larven oder Imagines des Eremitens (*Osmoderma eremita*) gefunden. Hinweise auf andere totholzbewohnende Käferarten der FFH-Anhang IV Liste wurden nicht gefunden. Nur der Baum 409 bietet aufgrund seiner ausgeprägten Mulmhöhle und Größe Potential für eine Besiedelung mit dem Eremitenkäfer.

Literaturverzeichnis

SCHAFFRATH, U. (2003): Zur Lebensweise, Verbreitung und Gefährdung von *Osmoderma eremita* (Scopoli, 1793) (Coleptera; Scarabaeoidea, Cetoniidae, Trichiinae). Philippia 10/3 S. 157-248.

STEGNER, U. (2009): Der Juchtenkäfer (*Osmoderma eremita*): eine prioritäre Art der FFH-Richtlinie ; Handreichung für Naturschutz und Landschaftsplanung. Vidusmedia.