

Step	Algorithm: $B = LB$
1a	$\{B = \hat{B}$ <span style="float: right;">}</span>
4	$L \rightarrow \left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p style="text-align: center;">where <math>L_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>B_B</math> has 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(L_{BR}) < m(L)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge m(L_{BR}) < m(L) \right\}$
5a	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ <p style="text-align: center;">where <math>\lambda_{11}</math> is <math>1 \times 1</math>, <math>b_1</math> has 1 row</p>
6	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_0 \\ \hline \hat{b}_1^T \\ \hline L_{22} \hat{B}_2 \end{array} \right) \right\}$
8	$B_2 := l_{21} b_1^T$ $b_1^T := \lambda_{11} b_1^T$
7	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_0 \\ \hline \lambda_{11} \hat{b}_1^T \\ \hline l_{21} b_1^T + L_{22} \hat{B}_2 \end{array} \right) \right\}$
5b	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{cc c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge \neg(m(L_{BR}) < m(L)) \right\}$
1b	$\{B = L\hat{B}$ <span style="float: right;">}</span>



Step	Algorithm: $B = LB$
1a	$\{B = \hat{B}\}$
4	where
2	{
3	while do
2,3	{ $\wedge$ }
5a	where
6	{
8	
7	{
5b	
2	{
	endwhile
2,3	{ $\wedge \neg($ ) }
1b	$\{B = L\hat{B}\}$

Step	Algorithm: $B = LB$
1a	$\{B = \hat{B}$
4	
	where
2	$\left\{ \left( \frac{B_T}{B_B} \right) = \left( \frac{\hat{B}_T}{L_{BR}\hat{B}_B} \right) \right\}$
3	while do
2,3	$\left\{ \left( \frac{B_T}{B_B} \right) = \left( \frac{\hat{B}_T}{L_{BR}\hat{B}_B} \right) \wedge \right.$
5a	
	where
6	$\left\{ \right.$
8	
7	$\left\{ \right.$
5b	
2	$\left\{ \left( \frac{B_T}{B_B} \right) = \left( \frac{\hat{B}_T}{L_{BR}\hat{B}_B} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \frac{B_T}{B_B} \right) = \left( \frac{\hat{B}_T}{L_{BR}\hat{B}_B} \right) \wedge \neg( \quad ) \right\}$
1b	$\{B = L\hat{B}$

Step	Algorithm: $B = LB$
1a	$\{B = \hat{B}$
4	
	where
2	$\left\{ \left( \frac{B_T}{B_B} \right) = \left( \frac{\hat{B}_T}{L_{BR}\hat{B}_B} \right) \right\}$
3	while $m(L_{BR}) < m(L)$ do
2,3	$\left\{ \left( \frac{B_T}{B_B} \right) = \left( \frac{\hat{B}_T}{L_{BR}\hat{B}_B} \right) \wedge m(L_{BR}) < m(L) \right\}$
5a	
	where
6	$\left\{ \right.$
8	
7	$\left\{ \right.$
5b	
2	$\left\{ \left( \frac{B_T}{B_B} \right) = \left( \frac{\hat{B}_T}{L_{BR}\hat{B}_B} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \frac{B_T}{B_B} \right) = \left( \frac{\hat{B}_T}{L_{BR}\hat{B}_B} \right) \wedge \neg(m(L_{BR}) < m(L)) \right\}$
1b	$\{B = L\hat{B}$

Step	Algorithm: $B = LB$
1a	$\{B = \hat{B}$
4	$L \rightarrow \left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>L_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>B_B</math> has 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(L_{BR}) < m(L)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge m(L_{BR}) < m(L) \right\}$
5a	where
6	$\left\{ \right\}$
8	
7	$\left\{ \right\}$
5b	
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge \neg(m(L_{BR}) < m(L)) \right\}$
1b	$\{B = L\hat{B}$

Step	Algorithm: $B = LB$
1a	$\{B = \hat{B}$
4	$L \rightarrow \left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>L_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>B_B</math> has 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(L_{BR}) < m(L)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge m(L_{BR}) < m(L) \right\}$
5a	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c c c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ <p>where <math>\lambda_{11}</math> is <math>1 \times 1</math>, <math>b_1</math> has 1 row</p>
6	$\left\{ \right\}$
8	
7	$\left\{ \right\}$
5b	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c c c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge \neg(m(L_{BR}) < m(L)) \right\}$
1b	$\{B = L\hat{B}$

Step	Algorithm: $B = LB$
1a	$\{B = \hat{B}$
4	$L \rightarrow \left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>L_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>B_B</math> has 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(L_{BR}) < m(L)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge m(L_{BR}) < m(L) \right\}$
5a	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ <p>where <math>\lambda_{11}</math> is <math>1 \times 1</math>, <math>b_1</math> has 1 row</p>
6	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_0 \\ \hline \hat{b}_1^T \\ \hline L_{22} \hat{B}_2 \end{array} \right) \right\}$
8	
7	$\left\{ \right\}$
5b	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{cc c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge \neg(m(L_{BR}) < m(L)) \right\}$
1b	$\{B = L\hat{B}$



Step	Algorithm: $B = LB$
1a	$\{B = \hat{B}$
4	$L \rightarrow \left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>L_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>B_B</math> has 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(L_{BR}) < m(L)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge m(L_{BR}) < m(L) \right\}$
5a	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c c c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ <p>where <math>\lambda_{11}</math> is <math>1 \times 1</math>, <math>b_1</math> has 1 row</p>
6	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_0 \\ \hline \hat{b}_1^T \\ \hline L_{22} \hat{B}_2 \end{array} \right) \right\}$
8	
7	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_0 \\ \hline \lambda_{11} \hat{b}_1^T \\ \hline l_{21} b_1^T + L_{22} \hat{B}_2 \end{array} \right) \right\}$
5b	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c c c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge \neg(m(L_{BR}) < m(L)) \right\}$
1b	$\{B = L\hat{B}$

Step	Algorithm: $B = LB$
1a	$\{B = \hat{B}$ }
4	$L \rightarrow \left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>L_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>B_B</math> has 0 rows</p>
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
3	while $m(L_{BR}) < m(L)$ do
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge m(L_{BR}) < m(L) \right\}$
5a	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c c c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ <p>where <math>\lambda_{11}</math> is <math>1 \times 1</math>, <math>b_1</math> has 1 row</p>
6	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_0 \\ \hline \hat{b}_1^T \\ \hline L_{22} \hat{B}_2 \end{array} \right) \right\}$
8	$B_2 := l_{21} b_1^T$ $b_1^T := \lambda_{11} b_1^T$
7	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_0 \\ \hline \lambda_{11} \hat{b}_1^T \\ \hline l_{21} b_1^T + L_{22} \hat{B}_2 \end{array} \right) \right\}$
5b	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c c c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
2	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \right\}$
	endwhile
2,3	$\left\{ \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \hat{B}_T \\ \hline L_{BR} \hat{B}_B \end{array} \right) \wedge \neg(m(L_{BR}) < m(L)) \right\}$
1b	$\{B = L\hat{B}$ }

	Algorithm: $B = LB$
	$L \rightarrow \left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$ <p>where <math>L_{BR}</math> is <math>0 \times 0</math>, <math>B_B</math> has 0 rows</p>
	while $m(L_{BR}) < m(L)$ do
	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$ <p>where <math>\lambda_{11}</math> is <math>1 \times 1</math>, <math>b_1</math> has 1 row</p>
	$B_2 := l_{21}b_1^T$ $b_1^T := \lambda_{11}b_1^T$
	$\left( \begin{array}{c c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{cc c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$
	endwhile

Algorithm:  $B = LB$

$$L \rightarrow \left( \begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right), B \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right)$$

where  $L_{BR}$  is  $0 \times 0$ ,  $B_B$  has 0 rows

while  $m(L_{BR}) < m(L)$  do

$$\left( \begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cc|c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$$

where  $\lambda_{11}$  is  $1 \times 1$ ,  $b_1$  has 1 row

$$B_2 := l_{21} b_1^T$$

$$b_1^T := \lambda_{11} b_1^T$$

$$\left( \begin{array}{c|c} L_{TL} & L_{TR} \\ \hline L_{BL} & L_{BR} \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{cc|c} L_{00} & l_{01} & L_{02} \\ \hline l_{10}^T & \lambda_{11} & l_{12}^T \\ \hline L_{20} & l_{21} & L_{22} \end{array} \right), \left( \begin{array}{c} B_T \\ \hline B_B \end{array} \right) \leftarrow \left( \begin{array}{c} B_0 \\ \hline b_1^T \\ \hline B_2 \end{array} \right)$$

endwhile