Πρόβλημα 2



Μέγιστο κλάδεμα:

Ο κόμβος MIN1 θα εξεταστεί πλήρως με τιμή $\min(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots) = X$
Άρα η ρίζα θα είναι $[X, +\infty]$.
Μετά θα εξεταστεί ο MIN2. Αν $\beta_1 < X$, θα γίνει κλάδεμα.
Ομοίως για MIN3, MIN4 κ.ο.κ.

Άρα πρέπει $\beta_1, \gamma_1, \delta_1, \dots < \min(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots)$

Ελάχιστο κλάδεμα:

Για αρχή πρέπει να μην κλαδευτεί ο MIN2. Άρα $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots > X$.
Όμως τότε για την ρίζα θα ισχύει η νέα τιμή $\min(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots)$
Μετά δεν θα πρέπει να κλαδευτεί ο MIN3, κ.ο.κ.

Άρα τελικά πρέπει $\min(n_1, n_2, n_3, \dots, n_m) > \min(n\text{-}1_1, n\text{-}1_2, n\text{-}1_3, \dots n\text{-}1_m)$,
$\min(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots \alpha_m)$.

Σαρώθηκε με το CamScanner

Πρόβλημα 3

α+β)



γ)



Σαρώθηκε με το CamScanner



Σαρώθηκε με το CamScanner