אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

4 - שילוב אותיות ומספרים (חד-איברים)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פשטו:

$$3x^2 \cdot 4x^3 =$$

תרגיל 2

פשטו:

$$5a \cdot 2a^4 =$$

תרגיל 3

פשטו:

$$\frac{12x^6}{4x^2} =$$

תרגיל 4

פשטו:

$$\frac{15a^7}{3a^3} =$$

תרגיל 5

פשטו:

$$2x^3 \cdot 3x^2 \cdot x =$$

תרגיל 6

פשטו:

$$\frac{8a^5}{2a} =$$

תרגיל 7

פשטו:

$$(-2x^3)(5x^2) =$$

תרגיל 8

פשטו:

$$\frac{-6a^4}{3a^2} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פשטו:

$$4x^2y \cdot 3xy^3 =$$

תרגיל 10

פשטו:

$$\frac{10a^3b^4}{2ab^2} =$$

תרגיל 11

פשטו:

$$(-2a^3)(5a^4) =$$

תרגיל 12

פשטו:

$$\frac{-15x^9}{3x^4} =$$

תרגיל 13

פשטו:

$$(-3xy^2)(4x^2y) =$$

תרגיל 14

פשטו:

$$\frac{-20a^4b^3}{-4a^2b} =$$

תרגיל 15

פשטו:

$$2x^{-1} \cdot 3x^4 =$$

תרגיל 16

פשטו:

$$\frac{6a^5 \cdot 2a^{-2}}{4a^0} =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו ($a \neq 0$):

$$\frac{(3a^2)(2a^{n+1})}{6a^n} =$$

תרגיל 18

פשטו ($x \neq 0$):

$$\frac{4x^{2n} \cdot x^{n+2}}{2x^{3n-1}} =$$

תרגיל 19

פשטו ($x \neq 0$):

$$\frac{(-2x^3)(-3x^{-1})(x^2)}{6x^{-2}} =$$

תרגיל 20

פשטו ($a, b \neq 0$):

$$\frac{3a^4b^{-2} \cdot 4a^{-1}b^3}{6a^2b} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$12x^5$
תשובה 2	$10a^5$
תשובה 3	$3x^4$
תשובה 4	$5a^4$
תשובה 5	$6x^6$
תשובה 6	$4a^4$
תשובה 7	$-10x^5$
תשובה 8	$-2a^2$
תשובה 9	$12x^3y^4$
תשובה 10	$5a^2b^2$
תשובה 11	$-10a^7$
תשובה 12	$-5x^5$
תשובה 13	$-12x^3y^3$
תשובה 14	$5a^2b^2$
תשובה 15	$6x^3$
תשובה 16	$3a^3$
תשובה 17	a^3
תשובה 18	$2x^3$
תשובה 19	x^6
תשובה 20	$2a$