


# 1 Алгоритм симплекс-метода, симплекс-таблицы

1. Для известного начального базиса находят координаты разложения векторов  $b$  и  $A_k$  ( $k = 1, \dots, n$ ) по базису:

$$\begin{cases} x^0 = A_B^{-1}b - \text{ненулевые координаты опорной точки,} \\ x^k = A_B^{-1}A_k, k = \overline{1, n} - \text{координаты разложения вектора } A_k \text{ по базису.} \end{cases}$$

2. Вычисляют симплекс-разности:  $\Delta_k = c_k - c_B A_B^{-1} A_k$ ,  $k = 1, \dots, n$ .
3. Проверяют план на оптимальность. Если все  $\Delta_k \leq 0$ ,  $k = 1, \dots, n$ , то решение оптимально.
4. Проверяется критерий отсутствия решения. Если  $\exists \Delta_r > 0$ : все  $x_{ir} \leq 0$ ,  $i = \overline{1, m}$ , то целевая функция не ограничена сверху в допустимой области.
5. Определяют вектор  $A_r$ , вводимый в базис:  $\Delta_r > 0$  и максимальная среди всех положительных  $\Delta_k$ ,  $k = \overline{1, n}$ .
6. Определяют вектор  $A_s$ , выводимый из базиса:

$$A_s : \frac{x_{s0}}{x_{sr}} = \min_{i \in I} \frac{x_{i0}}{x_{ir}} \quad (x_{ir} > 0) \Rightarrow \text{строим новый базис и переходим в п.1.}$$



Формулы пересчета координат разложения векторов по новому базису:

$$x'_{jk} = \begin{cases} x_{jk} - \frac{x_{jr}}{x_{sr}}x_{sk}, & \text{если } j \in I \setminus s, \\ \frac{x_{sk}}{x_{sr}}, & \text{если } j = r. \end{cases}$$

			$C_1$	$\dots$	$C_r$	$\dots$	$C_n$
базис	$C_{\text{баз}}$	$B$	$A_1$		$A_r$		$A_n$
$A_{i1}$	$C_{i1}$	$X_{10}$	$X_{11}$		$X_{1r}$		$X_{1n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$A_{is}$	$C_{is}$	$X_{s0}$	$X_{s1}$		$X_{sr}$		$X_{sn}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$A_{im}$	$C_{im}$	$X_{m0}$	$X_{mr}$		$X_{mr}$		$X_{mn}$
		$f(x^{\text{опт}})$	$\Delta_1$		$\Delta_r$		$\Delta_n$