



## Theoretische Informatik D. Flumini, L. Keller, O. Stern

# Übungsblatt 2

## Reguläre Ausdrücke

Abgabe: Kalenderwoche 10

#### Aufgabe 1.

Konstruieren Sie reguläre Ausdrücke für die folgenden Sprachen über dem Alphabet {0, 1}.

- (a)  $\{0,1\}^*$
- (b) Sprache der Wörter, in denen jeder 1 mindestens zwei 0en folgen
- (c) Sprache aller Binärzahlen, die grösser als 1 sind
- (d) Sprache aller durch zwei teilbaren Binärzahlen

Hinweis: Positive Binärzahlen beginnen mit einer 1.

10 Punkte

#### Aufgabe 2.

Geben Sie jeweils einen regulären Ausdruck an, der die entsprechende Sprache L beschreibt.

- (a)  $L = \{w \in \{u, v\}^* \mid |w|_u \text{ ist gerade}\}$
- (b)  $L = \{w \in \{0, 1, ...8, 9\}^* \mid w \text{ ist eine Zahl im Dezimal$  $system und kann durch 5 geteilt werden}\}$
- (c)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a + |w|_b = 3\}$
- (d) Die Sprache der Namenskürzel der ZHAW. Ein Namenskürzel hat mindestens die Länge 4, wobei in diesen ersten 4 Zeichen ausschliesslich Kleinbuchstaben vorkommen können. Die beliebig vielen nachfolgenden Zeichen können sowohl aus Kleinbuchstaben als auch aus Zahlen bestehen.

Hinweis: Positive Zahlen im Dezimalsystem beginnen nie mit einer 0. 10 Punkte

#### Aufgabe 3.

Entscheiden Sie für folgende Paare von regulären Ausdrücke über  $\{x, b\}$ , ob die beiden regulären Ausdrücke jeweils äquivalent sind. Begründen Sie Ihre Antwort.

- (a) ((U|V)T) und (U|(VT)), wobe<br/>i $U,V,T\in RA_{\{x,b\}}$  beliebige reguläre Ausdrücke sind.
- (b)  $(b((x^*)^*(b^*)^*)^*)^*$  und  $\varepsilon|(b(x|b)^*)$

*Hinweis:* Zwei reguläre Ausdrücke A und B sind äquivalent, falls L(A) = L(B) gilt. **10 Punkte** 

## Aufgabe 4.

Bestimmen Sie für die regulären Ausdrücke  $R_1$  bis  $R_4$ , welche der Wörter  $w_1 = \varepsilon, w_2 = 101, w_3 = 1729, w_4 = 101 \times 0x101$  und  $w_5 = 2 + -2 \times 2 \div -10$  sie jeweils akzeptieren.

- (a)  $R_1 = (0|(-|\varepsilon|0x)(1|...|9)(0|...|9)^*)$
- (b)  $R_2 = R_1((+|-|\times|\div)R_1)^*$
- (c)  $R_3 = \emptyset$
- (d)  $R_4 = 1(0^*|(0|1)^+)$

10 Punkte

### Zusatzaufgabe 1.

Geben Sie einen regulären Ausdruck an, der die Sprache der durch 3 teilbaren Binärzahlen beschreibt (führende Nullen erlaubt).

Optional