

Vázané a globální extrémy

1. Definice Budťe $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, $m < n$, $g_1, \dots, g_m : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ funkce. Položme $V = \{x \in \mathbf{R}^n; g_1(x) = 0 \wedge \dots \wedge g_m(x) = 0\}$.
 Řekneme, že f má v bodě $a \in Df \cap V$ **vázané lokální maximum** podmínkou $a \in V$, když $\exists K(a, \delta)$ tak, že $\forall x \in K(a, \delta) \cap Df \cap V$ platí $f(x) \leq f(a)$.
 Řekneme, že f má v bodě $a \in Df \cap V$ **vázané lokální minimum** podmínkou $a \in V$, když $\exists K(a, \delta)$ tak, že $\forall x \in K(a, \delta) \cap Df \cap V$ platí $f(a) \leq f(x)$.
 Vázaná lokální minima a maxima funkce f se nazývají **vázané lokální extrémy**.

2. Poznámka Podmínka $a \in V$ se nazývá vazba a rovnice $g_1(x) = 0, \dots, g_m(x) = 0$ se nazývají vazebné rovnice nebo též **vazebné podmínky**.

3. Poznámka Budť $m = 1$. V některých případech lze z rovnice $g(x_1, \dots, x_n) = 0$ jednoznačně určit některé x_i . Například $x_i = \bar{g}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Pak za x_i dosadíme do $f(x_1, \dots, x_n)$ výraz \bar{g} a dostáváme funkci $F(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$, která má pouze $n - 1$ proměnných. Úloha o nalezení vázaných extrémů funkce f s vazbou V je tím převedena na ekvivalentní úlohu o nalezení lokálních extrémů funkce F . V případech, kdy nelze výše uvedeného postupu použít, vede v řadě případů k řešení tzv. **metoda Lagrangeových multiplikátorů** (viz následující Věta 4).

4. Věta (Lagrange) Budťe $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, $g_1, \dots, g_m : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, $m < n$ funkce spojitě diferencovatelné na otevřené množině Ω obsahující V a nechtť $\forall x \in \Omega$ platí, že hodnost matice $\left[\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x) \right]_{i,j}$ je rovna m . Budť $L : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ funkce definovaná vztahem

$$L(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) + \lambda_1 g_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + \lambda_m g_m(x_1, \dots, x_n). \quad (1)$$

Funkce L se nazývá Lagrangeova funkce a konstanty $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbf{R}$ se nazývají Lagrangeovy multiplikátory. Nechtť systém $m + n$ rovnic o $m + n$ neznámých

$$\begin{aligned} L'_{x_1} &= 0, \\ &\vdots \\ L'_{x_n} &= 0, \\ g_1 &= 0, \\ &\vdots \\ g_m &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

má řešení $[a_1, \dots, a_n, \lambda_1^0, \dots, \lambda_m^0]$.

Má-li L v bodě $a = [a_1, \dots, a_n]$ pro $\lambda_1^0, \dots, \lambda_m^0$ lokální extrém, pak f má v a vázaný lokální extrém téhož typu s vazbou $a \in V$.

Nemá-li L lokální extrém, neplyne odtud, že f nemá vázaný lokální extrém.

5. Poznámka

1. Výraz $\left[\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x) \right]_{i,j}$ označuje matici o m řádcích a n sloupcích.
2. Podmínka, že hodnost matice $\left[\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x) \right]_{i,j}$ je rovna m znamená, že žádná z rovnic $g_i(x) = 0$ není zbytečná.

6. Příklad Vyšetřete vázané extrémy $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$ s vazbou $x^2 + y^2 = 1$.

Řešení Z vazby nelze vyjádřit jednoznačně žádnou proměnnou. Sestavíme tedy Lagrangeovu funkci

$$L(x, y) = 6 - 4x - 3y + \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

Spočteme parciální derivace, položíme je rovny nule a přidáme vazebnou rovnici:

$$L'_x = -4 + 2\lambda x = 0,$$

$$L'_y = -3 + 2\lambda y = 0,$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

Získali jsme tak soustavu tří rovnic o třech neznámých x, y, λ . Tuto soustavu musíme nyní vyřešit. Z první rovnice plyne $x = \frac{2}{\lambda}$ a ze druhé $y = \frac{3}{2\lambda}$. Dosazením za x a y do rovnice vazby dostáváme

$$\left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 = 1.$$

Odtud po krátké úpravě plyne $\lambda^2 = \frac{25}{4}$ a tedy $\lambda = \pm \frac{5}{2}$.

Pro $\lambda = \frac{5}{2}$ dostáváme $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$. Získali jsme stacionární bod Lagrangeovy funkce $a_1 = [\frac{4}{5}, \frac{3}{5}]$.

Podobně pro $\lambda = -\frac{5}{2}$ dostáváme $x = -\frac{4}{5}, y = -\frac{3}{5}$. Nalezli jsme druhý stacionární bod $a_2 = [-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}]$.

Nyní vyšetříme nalezené stacionární body pomocí druhé derivace Lagrangeovy funkce. Určíme druhé parciální derivace a sestavíme matice $L'', L''(a_1), L''(a_2)$. Platí

$$L'' = \begin{pmatrix} 2\lambda & 0 \\ 0 & 2\lambda \end{pmatrix}, \quad L''(a_1) = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad L''(a_2) = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}.$$


Nyní můžeme použít Sylvestrovo kritérium.

Pro a_1 platí $D_1(a_1) = 5, D_2(a_1) = 25$. Odtud plyne, že L má v bodě $a_1 = [\frac{4}{5}, \frac{3}{5}]$ pro $\lambda = \frac{5}{2}$ lokální minimum a podle Věty 4 má f ve stejném bodě vázané lokální minimum vzhledem k dané vazbě.

Analogicky pro a_2 platí $D_1(a_2) = -5, D_2(a_2) = 25$. Odtud plyne, že L má v bodě $a_2 = [-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}]$ pro $\lambda = -\frac{5}{2}$ lokální maximum a f má v bodě a_2 vázané lokální maximum. Tím je úloha vyřešena.

Pokusme se ještě vysvětlit **geometrický význam** celé úlohy.

Grafem funkce $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$ je rovina v obecné poloze. Vazebná rovnice $x^2 + y^2 = 1$ je rovnice kružnice ležící v rovině xy . Hledáme tedy extrémy na křivce, která vznikne průnikem válcové plochy určené touto kružnicí s danou rovinou. Průnikovou křivkou je elipsa. Situace je znázorněna na následujícím Obrázku 1. Poznamenejme jen, že na obrázku je zobrazena jen část elipsy a pouze vázané lokální minimum. Polohu vázaného lokálního maxima si jistě pozorný čtenář dokáže sám představit, když si dopočítá z -ovou souřadnici bodu a_2 .)



Obrázek 1: Vázané extrémy funkce $f(x, y) = 6 - 4x - 3y$ s podmínkou $x^2 + y^2 = 1$

7. Příklad Vyšetřete vázané extrémy $f(x, y) = x^2 - y^2$ s vazbou $2x - y + 1 = 0$.

Řešení Lagrangeova funkce je tvaru

$$L(x, y) = x^2 - y^2 + \lambda(2x - y + 1).$$

Spočteme parciální derivace, položíme je rovny nule a přidáme vazebnou rovnici

$$L'_x = 2x + 2\lambda = 0,$$

$$L'_y = -2y - \lambda = 0,$$

$$2x - y + 1 = 0.$$

Získali jsme soustavu tří rovnic o třech neznámých x, y, λ . Z první rovnice plyne $\lambda = -x$ a ze druhé $\lambda = -2y$. Odtud dostáváme $x = 2y$.

Dosazením do vazby a krátkým výpočtem zjistíme, že existuje jediný stacionární bod $a = \left[-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right]$ pro $\lambda = \frac{2}{3}$.

Nyní vyšetříme stacionární bod pomocí druhé derivace Lagrangeovy funkce. Spočteme druhé parciální derivace a sestavíme matice $L'', L''(a)$. Platí

$$L'' = L''(a) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Protože $D_1(a) = 2 > 0$ a $D_2(a) = -4 < 0$ nemá Lagrangeova funkce L podle Sylvestrova kritéria lokální extrém.

Pozor! Odtud ale neplyne, že f nemá vázaný extrém s danou vazbou. Ukážeme nyní, že f vázaný extrém má. Budeme postupovat tak, že úlohu o vázaném extrému převedeme na ekvivalentní úlohu nalezení lokálního extrému funkce jedné proměnné.

Z vazby vyjádříme y . Platí $y = 2x + 1$. Dosadíme do zadané funkce. Dostaneme

$$F(x) = f(x, 2x + 1) = x^2 - (2x + 1)^2.$$

Odtud $F'(x) = -6x - 4$. Nalezneme stacionární bod $x_0 = -\frac{2}{3}$. Protože platí $F''(x) = -6 < 0$ je v bodě $x_0 = -\frac{2}{3}$ lokální maximum funkce $F(x)$. Tedy funkce $f(x, y)$ má v bodě $\left[-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right]$ vázané lokální maximum.

8. Definice Buď $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}, \Omega \subseteq Df, a \in \Omega$.

Řekneme, že f má v a **globální maximum na Ω** , když $\forall x \in \Omega$ platí $f(x) \leq f(a)$. Klademe $\max f(\Omega) = f(a)$.

Řekneme, že f má v a **globální minimum na Ω** , když $\forall x \in \Omega$ platí $f(a) \leq f(x)$. Klademe $\min f(\Omega) = f(a)$.

Hodnoty $\max f(\Omega)$ a $\min f(\Omega)$ se nazývají globální maximum a globální minimum funkce f na množině Ω . Místo globální též říkáme **absolutní**.

9. Věta (Weierstrasse) Buď $\emptyset \neq \Omega \subseteq \mathbf{R}^n$ ohraničená, uzavřená množina a $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ spojitá funkce na $\Omega \subseteq Df$. Platí následující tvrzení:

1. f je ohraničená na Ω .
2. Existují $a, b \in \Omega$ tak, že $\forall x \in \Omega : f(a) \leq f(x) \leq f(b)$,
tzn. existuje $\min f(\Omega) = f(a)$ a $\max f(\Omega) = f(b)$.
3. Nechť $\min f(\Omega)$ nastane v bodě $a \in \Omega$. Pak f má v a lokální minimum, nebo $a \in h(\Omega)$.
Analogicky nechť $\max f(\Omega)$ nastane v bodě $a \in \Omega$. Pak f má v a lokální maximum, nebo $a \in h(\Omega)$.

10. Poznámka

1. Není-li Ω uzavřená, nebo ohraničená, pak $\min f(\Omega)$ a $\max f(\Omega)$ nemusí existovat.

2. Pokud $\min f(\Omega)$, $\max f(\Omega)$ existují, jsou určena jednoznačně. Funkce však může nabývat těchto hodnot obecně ve více bodech.
3. Hranici množiny Ω lze často popsat pomocí rovnic. Vyšetřování hranice tedy vede k vázaným extrémům.

Weierstrassova věta poskytuje návod pro nalezení $\min f(\Omega)$ a $\max f(\Omega)$. Jak postupovat popíšeme v následujícím algoritmu.

11. Poznámka **Algoritmus pro nalezení globálních extrémů.**

1. Nalezneme lokální extrémů funkce f a z nich vybereme ty, které leží v Ω . Nechť \mathbf{A} označuje množinu funkčních hodnot v nalezených bodech lokálních extrémů.
2. Nalezneme vázané extrémů funkce f s vazbou $V = h(\Omega)$. Nechť \mathbf{B} označuje množinu funkčních hodnot v nalezených bodech vázaných extrémů a v bodech, které jsou průniky různých vazeb.
3. Nechť $M = \mathbf{A} \cup \mathbf{B}$. Pak globální maximum $\max f(\Omega) = \max M$ a globální minimum $\min f(\Omega) = \min M$.

12. Příklad Určete globální extrémů funkce $f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - \frac{1}{2})^2$ na obdélníku Ω , který je určen body $A = [0, 0]$, $B = [2, 0]$, $C = [2, 1]$, $D = [0, 1]$.

Řešení

1. Nalezneme lokální extrémů funkce f . Spočteme parciální derivace $f'_x = 2x - 2$ a $f'_y = 2y - 1$ a nalezneme stacionární bod $s = [1, \frac{1}{2}]$. Matice druhé derivace je rovna $f'' = f''(s) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Hlavní minory této matice jsou kladné a proto v bodě s nastává lokální minimum funkce f . Platí $f(s) = 0$. Tedy $\mathbf{A} = \{0\}$.
2. Hranice množiny Ω je tvořena čtyřmi úsečkami. Vyšetření hranice $h(\Omega)$ se tedy rozpadá na vyřešení čtyř úloh na vázané extrémů s funkcí f a vazbami $V_1 : y = 0$, $V_2 : x = 2$, $V_3 : y = 1$ a $V_4 : x = 0$. Pozor! Při této formulaci je zapotřebí zvlášť vyšetřit body A, B, C, D , které jsou průniky různých vazeb. Úlohy f, V_i , kde $i = 1, 2, 3, 4$ převedeme na ekvivalentní úlohy nalezení lokálních extrémů funkcí F_i , kde $F_1(x) = f(x, 0) = (x - 1)^2 + \frac{1}{4}$, $F_2(y) = f(2, y) = (y - \frac{1}{2})^2 + 1$, $F_3(x) = f(x, 1) = (x - 1)^2 + \frac{1}{4}$, $F_4(y) = f(0, y) = (y - \frac{1}{2})^2 + 1$.
Snadno se zjistí, že úloha f, V_1 má vázané minimum v bodě $a = [1, 0]$;
 f, V_2 má vázané minimum v $b = [2, \frac{1}{2}]$;
 f, V_3 má vázané minimum v $c = [1, 1]$ a f, V_4 má vázané minimum v $d = [0, \frac{1}{2}]$.
3. Spočteme funkční hodnoty v nalezených bodech. Platí $f(a) = f(c) = \frac{1}{4}$, $f(b) = f(d) = 1$ a $f(A) = f(B) = f(C) = f(D) = \frac{5}{4}$. Odtud $\mathbf{B} = \{\frac{1}{4}, 1, \frac{5}{4}\}$. $M = \{0, \frac{1}{4}, 1, \frac{5}{4}\}$. Odtud $\max f(\Omega) = \max M = \frac{5}{4}$ a nastává v bodech A, B, C, D . Dále $\min f(\Omega) = \min M = 0$ a nastává v bodě s .